Nevrologiya

Lanistor

Lamotridjin

Tabletka 25 / 50 / 100 mg

Tutqanoqqa qarshi + normotimik (N03AX09)



QISQACHA · **Doza sekin oshiriladi; valproat bilan boshlang'ich 12,5 mg/sut. Toshma chiqsa — darhol to'xtatiladi.**

Ko'rsatmalar

- Epilepsiya (kattalar va 13 yoshdan): parsial va generalizatsiyalangan, shu jumladan tonik-klonik tutqanoqlar — mono yoki qo'shimcha
- Lennoks-Gasto sindromi — qo'shimcha terapiya
- Bipolyar buzilish (18 yoshdan): asosan depressiv epizodlar profilaktikasi

Dozalash

- Monoterapiya: 1–2 hafta 25 mg ×1 → 3–4 hafta 50 mg ×1 → har 1–2 haftada +50–100 mg; qo'llab-quvvatlovchi 100–200 mg/sut
- Valproat bilan: 1–2 hafta 12,5 mg (25 mg kunora) → 3–4 hafta 25 mg → 100–200 mg/sut
- Induktorlar bilan (karbamazepin, fenitoin, fenobarbital, rifampitsin): 1–2 hafta 50 mg → 3–4 hafta 100 mg (2 ga) → 200–400 mg/sut
- Tabletka chaynamay yutiladi; 12 yoshgacha bu shakl tavsiya etilmaydi

Mumkin emas

Lamotridjinga o'ta sezuvchanlik

Nojo'ya ta'sirlar

TOSHMA (kam hollarda SJS/TEN), bosh og'riq, bosh aylanishi, diplopiya, ataksiya, uyquchanlik, ko'ngil aynishi

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Glyukuronizatsiya orqali, CYP450 emas; o'z metabolizmini induksiya qilmaydi
- Homiladorlikda nisbatan xavfsiz: 8700+ ayolda I trimestrda nuqson xavfi sezilarli oshmagan; valproat kabi nerv nayi nuqsoni bermaydi
- Sedatsiya kam, kognitiv funksiyani yaxshilaydi; gepato/kardiotoksik emas — keksalarda tanlov preparati

KOMPANIYA MATERIALI (PM) · yo'riqnomadan emas

«Lanistor — qiyinchiliklarni yengishda eng oddiy yo'l!»

- Normotimik: kayfiyatni ko'taradi, BAB profilaktikasida samarali
- Kognitiv funksiyani rag'batlantiradi, sedatsiya yo'q
- Gepato- va kardiotoksik emas — katta va keksa yoshdagi bemorlarda 1-tanlov

⚠ SPV da T½ 29 soat; yo'riqnomada o'rtacha 33 soat.

O'zingizni tekshiring

Lanistor bilan eng xavfli nojo'ya ta'sir va undan qanday saqlanish kerak?
Og'ir teri toshmasi (SJS/TEN). Boshlang'ich doza va titrlash tezligini oshirmaslik; toshma chiqsa darhol to'xtatish.

Valproat qabul qilayotgan bemorda Lanistor qanday boshlanadi?
1–2 hafta 12,5 mg (25 mg kunora), 3–4 hafta 25 mg/sut, qo'llab-quvvatlovchi 100–200 mg/sut.