
Larfiks

Lornoksikam

Tabletka 8 mg

NYaQP, oksikamlar (M01AC05)



QISQACHA · **O'tkir og'riq: 8–16 mg/sut. Revmatoid artrit: 12 mg/sut. Maks. 16 mg/sut.**

Ko'rsatmalar

- Yengil va o'rta o'tkir og'riqni qisqa muddat davolash
- Revmatoid artritda og'riq va yallig'lanishni simptomatik yengillatish

Dozalash

- O'tkir og'riq: 8–16 mg/sut, 2–3 ga bo'lib; 1-kun 16 mg, 12 soatdan keyin yana 8 mg mumkin; keyin maks. 16 mg/sut
- Revmatoid artrit: 12 mg/sut 2–3 ga bo'lib; maks. 16 mg/sut
- Yengil-o'rta buyrak/jigar buzilishi: maks. 12 mg/sut
- 18 yoshgacha mumkin emas; yetarli suv bilan

Mumkin emas

ASK/NYaQP ga allergiya; trombotsitopeniya; og'ir yurak, jigar, buyrak yetishmovchiligi; faol/qaytalanuvchi yara, GI yoki serebrovaskulyar qon ketish; homiladorlik III trimestri; 18 yoshgacha

Nojo'ya ta'sirlar

Ko'ngil aynishi, qorin og'riq, dispepsiya, diareya, qusish, bosh og'riq, bosh aylanishi

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Kuchli og'riqsizlantiruvchi, qisqa T½
- Varfarin, geparin (spinal gematoma), SSRI, KS bilan qon ketish xavfi
- APF ingibitori, sartan, diuretik samarasini kamaytiradi; litiy, metotreksat darajasini oshiradi

KOMPANIYA MATERIALI (PM) · yo'riqnomadan emas

«Larfiks — kuchli va tez og'riqsizlantiruvchi zamonaviy NYaQP»

- 8 mg ×2 — ketorolak, ibuprofen va tramadolning maksimal dozalariga teng (SPV)
- Ta'sir 15–30 daqiqada, maksimum ~1 soatda
- Qisqa T½ — gastropatiya kam; tog'ayga zararsiz
- Buyrak sanchig'ida metamizol va ketorolakdan kuchliroq (SPV)

O'zingizni tekshiring

Larfiksning sutkalik maksimal dozasi?
16 mg/sut (buyrak/jigar buzilishida 12 mg).

Larfiks qaysi yoshdan?
18 yoshdan.