Lefno



Leflunomid

Tabletka 20 mg

Selektiv immunodepressant, bazis antirevmatik (L04AA13)

QISQACHA · 3 kun 100 mg/sut, keyin 10–20 mg/sut. ALT va qon tahlili dastlabki 6 oy har 2 haftada.

Ko'rsatmalar

- Kattalarda faol revmatoid artrit
- Faol psoriatik artrit

Dozalash

- Yuklama: 100 mg kuniga 1 marta 3 kun
- RA: keyin 10–20 mg/sut; PsA: 20 mg/sut
- Samara 4–6 haftada, 4–6 oygacha yaxshilanadi
- Nazorat: ALT va qon tahlili — dastlabki 6 oy har 2 haftada, keyin har 8 haftada

Mumkin emas

Jigar buzilishi; og'ir immunodefitsit; suyak iligi buzilishi; og'ir infeksiya; o'rta-og'ir buyrak yetishmovchiligi; homiladorlik va kontratsepsiyasiz tug'ish yoshi; emizish

Nojo'ya ta'sirlar

AQB oshishi, leykopeniya, diareya, ko'ngil aynishi, og'iz yarachalari, soch to'kilishi, toshma, jigar fermentlari oshishi

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Davolashni revmatolog boshlaydi; metotreksat bilan birga — gepatotoksiklik xavfi
- Faol metabolit T½ ≈ 2 hafta — kerak bo'lsa xolestiramin bilan "yuvish"
- 18 yoshgacha tavsiya etilmaydi

O'zingizni tekshiring

Lefno qanday boshlanadi?

3 kun davomida 100 mg/sut yuklama dozasi, keyin 10–20 mg/sut.

Lefno bilan qanday tahlillar nazorat qilinadi?

ALT va qonning umumiy tahlili: dastlabki 6 oy har 2 haftada, keyin har 8 haftada.