Loflatil

Loperamid 2 mg + Simetikon 125 mg

Tabletka

Diareyaga qarshi + ko'pikni so'ndiruvchi (A07DA53)



QISQACHA · **Boshida 2 tab, keyin har suyuq ichdan keyin 1 tab; maks. 4 tab/sut, 2 kun. 12 yoshdan.**

Ko'rsatmalar

- Kattalar va 12 yoshdan o'tkir diareya, qorinda gaz to'planishi (meteorizm, spazm, shish) bilan

Dozalash

- Boshida 2 tab, keyin har suyuq ichdan keyin 1 tab
- Maks. 4 tab/sut; 2 kundan oshmasin
- 12 yoshgacha mumkin emas

Mumkin emas

12 yoshgacha; qonli axlat va isitmali dizenteriya; o'tkir yarali kolit; psevdomembranoz kolit; Salmonella/Shigella/Campylobacter enterokoliti; qabziyat, ichak tutilishi, megakolon

Nojo'ya ta'sirlar

Ko'ngil aynishi; bosh og'riq, qabziyat, meteorizm, og'iz qurishi; kam — ichak tutilishi

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Ikki muammo bitta tabletkada: diareya + shishish
- Qabziyat yoki qorin shishsa — darhol to'xtatish

KOMPANIYA MATERIALI (PM) · yo'riqnomadan emas

«Loflatil — O'zbekistonda yagona loperamid + simetikon; diareya va qorin dam bo'lishini tez bartaraf etadi»

- Gastroenterologlar: noinfeksion diareyada

O'zingizni tekshiring

Loflatil qanday ichiladi?

Boshida 2 tabletka, keyin har suyuq ichdan keyin 1 tabletka; maks. 4 tab/sut, 2 kun.

Loflatil qaysi diareyada mumkin emas?

Qonli va isitmali (dizenteriya), bakterial enterokolit, psevdomembranoz kolit, o'tkir yarali kolit.