Nevrologiya

Mezakar

Karbamazepin

Tabletka 200 mg

Tutqanoqqa qarshi, normotimik (N03AF01)



QISQACHA · **Epilepsiya, uch shoxli nerv nevralgiyasi, maniakal-depressiv profilaktika. Qon tahlili va natriy nazorati.**

Ko'rsatmalar

- Epilepsiya: parsial (ikkilamchi generalizatsiyali) va generalizatsiyalangan tonik-klonik tutqanoqlar
- Uch shoxli nerv nevralgiyasi
- Litiyga javob bermaydigan maniakal-depressiv psixoz profilaktikasi

Dozalash

- Epilepsiya, kattalar: 100–200 mg 1–2 marta dan → odatda 800–1200 mg/sut, ba'zan 1600–2000 mg; kuniga 2–3 marta, ovqat bilan yoki keyin
- Bolalar: 5–10 yosh 400–600 mg/sut; 10–15 yosh 600–1000 mg/sut; >15 yosh 800–1200 mg/sut
- Nevralgiya: 200–400 mg/sut dan, odatda 200 mg 3–4 marta; maks. 1200 mg; keksalar 100 mg ×2 dan
- Maniakal-depressiv profilaktika: 400–1600 mg/sut, odatda 400–600 mg

Mumkin emas

O'ta sezuvchanlik (shu jumladan TTsA ga), AV blokada, suyak iligi depressiyasi anamnezi, jigar porfiriyasi, MAO ingibitorlari bilan

Nojo'ya ta'sirlar

Bosh aylanishi, ataksiya, uyquchanlik, diplopiya, ko'ngil aynishi, toshma, leykopeniya, giponatriemiya; kam — agranulotsitoz, SJS

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Fokal epilepsiyaning "oltin standarti"; Finlepsin/Tegretolga ekvivalent; GMP WHO
- Nevrolog, psixiatr, narkolog, neyroxirurg uchun: nevropatik og'riq, normotimik, abstinensiyada
- Kuchli CYP3A4 induktori: KOK, varfarin va boshqa dorilar samarasini kamaytiradi

KOMPANIYA MATERIALI (PM) · yo'riqnomadan emas

«Mezakar — impulslar ustidan to'liq nazorat! Fokal epilepsiyada tanlov preparati»

- Yaxshi o'rganilgan molekula, sifatli generik, arzon
- Qadoqda 50 tabletka — uzoqqa yetadi
- Neyropatik og'riqda patogenetik ta'sir

O'zingizni tekshiring

Uch shoxli nerv nevralgiyasida Mezakar dozasi?
200–400 mg/sut dan boshlab, og'riq ketguncha (odatda 200 mg 3–4 marta), maks. 1200 mg/sut.

Mezakar qaysi hollarda mumkin emas?
AV blokada, suyak iligi depressiyasi anamnezi, jigar porfiriyasi, MAO ingibitorlari bilan birga, o'ta sezuvchanlik.