Mezakar SR

Karbamazepin 400 mg (ta'sir uzaytirilgan)

Tabletka 400 mg ("C400", bo'luvchi chiziqli), №50 (5×10)

Tutqanoqqa qarshi, neyrotrop va psixotrop (N03AF01)



QISQACHA · 400 mg, kuniga 2 marta. 6 yoshgacha tavsiya etilmaydi; absans va mioklonik tutqanoqlarda samarasiz.

Ko'rsatmalar

- Epilepsiya: generalizatsiyalangan tonik-klonik va parsial tutqanoqlar (yangi tashxis va nazorat qilinmagan holatlar)
- Uch shoxli nerv nevralgiyasi
- Litiyga javob bermaydigan maniakal-depressiv psixoz profilaktikasi

Dozalash

- Sutkalik doza 2 ga bo'linadi (kuniga 2 marta); butun yoki yarim tabletka, chaynamay
- Kattalar: 200–400 mg dan → odatda 800–1200 mg/sut; ba'zan 1600–2000 mg
- Bolalar 10–20 mg/kg: 6–10 yosh 400–600 mg; 10–15 yosh 600–1000 mg; >15 yosh 800–1200 mg; 6 yoshgacha tavsiya etilmaydi
- Nevralgiya: 200–400 mg dan, odatda 600–800 mg, maks. 1200 mg; keksalar 200 mg dan
- Oddiy Mezakardan o'tishda sutkalik doza o'zgarmaydi

Mumkin emas

Mezakar bilan bir xil (o'ta sezuvchanlik, AV blokada, suyak iligi depressiyasi anamnezi, jigar porfiriyasi, MAO ingibitorlari bilan)

Nojo'ya ta'sirlar

Bosh aylanishi, ataksiya, uyquchanlik, diplopiya, ko'ngil aynishi, qusish, allergik toshma; giponatriemiya; kam — SJS

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Oddiy Mezakardan farqi: kuniga 2 marta — qonda konsentratsiya barqarorroq
- Absans va mioklonik tutqanoqlarda samarasiz (kuchaytirishi mumkin)
- Xitoy va tay millatiga mansub bemorlarda HLA-B*1502 skrining (SJS xavfi)

KOMPANIYA MATERIALI (PM) · yo'riqnomadan emas

«Mezakar — impulslar ustidan to'liq nazorat!»

- Uzaytirilgan shakl: kuniga 2 marta qabul

O'zingizni tekshiring

Mezakar SR ning oddiy Mezakardan afzalligi?
Ta'sir uzaytirilgan: sutkalik doza 2 ga bo'linadi, konsentratsiya barqarorroq.

Mezakar SR qaysi tutqanoqlarda samarasiz?
Absans (petit mal) va mioklonik tutqanoqlarda.