Moginin

Sildenafil

Tabletka 50 mg / 100 mg

FDE-5 ingibitori (G04BE03)



QISQACHA · **50 mg jinsiy faollikdan ~1 soat oldin. Nitratlar bilan mumkin emas.**

Ko'rsatmalar

- Erkaklarda erektil disfunksiya

Dozalash

- 18–65 yosh: 50 mg jinsiy faollikdan ~1 soat oldin
- Samaraga qarab 100 mg gacha yoki 25 mg gacha; kuniga 1 martadan ko'p emas
- Boshlang'ich 25 mg: KK<30, sirroz, CYP3A4 ingibitorlari, alfa-blokatorlar

Mumkin emas

NITRATLAR va azot oksidi donatorlari bilan; nostabil stenokardiya, og'ir yurak yetishmovchiligi; NAION; og'ir jigar yetishmovchiligi; AQB <90/50; yaqinda insult yoki infarkt; pigmentli retinit

Nojo'ya ta'sirlar

Bosh og'riq, bosh aylanishi, yuz qizarishi, burun bitishi, dispepsiya, ko'rish/rang buzilishi; priapizm

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Faqat jinsiy qo'zg'alish bo'lganda ta'sir qiladi
- Yog'li ovqat ta'sir boshlanishini kechiktiradi
- 4 soatdan uzoq erektsiya — shoshilinch yordam

O'zingizni tekshiring

Moginin bilan qat'iyan mumkin bo'lmagan dorilar?

Nitratlar va azot oksidi donatorlari (amilnitrit).

Moginin boshlang'ich dozasi qachon 25 mg?

Og'ir buyrak buzilishi, sirroz, CYP3A4 ingibitorlari yoki alfa-blokatorlar qabul qilinganda.