Pulmonologiya, LOR va allergiya

Mukeks





Ambroksol

Sirop 15 mg/5 ml va 30 mg/5 ml; tabletka 30 mg

Mukolitik, balg'am ko'chiruvchi (R05CB06)

QISQACHA · **Kattalar: 30 mg kuniga 3 marta (2–3 kun), keyin 2 marta.**

Ko'rsatmalar

- Bronx sekretsiyasi buzilishi bilan o'tkir va surunkali bronxo-o'pka kasalliklari — sekretolitik terapiya

Dozalash

- Tabletka (12 yoshdan): 1 tab ×3 (90 mg); kuchaytirish — 2 tab ×2 (120 mg)
- Sirop 15 mg/5 ml: <2 yosh 2,5 ml ×2; 2–5 yosh 2,5 ml ×3; 6–12 yosh 5 ml ×2–3; 12+ 10 ml ×3 (2–3 kun), keyin ×2
- Sirop 30 mg/5 ml: 6–12 yosh 2,5 ml ×3; 12+ 5 ml ×3, keyin ×2
- Vrachsiz 4–5 kundan ko'p emas; ko'p suyuqlik ichish

Mumkin emas

> Ambroksolga sezuvchanlik; yordamchi moddalarga irsiy intoleransi; tabletka 12 yoshgacha mumkin emas

Nojo'ya ta'sirlar

Ko'ngil aynishi, ta'm o'zgarishi, og'iz/tomoq sezuvchanligi pasayishi; kam — toshma, juda kam — og'ir teri reaksiyalari

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Siropda: amoksitsillin, sefuroksim, eritromitsin, doksitsiklin ning balg'amdagi konsentratsiyasini oshiradi
- Siropi alkogolsiz, diabetda mumkin (o'rik ta'mi)
- Homiladorlik (ayniqsa I trimestr) va emizishda tavsiya etilmaydi

KOMPANIYA MATERIALI (PM) · yo'riqnomadan emas

«Mukeks — kattalar va tug'ilgandan boshlab bolalarda nam yo'talni samarali davolash»

⚠ 2 yoshgacha yo'riqnomada faqat vrach buyurganda.

O'zingizni tekshiring

Mukeks antibiotiklar bilan qanday ta'sirlashadi?

Amoksitsillin, sefuroksim, eritromitsin, doksitsiklinning bronx sekretidagi konsentratsiyasini oshiradi.

Kattalarga Mukeks tabletka dozasi?

30 mg kuniga 3 marta; kuchaytirish uchun 60 mg kuniga 2 marta.