Nimid

Nimesulid

Tabletka 100 mg; granula 100 mg/sashe (apelsin)

NYaQP, COX-2 ga nisbatan selektiv (M01AX17)



QISQACHA · 100 mg kuniga 2 marta ovqatdan keyin, maks. 15 kun. 12 yoshdan.

Ko'rsatmalar

- O'tkir og'riq
- Birlamchi dismenoreya
- Faqat ikkinchi qator dori sifatida buyuriladi

Dozalash

- Kattalar va 12 yoshdan: 100 mg kuniga 2 marta OVQATDAN KEYIN
- Granula: 1 sashe suvda eritib, kuniga 2 marta
- Maks. 15 kun; minimal samarali doza, qisqa muddat
- KK<30 va jigar yetishmovchiligida mumkin emas

Mumkin emas

ASK/NYaQP ga allergiya; nimesulidga gepatotoksik reaksiya anamnezi; boshqa gepatotoksik dorilar, alkogolizm; faol yara/qon ketish; og'ir yurak, buyrak, jigar yetishmovchiligi; isitma va gripp simptomlari; 12 yoshgacha; homiladorlik III trimestri, laktatsiya

Nojo'ya ta'sirlar

Diareya, ko'ngil aynishi, qusish, jigar fermentlari oshishi; kam — gipertenziya, toshma; juda kam — gepatit

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Granula — tez so'riladi, yutish qiyin bo'lganlarga qulay
- Gripp/isitma simptomlarida QMBH — tez-tez beriladigan savol
- Varfarin bilan tavsiya etilmaydi

KOMPANIYA MATERIALI (PM) · yo'riqnomadan emas

«Nimid granulalar — in'eksiya kabi maksimal tez natija!»

- COX-2 selektiv; me'da va buyrak prostaglandinlariga deyarli ta'sir qilmaydi (kompaniya materiali)

O'zingizni tekshiring

Nimidning maksimal davolash muddati?
15 kun.

Nimid nega gripp simptomlarida mumkin emas?
Yo'riqnomada isitma va gripp simptomlari qo'llash mumkin bo'lmagan holat sifatida ko'rsatilgan (gepatotoksiklik xavfi bilan bog'liq ehtiyot).