Nimid Forte

Nimesulid 100 mg + Tizanidin 2 mg

Tabletka ("NF")

NYaQP + markaziy miorelaksant (M01A)



QISQACHA · **1 tab kuniga 2 marta, maks. 15 kun. Fluvoksamin va siprofloksatsin bilan birga emas.**

Ko'rsatmalar

- Mushak spazmi bilan kechadigan og'riq: artrit, osteoartroz, travmatik shikastlanishlar
- Jarohat/operatsiyadan keyingi og'riq va shish; umurtqa kasalliklari (bo'yin, bel spondilezi)
- Nevrologik spazm: tarqoq skleroz, serebral falaj; og'riqli ginekologik kasalliklar

Dozalash

- Kattalar: 1 tab kuniga 2 marta (ertalab va kechqurun) ovqatdan keyin
- Maks. 15 kun; og'riq ketgach to'xtatish
- KK<30 — mumkin emas

Mumkin emas

> Nimid QMBH + FLUVOKSAMIN yoki SIPROFLOKSATSIN bilan birga (kuchli CYP1A2 ingibitorlari), og'ir jigar yetishmovchiligi, 12 yoshgacha

Nojo'ya ta'sirlar

Nimesulid NT + uyquchanlik, bosh aylanishi, og'iz qurishi, gipotenziya, bradikardiya, holsizlik

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Ikki muammoni bitta tabletkada yopadi: yallig'lanish + mushak spazmi
- Haydovchilarni uyquchanlikdan ogohlantirish
- Antigipertenziv dorilar bilan gipotenziya ehtimoli

O'zingizni tekshiring

Nimid Forte qaysi dorilar bilan mumkin emas?

Fluvoksamin va siprofloksatsin (tizanidin konsentratsiyasini keskin oshiradi).

Nimid Forte dozasi?

1 tabletka kuniga 2 marta ovqatdan keyin, maks. 15 kun.