Nimid gel

Nimesulid 1% (10 mg/g)

Gel 30 g / 100 g

Mahalliy NYaQP (M02AA26)



QISQACHA · **~3 sm gel kuniga 3–4 marta, ishqalamasdan surtiladi. 12 yoshdan.**

Ko'rsatmalar

- Tayanch-harakat apparatining yallig'lanish va degenerativ kasalliklari: RA, podagrik, psoriatik artrit, Bexterev, osteoartrit, bursit, tendinit, osteoxondroz, ishias, lyumbago
- Yumshoq to'qima jarohatlari, paylar cho'zilishi; zo'riqishdan keyingi og'riq

Dozalash

- ~3 sm gelni og'riqli joyga yupqa qatlam, ISHQALAMASDAN surtish
- Kuniga 3–4 marta; toza, quruq teriga

Mumkin emas

Dermatit, epidermis shikastlanishi, teri infeksiyasi; aspirin astmasi; homiladorlik III trimestri; 12 yoshgacha

Nojo'ya ta'sirlar

Surtilgan joyda qichishish, po'st tashlash, toshma

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Ishqalamasdan surtiladi — tez-tez so'raladigan nuqta
- Okklyuziv bog'lam qo'yilmaydi
- Tabletka bilan birga mahalliy davo sifatida

KOMPANIYA MATERIALI (PM) · yo'riqnomadan emas

«Nimid gel — tez og'riqsizlantirish!»

- Tez so'riladi, kiyimda dog' qoldirmaydi, achishtirmaydi, yoqimli hid — uzoq qo'llashga qulay
- Tog'ayga zarar yetkazmaydi; sinovial suyuqlikka kiradi
- Endokrinologlar uchun: autoimmun tireoiditli bemorlarda xavfsiz gel (kompaniya da'vosi)

O'zingizni tekshiring

Nimid gel qanday surtiladi?

3 sm gel yupqa qatlamda, ishqalamasdan, kuniga 3–4 marta.

Nimid gel qaysi yoshdan?

12 yoshdan.