第3回 実測値でスケルトンプロットを作る

任意の復習（約8分）。A3透明フィルム実習とは別に、奈文研資料29ho018・29ho017の内側15輪を用いてスケルトンプロットを練習する。輪番号は暦年を示さない。

輪番号	29ho018（0.01 mm）	29ho017（0.01 mm）
1	32	67
2	44	85
3	42	69
4	52	74
5	47	83
6	39	124
7	23	98
8	65	147
9	75	128
10	52	114
11	42	97
12	49	90
13	44	75
14	34	30
15	34	63

① 29ho018で、前後より目立って狭い輪に印を付ける。② 1〜15の目盛を横に等間隔で書き、より狭い輪に長い縦棒を描く。③ 29ho017でも行い、狭い輪の間隔を比べる。

幅の絶対値をそのまま棒の長さにしない。普通の輪は省略し、周囲に対する狭さを表す。15輪は操作練習用であり、年代決定に十分とは扱わない。

実測値の出典：奈文研 29ho018 / CC BY 4.0

比較資料：29ho017 / CC BY 4.0

第3回 照合を保留する理由と試料の重なり

確認例

29ho018では7番（0.23 mm）が明瞭に狭い。14・15番（各0.34 mm）は13番（0.44 mm）より狭いが、この抜粋だけで15番の外側の変化は判断できない。29ho017では14番（0.30 mm）が目立つ。印の長さは相対的な判断なので、唯一の数値解はない。

この短い抜粋の一部を合わせても暦年は決まらない。全系列・原画像・年代の確かな基準と照合する。別部材として登録された試料だが、別個体の木に由来することはこのメタデータだけでは確認できない。「別ファイル」と「独立した個体」を区別しよう。

吉野スギの年代範囲を読む（スライド25）

暦年	記録のある試料数	測線数
1636	1	1
1650	2	3
1700	6	7
1800	24	30
2000	57	69
2018	13	18

1636年と1800年では、記録を支える試料数はどう違うか。同じ木の複数の測線を、別個体として数えてよいか。

この表は刊行論文に対応する試料の開始年・終了年から再集計した。試料数は記録の重なりを示すが、照合の正しさや気候復元の精度を直接証明する指標ではない。

米延ほか（2026）：吉野スギ研究