



CUIDADOS POSTOPERATORIOS

Luego de la cirugía, dejar al animal en un lugar cálido y tranquilo, sin ruidos molestos, sobre una manta colocada en el piso. No ubicarlo sobre camas, sillones ni superficies elevadas.

Colocar un collar isabelino para evitar que el animal lama o muerda la zona intervenida, proteger los puntos de sutura y favorecer la correcta cicatrización de la herida.

Agua y alimentación

- * Ofrecer agua de a poco, transcurridas 8 horas desde la cirugía.
- * Ofrecer comida 12 horas después de la cirugía, en una porción moderada.

Medicación

Comenzar con la administración de los antibióticos y analgésicos indicados 24 horas después de la cirugía.

Antibiótico – CEFALOXILINA 500 mg: 1 comprimido cada 20 kg de peso, cada 12 horas durante 7 días (dosis: 25 mg/kg).

Analgésico – MELOXICAM 2 mg: 1 comprimido cada 20 kg de peso, cada 24 horas durante 3 días (dosis: 0,1 mg/kg).

Ante cualquier duda, complicación o cambio en el estado del animal, consultar con su veterinario/a de cabecera, quien deberá realizar el seguimiento postquirúrgico correspondiente.

Los puntos de sutura deberán retirarse a los 12 días de la cirugía.

LOS GATOS MACHOS NO LLEVAN PUNTOS DE SUTURA.