



## 目录

<b>1</b>	<b>复数</b>	<b>3</b>
1.1	复数的定义	3
1.2	复数的基本工具	4
1.3	历年试题区域	5
<b>2</b>	<b>二次函数</b>	<b>9</b>
2.1	顶点	9
2.2	二次曲线的函数图像	11
2.2.1	递增/递减函数	11
2.2.2	对称轴	11
2.3	根	11
2.3.1	判别式 $\Delta$ 与根	11
2.3.2	二次函数与常数函数的交点	13
2.3.3	两个函数的交点	13
2.3.4	利用集合理解两个函数的方程组	14
2.4	韦达定理	15
<b>3</b>	<b>多项式</b>	<b>19</b>
3.1	整数	19
3.2	多项式的基础	20

---


3.3	普遍化的余数定理	21
3.4	历年试题区域	23
4	测量 .....	31
4.1	面积与体积	31
4.1.1	测度 .....	31
4.1.2	物体的表面积与体积 .....	32
4.2	相似性	32
4.2.1	角度与相似三角形 .....	32
4.3	历年试题	33
5	指数与对数函数 .....	44
5.1	可逆性	44
5.2	对数函数的算术规则	44
5.3	对数不等式	49
5.4	历年试题精选	51



# 1. 复数

## 1.1 复数的定义

数学家定义  $i := \sqrt{-1}$ ，这与实数完全不同，因此  $i$  在实数轴  $\mathbb{R}$  的基础上增加了一个维度。需要注意的是，复数集  $\mathbb{C}$  定义为  $\mathbb{C} := \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$ ，并且实数集  $\mathbb{R}$  是复数集  $\mathbb{C}$  的子集，即  $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ 。因为  $a$  和  $i$  之间相互独立，我们可以将  $a + bi$  视为  $\mathbb{R}^2$  平面中的一个坐标  $(a, b)$ 。此外，即便假设我们将  $i$  替换为实数变量  $y \in \mathbb{R}$ ，仍然可以将  $a + by$  视为  $\mathbb{R}^2$  平面中的一个坐标。有时变量本身并不那么重要，而表示坐标的对应系数更为重要。然而， $i$  的定义使我们能够进行直观的乘法运算。



**定义 1.1.1 — 复数的加法和乘法.** 对于某些  $a_j, b_j \in \mathbb{R}$ ,  $\mathbf{v}_j \in \mathbb{C}$  并且  $\mathbf{v}_j = a_j + b_j i$ ，复数的加法定义如下：

$$\mathbf{v}_n + \mathbf{v}_m := (a_n + a_m) + (b_n + b_m)i$$

乘法定义如下：

$$\mathbf{v}_n \cdot \mathbf{v}_m := a_n a_m + b_n b_m + (a_n b_m + b_n a_m)i$$

乘法单位元, 即如  $z \oplus e = z$ ,  $\forall z, e \in E$ ,  $e$  是  $E$  里的  $\oplus$  单位元, 定义为:

$$\frac{z}{z} = 1 \in \mathbb{R}, \quad \forall z \in \mathbb{C}^\times$$

**R** 注意虚部是一个实数并且复数对于加法和乘法的封闭, 例如  $\sum_j v_j = \overbrace{\sum_j a_j}^{\text{实部}} + \overbrace{\left(\sum_j b_j\right)}^{\text{虚部}} i \in \mathbb{C}$

■ **例子 1.1 — 对加法封闭的集合.**  $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ . ■

■ **例子 1.2 — 对加法不封闭的集合.**  $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$  ■

**练习 1.1** 验证  $\mathbb{Q}$  对加法和乘法封闭, 但  $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$  不对加法和乘法封闭。

## 1.2 复数的基本工具

在 DSE 中, 我们需要表现出解决一些算术问题的能力, 而不是表现出对复数的理解, 所以, 对于 DSE 类型的问题, 只要知道下面的运算就足够了。

**定理 1.2.1 — 算术.** 对于任意  $a \neq 0$  or  $b \neq 0$ , 我们有以下:

平方差:  $(a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2 \in \mathbb{R}$

有理化 (将分数表示为  $x + yi$  的形式):  $\frac{1}{a + bi} = \frac{1}{a + bi} \frac{a - bi}{a - bi} = \frac{a - bi}{a^2 + b^2} = \frac{a}{a^2 + b^2} - \frac{b}{a^2 + b^2}i \in \mathbb{C}$

**定理 1.2.2 — 周期性.**  $i^1 = i, i^2 = -1, i^3 = -i, i^4 = 1, i^5 = i \dots$

**练习 1.2** 解决以下问题:

(a) 123 能被 4 整除吗? 如果不能, 余数是多少?

(b) 使用 (a), 计算  $i^{123}$ 。

**1.3 历年试题区域**

**练习 1.3** 设  $\alpha$  为实数。定义  $u = w + \frac{1}{w}$ ,  $v = w - \frac{1}{w}$ , 其中  $w = \frac{\alpha + i}{\alpha - i}$ . 以下哪项必须为真?

I  $u$  是实数。

II  $v$  的实部等于 0。

III  $w$  的虚部等于  $2w$  的虚部。

**练习 1.4** 定义  $z_1 = \frac{2+ki}{1+i}$  和  $z_2 = \frac{k+5i}{2-i}$ , 其中  $k \in \mathbb{R}$ 。如果  $z_1$  的虚部等于  $z_2$  的虚部, 证明  $z_1 - z_2 = 3$ 。

**练习 1.5** 如果  $a \in \mathbb{R}$ , 求  $\frac{4+i^5}{a+i} - i^6$  的实部。

**练习 1.6** 求  $\frac{2i^{12} + 3i^{13} + 4i^{14} + 5i^{15} + 6i^{16}}{1-i}$  的实部。

**练习 1.7** 如果  $k$  和  $\frac{5}{2-i} + ki$  是实数, 求  $k$ 。

**练习 1.8** 设  $z = (a+5)i^6 + (a-3)i^7$ , 其中  $a, z \in \mathbb{R}$ 。求  $a$ 。

**练习 1.9** 设  $u = \frac{7}{a+i}$  和  $v = \frac{7}{a-i}$ , 其中  $a$  是实数。以下哪项必须为真?

- I  $u \cdot v$  是有理数。
- II  $u$  的实部等于  $v$  的实部。
- III  $\frac{1}{u}$  的虚部等于  $\frac{1}{v}$  的虚部。





## 2. 二次函数

### 2.1 顶点

**定义 2.1.1 — 二次函数.** 对于某些实数常数  $a \neq 0, b, c$ , 二次函数  $f$  定义如下:

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

**定理 2.1.1 — 顶点式.** 对于任意实数常数  $a \neq 0, b, c$  的二次函数  $f(x) = ax^2 + bx + c$ , 存在  $h, k \in \mathbb{R}$ , 使得我们有以下顶点式:

$$f(x) = a(x - h)^2 + k$$

其中  $a$  是  $x^2$  的系数,  $(h, k)$  是极值点。

**证明.** 我们可以通过配方法推导出顶点式:

$$\begin{aligned} f(x) = ax^2 + bx + c &= a\left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a}\right) = a\left(x^2 + \frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 - \left(\frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{c}{a}\right) \\ &= a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - a\left(\frac{b}{2a}\right)^2 + c \end{aligned}$$

因为  $(x + \frac{b}{2a})^2 \geq 0$ , 所以我们有  $f(x) \geq -a(\frac{b}{2a})^2 + c$  或  $f(x) \leq -a(\frac{b}{2a})^2 + c$ , 这取决于  $a$  的符号, 且当  $x = -\frac{b}{2a}$  时,  $f$  取得极值。 ■

你可能会觉得表达式太复杂, 所以与其死记硬背这个形式, 不如使用核心思想——配方法——来推导它。

**练习 2.1** 将  $f(x) = 100x^2 + 2x + 1$  化为顶点式。

**练习 2.2** 解下列问题：

- (a) 解方程  $4x^4 + 3x^2 + 1 = 0$ 。
- (b) 求  $4x^4 + 3x^2 + 1 = y$  的最小值。

**练习 2.3** 利用  $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ ，证明对于任意实数  $x$ ，

$$x^2 > (x + 1)(x - 1) > (x + 2)(x - 2) > \dots$$

**练习 2.4** 构造一个以  $x = 1, 2$  为根，且经过点  $(3, -4)$  的二次函数。

## 2.2 二次曲线的函数图像

### 2.2.1 递增/递减函数

**定义 2.2.1 — 递增/递减函数.** 对于任意  $x_1, x_2 \in I$ ,

- 在  $I$  上递增的函数: 若  $x_1 < x_2$ , 则  $f(x_1) < f(x_2)$ 。
- 在  $I$  上递减的函数: 若  $x_1 < x_2$ , 则  $f(x_1) > f(x_2)$ 。

**推论 2.2.1** 对于  $a > 0$ , 二次函数在  $[h, \infty)$  上递增, 在  $(-\infty, h]$  上递减, 其中  $(h, k)$  是其极值点。

证明. • 将二次函数  $f$  表示为顶点式, 其中  $a > 0$ :  $f(x) = a(x - h)^2 + k$ 。

- 若  $x_2 > x_1 > h$ , 则  $(x_2 - h)^2 > (x_1 - h)^2$ 。
- 我们有  $f(x_2) - f(x_1) = a \underbrace{[(x_2 - h)^2 - (x_1 - h)^2]}_{>0}$ , 因此  $f$  的符号取决于  $a$ 。



注意, 对于  $a < 0$ , 我们可以得出类似的结论。注意  $ax^2$  是二次函数  $f$  中的主导项,  $f$  沿  $x$  轴递增/递减的速度越来越快。

### 2.2.2 对称轴

当你画一个二次函数  $f$  的图像时, 直观上, 当  $x = h$  (对称轴) 时,  $f$  取得极值。为了严格证明这一点, 我们证明以下推论:

**推论 2.2.2** 如果  $(h, k)$  是二次函数  $f(x)$  的极值点, 那么对于任意  $x \in \mathbb{R}$ , 有  $f(h + x) = f(h - x)$ 。

证明. 考虑  $f(x) = a(x - h)^2 + k$ , 对于任意  $x \in \mathbb{R}$ ,  $f(h + x) = ax^2 + k = f(h - x)$ 。



## 2.3 根

### 2.3.1 判别式 $\Delta$ 与根

**定义 2.3.1 一根.** 若  $f(p) = 0$ , 则  $p$  是函数  $f(x) = y$  的一个根/零点。

利用顶点式, 当  $f(x) = 0$  时, 我们可以找到判别式  $\Delta$  和  $f$  的根 (这留作练习)。有些题目可能会要求你求函数

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

的根, 或者解二次方程

$$ax^2 + bx + c = 0$$


。这两个问题本质上是等价的。

**定理 2.3.1** 对于实数常数  $a, b, c$  的二次函数  $f(x) = ax^2 + bx + c$ , 假设  $\alpha, \beta$  是  $f$  的根, 则有

$$\alpha = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}, \quad \beta = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

其中  $\Delta = b^2 - 4ac$ 。

当  $\Delta < 0$  时,  $\sqrt{\Delta}$  会产生两个复数, 从而给  $f$  带来两个复根 (与实  $x$  轴无交点)。当  $\Delta = 0$  时,  $\sqrt{\Delta} = 0$ , 所以  $\alpha = \beta$ , 这意味着  $f$  只有一个实根。当  $\Delta > 0$  时,  $f$  有两个不同的实根。



**练习 2.5** 证明上述一般二次函数根的表达式。

### 2.3.2 二次函数与常数函数的交点

$ax^2 + bx + c = k$  的意义可以写成如下形式：

$$\begin{cases} ax^2 + bx + c = y \\ k = y \end{cases}$$

因此，它基本上是一个二次函数与任意实数常数  $k$  的交点。要实际找到交点，你需要在脑海中有有一个 [曲线草图](#)，也就是说，这两个函数应该画在  $\mathbb{R}^2$  平面（即  $xy$  平面）上。

**练习 2.6** 画出  $3x^2 + 5x + 2 = y$  和  $y = 0$  的曲线草图，并找出它们的交点。

**练习 2.7** 画出函数

$$g(x) = \begin{cases} 3x^2 + 5x + 2 = y \\ 17 = y \end{cases}$$

的曲线草图。

### 2.3.3 两个函数的交点

在求两个函数的交点时，我们很大程度上依赖于曲线草图。考虑任意函数  $f(x)$  和  $g(x)$  以及下式：

$$\begin{cases} f(x) = y \\ g(x) = y \end{cases}$$

用这个方程组很难找到所需的交点。然而，通过考虑  $f(x) = g(x)$ ，我们有  $f(x) - g(x) = 0$ ，



我们写成：

$$\begin{cases} f(x) - g(x) = y \\ 0 = y \end{cases}$$

其中  $f(x) - g(x)$  是  $f(x)$  和  $g(x)$  的 **垂直差**。(同样，通过画图，你可以得到垂直差的几何意义)

**练习 2.8** 当  $f(x)$  和  $g(x)$  的垂直差为零时，我们得到什么样的点？

**练习 2.9** 解下列问题：

(a) 求两个函数  $f(x) = 5x^2 + 3x + 3$ ,  $l(x) = 3x + 10$  的交点。

(b) 求两个函数  $f(x) = kx^2 + 3x + 3$ ,  $l(x) = 3x + 10$  的交点。

### 2.3.4 利用集合理解两个函数的方程组

在小学阶段，我们知道任何曲线或直线都是由无穷多个点组成的集合。对于  $\mathbb{R}$  轴上的任何函数  $f$ ， $f$  是 **所有可能点**  $(x, f(x))$  的集合，其中  $(x, f(x)) \neq (f(x), x)$ 。所以我们可以考虑：

$$\begin{aligned} \begin{cases} f(x) = y \\ g(x) = y \end{cases} &\sim \begin{cases} (x, f(x)) \\ (x, g(x)) \end{cases} \\ &\sim \{(x, f(x))\} \cap \{(x, g(x))\} \end{aligned}$$

**练习 2.10** 对于任意  $x \in \mathbb{R}$ ,  $\sin x = y$  和  $1 = y$  的交集集合是有限的吗?

## 2.4 韦达定理

利用求根公式, 我们可以轻松证明韦达定理。

**定义 2.4.1 — 韦达定理.** 设  $\alpha, \beta$  是二次函数  $f$  的两个根 ( $f$  与  $x$  轴的交点),

$$f(x) = a(x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta)$$

其中  $a$  是  $x^2$  的系数。

**练习 2.11** 证明韦达定理。

**练习 2.12** 设  $\alpha, \beta$  是  $f$  的两个根。求  $f(x) = 7x^2 + 5x + 3$  的  $\alpha + \beta$  和  $\alpha\beta$ 。

**练习 2.13** 设  $f(x) = x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta$ 。定义  $\alpha := m + bi, \beta := p + qi$ 。当  $f(x)$  在实轴上有零点时, 求  $b$  和  $q$ 。

**练习 2.14** 抛物线  $\Gamma$  的方程为  $y = 2x^2 - 2kx + 2x - 3k + 8$ , 其中  $k$  为实常数。记直线  $y = 19$  为  $L$ 。

- (a) 证明  $L$  与  $\Gamma$  相交于两个不同的点。
- (b)  $L$  与  $\Gamma$  的交点为  $A$  和  $B$ 。
- (i) 设  $a$  和  $b$  分别为  $A$  和  $B$  的  $x$  坐标。证明

$$(a - b)^2 = k^2 + 4k + 23$$

- (ii)  $A$  与  $B$  之间的距离是否可能小于 4? 解释原因。

**练习 2.15** 设  $g(x) = 3x^2 + 12kx + 16k^2 + 8$ , 其中  $k$  为非零实常数。

(a) 使用配方法, 用  $k$  表示  $y = g(x)$  图像顶点的坐标。

(b) 在同一直角坐标系中, 记  $y = g(x)$  图像的顶点和  $y = 2g(-x)$  图像的顶点分别为  $A$  和  $B$ 。设  $M$  为  $AB$  上的一点, 使得  $\triangle OBM$  的面积是  $\triangle OAM$  面积的三倍, 其中  $O$  为原点。用  $k$  表示  $M$  的坐标。

**练习 2.16** 定义

$$|x| = \begin{cases} x, & x > 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

解方程  $x^2 + |x| + 3 = 0$ 。





### 3. 多项式

DSE 的大纲最近强调了处理抽象多项式的重要性。然而，大多数教科书并未提供多项式的原始定义及相关练习。本章将为读者提供更清晰的多项式处理流程。

#### 3.1 整数

我们经常讨论多项式中的 **可除性**，这引出了 **除数** 和 **余数** 的概念。回想在小学时，我们在整数除法中也使用这些术语。许多整数和多项式的定理和算法的证明实际上是相同的。例如，余数定理、长除法（短除法）和欧几里得算法（这超出了教学大纲）。

**定理 3.1.1 — 整数的余数定理.** 设  $a, b \in \mathbb{Z}$  且  $b \neq 0$ 。则存在唯一的整数  $q$  和  $r$ ，使得

$$a = bq + r \quad 0 \leq r < |b|$$

证明. 对于唯一性，假设存在  $q', r' \in \mathbb{Z}$  使得  $qb + r = q'b + r'$ ，我们有  $(q' - q)b = r' - r$ ，这意味着  $|q' - q||b| = |r' - r|$ 。假设  $q' \neq q$ ，我们有  $|q' - q| \geq 1$ ，因此

$$\max\{|r|, |r'|\} \leq |b| < |r - r'|$$

这导致矛盾。因此，我们有  $q = q'$ ，从而  $r = r'$ 。

对于存在性，如果  $b > 0$ ，存在  $q \in \mathbb{Z}$  使得  $q \leq \frac{a}{b} < q + 1$ ，这意味着  $qb \leq a < qb + b$ 。设  $r = a - qb$ ，我们有  $a = qb + r$ ，且  $0 \leq r < |b|$ ，因为  $a - qb < a < b$ 。如果  $b < 0$ ，我们考虑一个整数  $q$  使得  $q - 1 \leq \frac{a}{b} < q$ ，这意味着  $qb \leq a < qb - b$ 。取  $r = a - qb$ ，我们有  $a = r + qb$ ，且  $0 < r = a - qb < -b = |b|$ 。 ■

证明可能听起来很抽象，但定理的关键思想是直观的。考虑一个经典的时钟，时针指向小时  $\{1, 2, \dots, 12\}$ ，当时间超过"12" 时，它结束一个周期并重置到开始。这解释了为什么  $0 \leq r < |b|$ （重置操作）以及存在余数  $r$ （小时）。

## 3.2 多项式的基础

**定义 3.2.1 — 多项式.** 对于某些复常数  $a_n$  和任何  $x$  在  $\mathbb{C}$  中，我们说

$$P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$$

是一个次数为  $n$  的多项式，其中  $a_k$  是  $x^k$  的系数，且  $a_n \neq 0$ 。

注意，我们在这里考虑复多项式是为了引入下面的定理，在大多数情况下，你只需要考虑实多项式。

**定理 3.2.1 — 代数基本定理.** 任何次数为  $n$  的复多项式恰好有  $n$  个复根。这意味着对于  $\deg P \geq 1$ ，我们可以将多项式表示为

$$P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n = a_n(x - b_1)(x - b_2) \cdots (x - b_n)$$

其中  $a_i \in \mathbb{C}$  是  $x^i$  的系数，且  $P(b_1) = P(b_2) = \dots = P(b_n) = 0$ 。

注意，当  $b_m = b_p$  时，其中  $m, p$  是某些自然数，我们称它们为 **重根**，但仍然将它们计为两个根。

**练习 3.1 — 零点.** 在上述命题中，我们称点  $(b_1, P(b_1)), (b_2, P(b_2)), \dots, (b_n, P(b_n))$  为什么？

**R** 在一个次数为  $n$  的多项式  $f$  上，如果我们得到  $n$  个根和一个不同于这些根的点，那么我们不用分别寻找  $x_i$  的系数，就可以构造  $f$  的多项式表达式。

**练习 3.2 — 构造多项式.** 解答以下问题:

(a) 对于实数常数  $a, b, c, d, e, f$ , 假设  $a + bi$  和  $c + di$  是二次函数  $p$  的零点, 且  $(e, f)$  是  $p$  的一个不同的经过点, 写出  $p$  的解析表达式。

(b) 对于任意  $j \in \{1, \dots, n\}$  和实数常数  $a_j, b_j, e, f$ , 假设  $a_j + b_j i$  是多项式  $p$  的零点, 且  $(e, f)$  是  $p$  的一个不同的经过点, 其中  $\deg p = n$ , 写出  $p$  的解析表达式。

### 3.3 普遍化的余数定理

**定理 3.3.1 — 多项式的除法算法.** 对于任何多项式  $p$ ,  $d \neq 0$ , 存在两个唯一的多项式  $q$  和  $r$ , 使得

$$p = qd + r \quad \text{其中} \quad \deg r < \deg d$$

证明. 对于唯一性, 假设存在多项式  $q, r, q', r'$ , 使得  $(q - q')d = r' - r$ 。如果  $q - q' \neq 0$ , 则  $\deg(q - q') \geq 0$ , 因此

$$\deg d \leq \deg d + \deg(q - q') = \deg d(q - q') = \deg(r' - r) \leq \max\{\deg r', \deg r\}$$

这导致矛盾, 因此  $q - q' = r - r' = 0$ 。

对于存在性, 如果  $p = 0$ , 我们只需取  $q = r = 0$ 。如果  $\deg p \geq 0$ , 根据整数的余数定理, 它仍然成立。然后, 假设对于某个  $n \in \mathbb{N}$ , 命题成立, 设  $p(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^{n+1}$ ,  $d(x) = b_0 + b_1x + \dots + b_mx^m$ , 其中  $b_m, a_m \neq 0$  且  $n + 1 \geq m$  (如果  $n + 1 < m$ , 我们只需取  $q = 0, r = p$ )。然后, 令  $h(x) = p(x) - \frac{a_n}{b_m}x^{n+1-m}d(x)$ , 这允许我们消去  $p$  中的首项, 根据我们的假设, 存在多项式  $q_1, r_1$ , 使得

$$p(x) - \frac{a_n}{b_m}x^{n+1-m}d(x) = h(x) = q_1(x)d(x) + r_1(x)$$

重新排列得

$$p(x) = q_1(x)d(x) + r_1(x) + \frac{a_n}{b_m}x^{n+1-m}d(x)$$

根据我们对  $\frac{a_n}{b_m}x^{n+1-m}d(x)$  的假设, 存在多项式  $q_2, r_2$ , 使得

$$p = q_1d + r + q_2d + r_2 = (q_1 + q_2)d + (r_1 + r_2)$$

通过归纳法, 命题对于任何  $n \in \mathbb{N}$  都成立。 ■

在这里, 回想整数部分的比喻, 你可以将多项式  $d$  视为一个周期, 当  $\deg r$  试图超过  $\deg d$  时,  $r$  将被写为  $r = q_2d + r_2$  (重置到开始)。并且, 定理 3.1.1 实际上就是定理 3.3.1 在多项式的次数为零时的特例。

**推论 3.3.2 — 余数定理.** 对于多项式  $p, q, d, r$ , 假设我们有

$$p(x) = q(x)d(x) + r(x) \quad \text{其中 } \deg r < \deg d$$

如果  $x = a$  是  $d(x)$  的零点, 则  $p(a) = r(a)$ 。

**练习 3.3 — 概念.** 对于某个多项式  $p(x)$ , 如果  $p(x)$  能被  $x^2 - 3x + 2$  整除, 求  $p(x)$  的两个根。



**练习 3.4 — 拉格朗日插值.** 有一个典型的幼儿园问题:  $a_1 = 1, a_2 = 2, a_3 = 3, a_4 = ?$ 。显然  $a_4 = 100$ , 因为

$$P(x) = \frac{(x-2)(x-3)(x-4)}{(1-2)(1-3)(1-4)} + 2\frac{(x-1)(x-3)(x-4)}{(2-1)(2-3)(2-4)} \\ + 3\frac{(x-1)(x-2)(x-4)}{(3-1)(3-2)(3-4)} + 100\frac{(x-1)(x-2)(x-3)}{(4-1)(4-2)(4-3)}$$

对于  $k = 1, 2, 3, 4$ , 有  $a_k = P(k)$ 。

- (a) 验证对于  $k = 1, 2, 3, 4$ ,  $a_k = P(k)$ 。
- (b)  $P(x)$  是多项式吗?
- (c)  $P(x)$  有多少个根?

**R** 根据拉格朗日插值法, 如果我们有一组点  $(a_i, b_i)$ , 其中  $i \in \{1, \dots, n\}$ , 那么我们可以构造一个通过所有这些点  $(a_i, b_i)$  的多项式。

### 3.4 历年试题区域

**定理 3.4.1 — 多项式的恒等性.** 考虑  $P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$  和  $Q(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2 + \dots + b_nx^n$ , 对于  $x \in \mathbb{R}$ , 我们有

$$a_k = b_k \quad \text{对于} \quad k = 0, 1, \dots, n \iff P(x) = Q(x)$$

在比较系数时有一个技巧: 你可以通过求和找到对应系数。例如, 对于求  $(x+3)^4 + (x+3)^2$ , 我们首先分别找到  $x^4, x^3, \dots$  的系数。

**练习 3.5** 设  $P(x) = (3x+3)^{100} + (x+3)^{50} + x^{30}$ 。

- (a)  $P(x)$  的次数是多少?
- (b) 找到最高次项的系数。
- (c) 假设  $Q(x) = k_{100}x^{100} + k_{99}x^{99} + \dots + k_0$ , 且对于所有  $x \in \mathbb{R}$ ,  $Q(x) = P(x)$ 。求  $k_{100}$  和  $k_0$ 。



**练习 3.6 — 比较系数.** 设  $P(x) = 6x^4 + 7x^3 + ax^2 + bx + c$ , 其中  $a, b, c$  是常数。当  $P(x)$  被  $x + 2$  和  $x - 2$  除时, 余数相等。已知  $P(x) = (lx^2 + 5x + 8)(2x^2 + mx + n)$ , 其中  $l, m, n$  是常数。

- (a) 求  $l, m, n$ 。
- (b)  $P(x) = 0$  有多少个实根?

**练习 3.7 — 抽象多项式.** 多项式  $p(x)$  能被  $x - 5$  整除。当  $p(x)$  被  $x^2 + x + 1$  除时，商和余数分别为  $2x^2 - 37$  和  $cx + c - 1$ ，其中  $c$  是常数。

- (a) 求  $c$ 。
- (b) 证明  $x + 3$  是  $p(x)$  的因子。
- (c) 有人声称方程  $p(x) = 0$  的所有根都是实数。这个说法正确吗？解释你的答案。

**练习 3.8 — 曲线绘制.** 回答以下问题:

- (a) 求  $k$  的值, 使得  $x - 2$  是  $kx^3 - 21x^2 + 24x - 4$  的因子。
- (b) 设  $f(x) = 15x^2 - 63x + 72$ 。  $Q$  是曲线  $f$  在第一象限上的一个动点。  $P$  和  $R$  分别是  $Q$  到  $x$  轴和  $y$  轴的垂足。
  - (i) 设  $P$  的坐标为  $(m, 0)$ 。用  $m$  表示矩形  $OPQR$  的面积。
  - (ii) 是否存在三个不同的  $Q$  点, 使得矩形  $OPQR$  的面积为 12? 解释你的答案。

**练习 3.9** 设  $f(x) = 6x^3 - 13x^2 - 46x + 34$ 。当  $f(x)$  被  $2x^2 + ax + 4$  除时，商和余数分别为  $3x + 7$  和  $bx + c$ ，其中  $a, b$  是常数。

(a) 求  $a$ 。

(b) 设  $g(x)$  是一个二次多项式，当  $g(x)$  被  $2x^2 + ax + 4$  除时，余数为  $bx + c$ 。

(i) 证明  $f(x) - g(x)$  能被  $2x^2 + ax + 4$  整除。

(ii) 有人声称方程  $f(x) - g(x) = 0$  的所有根都是整数。你同意吗？解释你的答案。

**练习 3.10 — 三次多项式.** 设  $p(x)$  是一个三次多项式。当  $p(x)$  被  $x - 1$  除时，余数为 50。当  $p(x)$  被  $x + 2$  除时，余数为 -52。已知  $p(x)$  能被  $2x^2 + 9x + 14$  整除。

- (a) 求  $p(x)$  被  $2x^2 + 9x + 14$  除时的商。
- (b) 方程  $p(x) = 0$  有多少个有理根？解释你的答案。



**练习 3.11 — 陷阱.** 设  $f(x) = 4x(x+1)^2 + ax + b$ , 其中  $a, b$  是常数。已知  $x-3$  是  $f(x)$  的因子。当  $f(x)$  被  $x+2$  除时, 余数为  $2b+165$ 。

(a) 求  $a$  和  $b$ 。

(b) 有人声称方程  $f(x) = 0$  至少有一个无理根。你同意吗? 解释你的答案。

**练习 3.12 — 选择题.** 设  $p(x)$  是一个多项式。当  $p(x)$  被  $x+1$  除时, 余数为  $-2$ 。如果  $p(x)$  被  $x-1$  除, 求  $p(x)$  被  $x^2-1$  除时的线性余数。

**练习 3.13 — 选择题.** 设  $g(x) = ax^3 + 4ax^2 - 24$ , 其中  $a$  是常数。如果  $x+2$  是  $g(x)$  的因子, 求  $g(2)$ 。

**练习 3.14 — 选择题.** 设  $k$  是常数, 使得  $2x^4 + kx^3 - 4x - 16$  能被  $2x+k$  整除。求  $k$ 。



## 4. 測量

### 4.1 面积与体积

#### 4.1.1 测度

许多物体的面积和体积的证明超出了课程范围，即使是小学阶段教授的圆的面积，也只是简单地告诉学生其公式为  $\pi r^2$ 。对于面积，我们可以利用以下定义：

**定义 4.1.1 — 面积.** 我们定义面积：

$$A(E) := \sum_{k=1}^n (a_k - b_k)(c_k - d_k)$$

其中  $E := \coprod_{k=1}^n \langle a_k, b_k \rangle \times \langle c_k, d_k \rangle$ ,  $E$  是由一组不相交的矩形组成的点集,  $A(E)$  是这些矩形的面积。

然后，我们用矩形的并集  $E$  来包围任意形状  $S$ , 并用  $S$  来包围  $E^*$ , 从而近似所需的面积  $A(S)$ 。我们将所有矩形的并集定义为**简单区域**。

**定义 4.1.2 —  $\mathbb{R}^2$  中的 Jordan 测度.** 设  $\Omega \subset \mathbb{R}^2$  是一个非空有界集。我们定义其**内 Jordan 测度**  $\mu_*(\Omega)$  和**外 Jordan 测度**  $\mu^*(\Omega)$  为：


$$\mu_*(\Omega) := \sup\{A(S) : S \subset \Omega \text{ 且 } S \text{ 是 } \mathbb{R}^2 \text{ 中的简单区域}\}$$

$$\mu^*(\Omega) := \inf\{A(S) : T \supset \Omega \text{ 且 } T \text{ 是 } \mathbb{R}^2 \text{ 中的简单区域}\}$$

如果  $\mu_*(\Omega) = \mu^*(\Omega)$ , 则称  $\Omega$  是**Jordan 可测的**, 并定义其**面积**  $\mu(\Omega)$ 。

因此，我们可以通过使用许多小矩形来近似面积，当矩形的数量趋近于无穷大时，如果近似误差趋近于零，则可以得到精确的面积（这是微积分的基础）。对于  $\mathbb{R}^3$  的情况，可以

通过类似的论证定义体积。



### 4.1.2 物体的表面积与体积

本节重点讨论物体的表面积和体积，因为  $\mathbb{R}^2$  物体的面积已经教授过了。

**定理 4.1.1 — 物体的表面积.** 我们有以下公式：

- 球体： $4\pi r^2$ ，其中  $r$  是半径。
- 圆锥： $\pi r l + \pi r^2$ ，其中  $r$  是底面半径， $l$  是斜高。

**定理 4.1.2 — 物体的体积.** 我们有以下公式：

- 球体： $\frac{4}{3}\pi r^3$ ，其中  $r$  是半径。
- 圆锥和棱锥： $\frac{1}{3}bh$ ，其中  $b$  是底面积， $h$  是高度。

## 4.2 相似性

### 4.2.1 角度与相似三角形

有一些关于两个三角形或其他物体相似时高度比例的命题。然而，这些命题不需要记忆，因为我们可以通过画图来理解它们。

注意，如果两个相似的圆锥  $A$  和  $B$  的体积分别为  $\frac{1}{3}\pi r_1^2 h_1$  和  $\frac{1}{3}\pi r_2^2 h_2$ ，则有  $\tan \theta_1 = \tan \theta_2 = \frac{h_1}{r_1} = \frac{h_2}{r_2}$ ，其中  $\theta_1$  是圆锥  $A$  的斜高与半径之间的夹角，圆锥  $B$  类似。对于棱锥也可以得出类似的结论，我们可以用这个结论来解决以下问题。

**定理 4.2.1 — 比例.** 设  $A$  和  $B$  是两个相似的圆锥或棱锥。使用上述常用符号， $S(A)$  和  $V(A)$  分别表示  $A$  的斜表面积和体积， $B$  类似。我们有

$$h_A^2 : h_B^2 = S(A) : S(B) \quad \text{且} \quad h_A^3 : h_B^3 = V(A) : V(B)$$

将  $h$  替换为  $r$ ，对于球体也可以得出相同的结论。

**练习 4.1** 证明上述定理。

### 4.3 历年试题

**练习 4.2** 实心圆柱体  $X$  的底面半径与实心圆锥  $Y$  的底面半径相等。 $X$  和  $Y$  的高度分别为 20 cm 和 24 cm。实心圆锥  $Z$  的体积等于  $X$  和  $Y$  的体积之和。 $Z$  的底面半径等于  $X$  的底面直径。工匠发现  $Y$  的体积为  $800\pi \text{ cm}^3$ 。

- (a) 求  $Y$  的底面半径。
- (b)  $Y$  和  $Z$  是否相似？解释你的答案。
- (c) 工匠声称  $X$  和  $Y$  的侧面积之和大于  $Z$  的侧面积。你同意吗？解释你的答案。

**练习 4.3** 一个实心圆锥的高度和底面半径分别为 36 cm 和 15 cm。该圆锥被两个平行于底面的平面分成三部分，三部分的高度相等。

- (a) 求中间部分的体积。
- (b) 求中间部分的侧面积。

**练习 4.4** 两个球体的体积之和为  $324\pi \text{ cm}^3$ 。较大球体的半径等于较小球体的直径。

- (a) 求较大球体的体积。
- (b) 求两个球体的表面积之和。



**练习 4.5** 一个底面半径为 8 cm、高度为 64 cm 的直立圆柱形容器和一个底面半径为 20 cm、高度为 60 cm 的倒置圆锥形容器垂直放置。容器完全装满水。现在将容器中的水倒入圆锥形容器中。

- (a) 求圆锥形容器中水的体积（用  $\pi$  表示）。
- (b) 求圆锥形容器中水的深度。
- (c) 如果将半径为 14 cm 的实心金属球放入圆锥形容器中，并且球完全浸入水中，水会溢出吗？解释你的答案。

**练习 4.6** 一个底面积为  $84 \text{ cm}^2$ 、高度为  $20 \text{ cm}$  的实心金属棱柱被熔化并重铸为两个相似的实心棱锥。两个棱锥的底面都是正方形。较小棱锥的底面积与较大棱锥的底面积之比为  $4:9$ 。

(a) 求较大棱锥的体积。

(b) 如果较大棱锥的高度为  $12 \text{ cm}$ ，求较小棱锥的总表面积。

**练习 4.7** 一个倒置的圆锥形容器中装有一些牛奶。容器垂直放置。容器中牛奶的深度为 12 cm。彼得然后将  $444\pi \text{ cm}^3$  的牛奶倒入容器中，没有溢出。他现在发现容器中牛奶的深度为 16 cm。

- (a) 用  $\pi$  表示容器中牛奶的最终体积。
- (b) 彼得声称容器湿润的侧面积至少为  $800 \text{ cm}^2$ 。你同意吗？解释你的答案。

**练习 4.8** 一个扇形的半径和面积分别为  $12\text{ cm}$  和  $30\pi\text{ cm}^2$ 。

- (a) 求扇形的角度。
- (b) 用  $\pi$  表示扇形的周长。

**练习 4.9** 图 3 显示了一个由底面半径为 72 cm、高度为 96 cm 的倒置圆锥截去下部形成的截头圆锥形容器。容器的高度为 60 cm。容器被放置在水平桌面上。现在向容器中倒入一些水。约翰发现容器中水的深度为 28 cm。

(a) 用  $\pi$  表示容器湿润的侧面积。

(b) 约翰声称容器中水的体积大于  $0.1 \text{ m}^3$ 。你同意吗？解释你的答案。

**练习 4.10** 在一个车间中，两个底面半径为  $R$  cm 的相同实心金属圆柱被熔化并重铸为 27 个较小的相同实心圆柱，每个小圆柱的底面半径为  $r$  cm，高度为 10 cm。已知较大圆柱的底面积是较小圆柱的 9 倍。

(a) 求

(i)  $r : R$ ,

(ii) 较大圆柱的高度。

(b) 工匠声称较小圆柱和较大圆柱是相似的。你同意吗？解释你的答案。

**练习 4.11** 在图 2 中, 实心棱柱  $ABCDEFGH$  的体积为  $1020 \text{ cm}^3$ 。棱柱的底面  $ABCD$  是一个梯形, 其中  $AD$  平行于  $BC$ 。已知  $\angle BAD = 90^\circ$ ,  $AB = 12 \text{ cm}$ ,  $BC = 6 \text{ cm}$ ,  $DE = 10 \text{ cm}$ 。

- (a) 求  $AD$  的长度。
- (b) 求棱柱  $ABCDEFGH$  的总表面积。




**练习 4.12** 图 3(a) 显示了一个底面半径为 48 cm、高度为 96 cm 的实心金属圆锥。

(a) 用  $\pi$  表示圆锥的体积。

(b) 一个半径为 60 cm 的半球形容器垂直放置在水平表面上。容器完全装满牛奶。

(i) 用  $\pi$  表示容器中牛奶的体积。

(ii) 现在将圆锥垂直放入容器中，如图 3(b) 所示。工匠声称容器中剩余的牛奶体积大于  $0.3 \text{ m}^3$ 。你同意吗？解释你的答案。



## 5. 指数与对数函数

### 5.1 可逆性

**定义 5.1.1 — 函数.** 若映射  $f|_D$  满足: 对任意  $x^* \in D$ , 存在唯一  $y^* \in f(D)$  使得  $f(x^*) = y^*$ , 则称该映射为**函数**。

**定义 5.1.2 — 可逆性.** 若函数  $f|_D$  满足: 对任意  $y^* \in f(D)$ , 存在唯一  $x^* \in D$  使得  $f(x^*) = y^*$ , 则称该函数是**可逆的**。需注意的是, 若对应的 “ $f^{-1}$ ” 不满足函数定义, 则  $f$  不可逆。

对数函数是指数函数的逆函数。设  $f(x) = y$  且  $f$  是**可逆函数**, 则将其**逆函数**记作  $f^{-1}$ , 满足  $f^{-1}(y) = x$ 。

■ **例子 5.1**     •  $y = \pm\sqrt{x}$  不是函数。

- $y = x^2$  是函数。
  - $y = x^2$  不可逆。
  - 圆方程  $(x - a)^2 + (x - b)^2 = r^2$  不是函数。
  - $\sin \theta, \cos \theta, \tan \theta$  在  $(0^\circ, 90^\circ)$  上可逆, 但在  $(0^\circ, 180^\circ)$  上不可逆 (后续将深入学习)。
  - $a^x$  是函数且可逆。
- 

### 5.2 对数函数的算术规则

**定义 5.2.1** 对于任意  $a \in \mathbb{R}_{>0} \setminus \{1\}$ , 若  $0 < y = a^x$  且  $x \in \mathbb{R}$ , 则定义对数函数为:

$$\log_a y = x$$

■ 其中  $a$  称为对数函数的底数。

**练习 5.1** 证明以下命题：

- (a) 对于任意  $a \in \mathbb{R}_{>0} \setminus \{1\}$ ,  $\log_a 1 = 0$ 。
- (b) 对于任意  $a \in \mathbb{R}_{>0} \setminus \{1\}$ ,  $\log_a a = 1$ 。
- (c) 解释为什么底数  $a \in \mathbb{R}_{>0} \setminus \{1\}$ 。

接下来证明对数函数的算术规则：

**定理 5.2.1** 对于任意  $y_1, y_2 \in \mathbb{R}_{>0}$  和  $a \in \mathbb{R}_{>0} \setminus \{1\}$ , 有

$$\log_a y_1 y_2 = \log_a y_1 + \log_a y_2$$

证明. 存在  $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$  使得

$$a^{x_1} = y_1 \quad \text{且} \quad a^{x_2} = y_2$$

因此  $a^{x_1+x_2} = y_1 y_2$ 。根据  $\log_a y_1 = x_1$  和  $\log_a y_2 = x_2$ , 可得

$$\log_a y_1 + \log_a y_2 = x_1 + x_2 = \log_a y_1 y_2$$

■

**定理 5.2.2** 对于任意  $y \in \mathbb{R}_{>0}$ ,  $a \in \mathbb{R}_{>0} \setminus \{1\}$  和  $b \in \mathbb{R}$ ,

$$\log_a y^b = b \log_a y$$

证明. 存在  $x \in \mathbb{R}$  使得  $a^x = y$ , 则

$$a^{bx} = y^b$$

因此  $bx = \log_a y^b$ 。故

$$b \log_a y = bx = \log_a y^b$$

■

**练习 5.2** 展开表达式 ( $a, b, c, d$  为实数常数):

$$\log_a \frac{b}{c^d}$$

其中  $\frac{b}{c^d} > 0$ 。

**练习 5.3** 对于定义在  $\mathbb{R}$  上的函数  $f > 0$ , 证明:

$$\log_a f(1)f(2) \cdots f(n) = \log_a f(1) + \log_a f(2) + \dots + \log_a f(n)$$

其中  $a \in \mathbb{R}_{>0} \setminus \{1\}$ 。

**练习 5.4** 解下列方程:

(a)  $(\log_2 x)^2 - 2 \log_2 x + 1 = 0$

(b)  $(\log_2 x)^3 - 6(\log_2 x)^2 + 11 \log_2 x - 6 = 0$


回忆一下增/减函数的定义, 我们有以下例子:

- **例子 5.2**
  - $x$  在  $(-\infty, \infty)$  上递增。
  - $x^2$  在  $(-\infty, 0)$  上递减, 在  $(0, \infty)$  上递增。
  - $\sqrt{x}$  在  $(0, \infty)$  上递增。
  - $a^x$  在  $(-\infty, \infty)$  上递增。
  - 当  $a \in (0, 1)$  时,  $\log_a x$  在  $(0, \infty)$  上递减。
  - 当  $a \in (1, \infty)$  时,  $\log_a x$  在  $(0, \infty)$  上递增。


■

**推论 5.2.3** 任意递增或递减函数皆可逆。

当  $a > 1$  时,  $a^x = y$  的图像满足: 若  $x_2 > x_1$ , 则  $a^{x_2} > a^{x_1}$ , 因此  $a^x$  是**增函数**。当  $0 < a < 1$  时, 若  $x_2 > x_1$ , 则  $a^{x_1} > a^{x_2}$ , 因此  $a^x$  是**减函数**。两种情况下函数值均为正, 且增减速度随  $x$  增大而加快。基于这些性质可绘制曲线:



由于  $a^y = x$  等价于  $\log_a x = y$ , 故  $\log_a$  是  $a^x$  的反函数。其图像可通过交换  $a^x = y$  的  $x, y$  值得到。



**定理 5.2.4** 对于任意  $a > 0$ ,  $a^x = 1$  当且仅当  $x = 0$ 。

证明. 设  $x = x_1 + x_2$

$$a^x = 1$$

$$a^{x_1} = a^{-x_2}$$

由于  $a^x$  是严格递增函数, 可得  $x = x_1 + x_2 = 0$ 。相反方向显然成立。 ■

**定义 5.2.2** 我们有以下定义:

- 全局极值: 在  $\mathbb{R}$  上的极值
- 局部极值: 在  $x$  某邻域内的极值

**定理 5.2.5** 函数  $h(x) = a^x - x$  存在唯一的全局/局部极小值。



证明. 假设  $x_2 > x_1 > 0$ , 令  $u := x_2 - x_1$ , 则有

$$h(x_2) - h(x_1) = a^{x_2} - a^{x_1} + x_1 - x_2 = a^{x_1}a^u - u - a^{x_1}$$

当且仅当  $x_1 > \frac{1}{\ln a} \ln \frac{u}{a^u - 1}$  时,  $a^{x_1}a^u - u - a^{x_1} > 0$  成立。对于  $a^{x_1}a^u - u - a^{x_1} > 0$  的情况同理。由于  $u$  可与  $x_1$  无关, 故存在  $\xi$  使得  $h$  在  $(-\infty, \xi)$  递减, 在  $(\xi, \infty)$  递增。因此存在唯一的全局/局部极小值  $\min_{x \in \mathbb{R}} h = h(\xi)$ 。 ■

**定理 5.2.6** 对于任意  $a > 1$ , 均有  $a^x \geq x$ 。特别地, 存在某些  $a > 1$  和  $x \in \mathbb{R}$  使得  $a^x = x$ 。

证明. • 当  $x \leq 0$  时, 显然有  $a^x > 0 \geq x$ 。对于  $x > 0$  的情况, 由于  $a > 1$ , 可设  $a = 1 + \varepsilon$  (其中  $\varepsilon > 0$ )。根据二项式定理 (我们会迟些证明):

$$a^x = (1 + \varepsilon)^x \geq \sum_{k=0}^{[x]} C_k^{[x]} \varepsilon^k \geq \frac{[x]! \varepsilon^j}{([x] - j)!} \cdot \frac{1}{j!}$$

这里给定常数  $j \in \mathbb{Z}$ ,  $[x]$  表示  $x$  的整数部分。当  $\varepsilon \geq 1$  时取  $j = 1$ , 可得对任意整数  $x \in \mathbb{Z}$  有  $a^x \geq x$ 。

• 当  $\varepsilon < 1$  时, 对于充分大的  $x$ ,  $[x]$  可以足够大, 使得:

$$\frac{[x]! \varepsilon^j}{([x] - j)!} = \prod_{i=0}^{j-1} ([x] - i) \varepsilon \geq \underbrace{\left( \prod_{i=k}^{j-1} ([x] - i) \varepsilon \right)}_{:= C < 1} [x][x-1] \varepsilon \geq [x]j!, \quad ([x] - (k-1))\varepsilon \geq 1$$

其中  $k \in [0, j-1]$  为常数。因此对于任意  $x \in \mathbb{Z}$  和  $a > 1$ , 都有  $a^x \geq x$ 。

• 假设存在  $x^* \in \mathbb{R}$  使得  $a^{x^*} < x^*$ 。由于  $a^x$  连续, 必存在  $\lambda \in ([x^*], x^*)$  和  $\mu \in (x^*, [x^*] + 1)$  满足:

$$a^\lambda = \lambda, \quad a^\mu = \mu$$

但根据定理 5.2.2, 存在  $\xi$  使得  $h$  在  $(-\infty, \xi)$  递减, 在  $(\xi, \infty)$  递增, 导致矛盾。因此对任意  $a > 1$  都有  $a^x \geq x$ 。特别地, 若  $a > 1$  可表示为  $a = k^{k^{-1}}$  ( $k$  为常数), 则当  $x = k$  时  $a^x = x$ 。 ■

**R** 这或许解释了为何 2025 年 DSE 多选题中出现争议性试题。

## 5.3 对数不等式

DSE 考试常要求用对数解不等式。注意增函数 (如  $\log x$  和  $10^x$ ) 会保持不等号方向。



**推论 5.3.1** 对任意增函数  $f$ , 若  $u > v$ , 则

$$f(u) > f(v)$$

证明. 由定义可得。 ■

**练习 5.5** 求  $39^x > 100$  的解区间。

**练习 5.6** 利用示例 5.2 中的函数, 结合不等式  $2 < 5$  和  $5 < 7$ , 构造相应的函数不等式。

**5.4 历年试题精选**

**练习 5.7** 15. 设  $a, b$  为常数,  $G$  为  $y = a + \log_b x$  的图像。已知  $G$  的  $x$  截距为 9, 且经过点  $(243, 3)$ 。用  $y$  表示  $x$ 。

**练习 5.8** 在  $\log_4 x$  (横轴) 与  $\log_8 y$  (纵轴) 坐标系中, 设线性函数  $v = f(u)$  的斜率为  $-\frac{1}{3}$  且横轴截距为 3。用  $y = Ax^k$  的形式表示  $x$  与  $y$  的关系 ( $A, k$  为常数)。

**练习 5.9** 在  $\log_5 x$  (横轴) 与  $\log_5 y$  (纵轴) 坐标系中, 若线性函数  $v = f(u)$  通过点  $(0, -4)$  和  $(0, 2)$ , 则下列哪项必为真?

A.  $xy^2 = 625$

B.  $x^2y = 625$

C.  $\frac{y^2}{x} = 625$

D.  $\frac{y}{x^2} = 625$

**练习 5.10** 设  $a, b, c$  为正常数。在同一直角坐标系中,  $y = a + \log_b x$  与  $y = \log_c x$  的图像分别与  $x$  轴交于点  $S$  和  $T$ , 原点为  $O$ 。求  $OT : OS$  的比值。

**练习 5.11** 在同一坐标系中考虑函数  $y = a^x$  和  $y = b^x$  的图像, 其中  $a, b$  为正常数。若  $y = a^x$  的图像是  $y = b^x$  关于  $y$  轴的镜像 (且  $y = a^x$  严格递增), 则下列哪些选项正确?

- A.  $a < 1$
- B.  $b > 1$
- C.  $ab = 1$

**练习 5.12** 设  $y = ab^x$  ( $a, b$  为常数), 试绘制  $x$  与  $\log_y y$  的关系图像。

**练习 5.13** 在同一坐标系中考虑函数  $y = b^x$  和  $y = c^x$  ( $b, c$  为正常数)。若水平直线  $L$  分别与  $y$  轴、 $y = b^x$ 、 $y = c^x$  相交于点  $A, B, C$ ，则下列哪些命题成立？

I.  $b < c$

II.  $bc > 1$

III.  $\frac{AB}{AC} = \log_b c$

**练习 5.14** 下列哪个数值最大？

A.  $12^{241}$

B.  $24^{214}$

C.  $412^{142}$

D.  $42^{124}$

**练习 5.15** 函数  $f(u) = v$  描述  $x$  与  $\log_2 y$  的线性关系。已知当  $(u, v) = (x, \log_9 y)$  时,  $f$  通过点  $(0, -2)$  和  $(4, 0)$ 。若  $y = ab^x$ , 则  $b$  的值为?

- A.  $-2$
- B.  $\frac{1}{81}$
- C.  $\frac{1}{2}$
- D.  $3$

**练习 5.16** 图中直线  $L$  表示  $\log_4 x$  与  $\log_4 y$  的关系。已知当  $(u, v) = (\log_4 x, \log_4 y)$  时,  $L$  通过点  $(1, 2)$  和  $(9, 6)$ 。若  $y = kx^a$ , 则  $k$  的值为?

- A.  $\frac{1}{2}$
- B.  $\frac{3}{2}$
- C.  $2$
- D.  $8$



**练习 5.17** 设  $x-y$  平面上函数  $y = \log_a x$  和  $y = \log_b x$  的图像 ( $a, b$  为正常数), 且对所有  $x > 1$  有  $\log_a x > \log_b x$ 。若垂直线与这两个对数曲线及  $x$  轴分别交于点  $A, B, C$ , 则下列哪些命题成立?

I.  $a > 1$

II.  $a > b$

III.  $\frac{AB}{BC} = \log_a \frac{b}{a}$