

## Molekulsko-kinetička teorija gasova

### Zadaci za domaći

---

1. Izračunati zapreminu jednog mola gasa pri normalnim uslovima:  
 $p = 101.3 \text{ kPa}$ ,  $T = 273.15 \text{ K}$ .
2. Na visinama od nekoliko stotina kilometara nad Zemljom molekuli atmosfere imaju brzine koje odgovaraju temperaturama od nekoliko hiljada stepeni. Zašto se ne istope sateliti koji kruže oko Zemlje na tim visinama?
3. Planetu mase  $m$  i poluprečnika  $r$  okružuje atmosfera stalne gustine. Molarna masa molekula atmosfere je  $M$ . Naći temperaturu u atmosferskom sloju uz površinu planete, ako je debljina tog sloja iskazana kao  $h \ll r$ .
4. Stakleni balon je napunjen nekim gasom na pritisku  $p$ . Masa balona sa gasom je  $m$ . Balon se otvori, pritisak u njemu se smanji na  $p_1$ , te se onda ponovo zatvori. Tada je masa balona sa gasom  $m_1$ . Kolika je masa toga gasa koji ispunjava balon pri normalnom atmosferskom pritisku  $p_0$ ? Smatrati da je temperatura gasa u svim slučajevima ista (ne znači da treba primijeniti Bojl-Mariotov zakon).
5. U sudu zapremine  $1 \text{ l}$  nalazi se  $0.28 \text{ g}$  azota ( $N_2$ ) zagrijanog do temperature od  $1500 \text{ K}$ . Pri toj temperaturi,  $30\%$  molekula azota je disosiovano<sup>1</sup> na atome. Odrediti pritisak gasa u sudu.
6. Cilindričan horizontalni sud podijeljen je pokretnim klipom na dva jednaka dijela. Sa obje strane klipa nalazi se neki gas. Kad se sud postavi u vertikalni položaj, pri temperaturi od  $300 \text{ K}$ , u ravnotežnom stanju, zapremina ispod klipa je duplo manja nego iznad. Do koje temperature treba zagrijati gas u donjem dijelu suda, da bi se izjednačile zapremine gasa u oba dijela? Trenje je zanemarljivo, nema kondukcije.
7. Zatvoreni sud  $A$  zapremine  $9 \text{ l}$ , spojen je kratkom cjevčicom sa zatvorenim sudom  $B$  zapremine  $1 \text{ l}$ . U cjevčici postoji ventil koji dozvoljava prolaz gasa iz suda  $A$  u sud  $B$ , samo ako je pritisak u prvom barem za  $120 \text{ kPa}$  veći nego u drugom sudu. U početnom trenutku, u sudu  $A$ , gas je na temperaturi od  $300 \text{ K}$  i pritisku od  $100 \text{ kPa}$ , a u sudu  $B$  je vakuum. Kad se ventil otvori, cijeli sistem se zagrije do  $420 \text{ K}$ . Koliki su tada pritisci u sudovima  $A$  i  $B$ ?

---

Zadaci 6. i 7. su nešto teži od ostalih.

---

<sup>1</sup>Disosijacija je reverzibilno razlaganje materije. Preciznije, razlaganje molekula na atome ili manje molekule. U našem slučaju, odgovarajuća reakcija je:  $N_2 \rightarrow 2N$ .

## Termodinamika

### Zadaci za domaći

---

1. Cilindrični sud zatvoren sa obje strane, podijeljen je na dva jednaka dijela klipom koji može da klizi bez trenja. U obje polovine cilindra nalazi se vazduh jednakih temperatura i pod istim pritiscima. Odrediti za koliko će se pomjeriti klip ako se vazduh u jednoj polovini cilindra dovede na temperaturu od  $302\text{ K}$ , a vazduh u drugoj polovini na temperaturi  $256\text{ K}$ . Dužina cilindra iznosi  $l = 70\text{ cm}$ . Smatrati da zidovi suda i klip ne provode toplotu. Debljinu suda zanemariti.
2. Idealan gas se prevodi iz stanja 1 u stanje 2 na dva načina. Na prvi način gas se iz stanja 1 u stanje 2 prevodi prvo po izobari, a potom po izohori, a na drugi način prvo po izohori, a zatim po izobari. Odrediti razliku dovedenih količina toplote u ova dva slučaja. Korisno je procese nacrtati na  $p - V$  dijagramu, a takođe treba znati izraz  $Q = n \cdot C_i \cdot \Delta T$ , gdje je  $C_i$  toplotni kapacitet pri konstantnoj zapremini ( $C_V$ ) ili toplotni kapacitet pri konstantom pritisku ( $C_P$ ).
3. Jednoatomijski gas mase  $m$  i molarne mase  $M$  nalazi se pod pritiskom  $p_1$ . Iz tog stanja gas se izotermiski sabija do pritiska  $p_2$ , pri čemu se izvrši rad  $A$ . Zatim se gasu, pri konstantnom pritisku, preda količina toplote jednaka onoj koju je on otpustio pri sabijanju. Odrediti krajnju temperaturu gasa.
4. Jedan mol jednoatomijskog gasa prvo se zagrijava, a zatim hladi, tako da se proces sastoji od izohore, izoterme i izobare, a krajnje stanje se poklapa sa početnim. Ako su  $p_1$  i  $V_1$ , pritisak i zapremina gasa u početnom stanju, a  $p_2$  pritisak posle izohorskog zagrijavanja, odrediti količinu toplote koju gas otpusti tokom hlađenja.
5. U vertikalnom cilindričnom sudu, ispod lakog klipa, nalazi se jedan mol gasa na temperaturi  $T$ . Iznad klipa je vazduh na atmosferskom pritisku. Koliki rad treba izvršiti da bi se, polako podižući klip, zapremina gasa povećala  $k$  puta pri konstantnoj temperaturi? Trenje je zanemarljivo.
6. Zatvoren, toplotno izolovan, horizontalni cilindrični sud podijeljen je pokretnim klipom na dva dijela. U oba dijela suda nalazi se gas u jednakim zapreminama  $V_0$ , na jednakim pritiscima  $p_0$  i na istoj temperaturi. Koliki rad treba izvršiti, lagano pomjerajući klip pri konstantnoj temperaturi, da bi zapremina jednog dijela suda bila  $q$  puta veća od zapremine drugog dijela? Trenje je zanemarljivo.