

40. Проверка гипотез о совпадении средних двух нормальных совокупностей.



Status

Completed

Теорема Стьюдента

если средние и дисперсии совпадают n, m - размеры независимых нормальных выборок X, Y соответственно.

$$\frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{1/n + 1/m} \sqrt{\frac{nS_X^2 + mS_Y^2}{n+m-2}}} \sim T_{n+m-2}$$



Тут требуется, чтобы дисперсии совпадали! Иначе нельзя применить такой критерий!

Доказательство

$$\bar{X} \in \Phi_{\alpha_1, \sigma^2/n}, \quad \bar{Y} \in \Phi_{\alpha_2, \sigma^2/m},$$

имеем

$$\bar{X} - \bar{Y} \in \Phi_{\alpha_1 - \alpha_2, \sigma^2(1/n + 1/m)}$$

и после стандартизации

$$\frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\alpha_1 - \alpha_2)}{\sqrt{\sigma^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{m} \right)}} \in \Phi_{0,1}.$$

Далее, по свойству распределения хи-квадрат

$$\frac{nS_X^2}{\sigma^2} + \frac{mS_Y^2}{\sigma^2} \in \chi_{n+m-2}^2;$$

эта случайная величина не зависит от $\bar{X} - \bar{Y}$. Таким образом,

$$\frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\alpha_1 - \alpha_2)}{\sigma \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}} : \sqrt{\frac{1}{n+m-2} \frac{nS_X^2 + mS_Y^2}{\sigma^2}} \in T_{n+m-2}.$$

Если верна гипотеза H_1 , то $\alpha_1 - \alpha_2 = 0$ и

$$\psi = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}} \sqrt{\frac{nS_X^2 + mS_Y^2}{n+m-2}}} \in T_{n+m-2}.$$

Критерий Стьюдента (о совпадении средних)

τ - квантиль данного распределения.

$$d = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{1/n + 1/m} \sqrt{\frac{nS_X^2 + mS_Y^2}{n+m-2}}} \sim T_{n+m-2}$$

$$\delta = \begin{cases} 0, & |d| < \tau_{1-\epsilon/2} \\ 1, & |d| \geq \tau_{1-\epsilon/2} \end{cases}$$



Подумай про квантили! Тут распределение Стьюдента, оно похоже на нормальное распределение, оно симметричное, значит можно взять один квантиль и взять по модулю **ИЛИ** с таким же успехом поставить двойное неравенство где есть еще квантиль $\tau_{\epsilon/2} = -\tau_{1-\epsilon/2}$.

Свойства

1. Критерий состоятельный.

1. **Доказательство.** Если средние разные, то $\bar{X} - \bar{Y}$ стремится к некоторой константе, $\sqrt{\frac{nS_X^2 + mS_Y^2}{n+m-2}}$ стремится к константе, $\sqrt{1/n + 1/m}$ стремится к нулю, то есть дробь стремится к бесконечности. А квантили стремятся к квантилям нормального распределения, то есть не к бесконечности.
2. Критерий имеет размер $1 - \epsilon$.
3. Реально допустимый уровень значимости: $\epsilon^* = P(\eta \geq d) = 1 - T_{n+m-2}(d)$.