原位（电化学）拉曼-预约单

2311149389

特别说明： 1、50-2000cm-1
2、增加了一个1.35V
3、先测一下非原位的及时反馈下数据

实验留言	
1)在原位测试前，请先测试1号和2号样品，反馈数据后再决定是否测原位拉曼，1号样品同时也是原位样品 2)电解时间请尽量保证，以防电解不充分，催化剂没有发生重构，从而没有变化或变化不明显。 3)请在测试后提供一段关于in-situ SERS Raman的测试细节说明	
实验基本信息	
实验项目：	原位（电化学）拉曼
订单编号：	2311149389
用户所在分部：	厦门办事处
样品寄送地址：	厦门办事处
下单时间：	2023-11-14 15:16:20
样品数量：	1
基本需求	
是否回收样品 ：	不需要
A组样品信息 样品数：1 样品编号：1	
样品成分及状态	样品成分Ni Fe P K 粉末
原位类型	SERS
测试体系类型	电催化体系
是否需要通气	是
气氛类型	氩气
电化学测试方法	i-t
采点模式	不同电压点测试

测试电压	1）测试开路电位，OCP条件下测试第一个点； 2）外加电位为1.1 V vs RHE(0.17V vs HgO)，电解6 min-10 min； 3）外加电位为1.2 V vs RHE(0.27V vs HgO)，电解6min-10 min； 4）外加电位为1.3 V vs RHE(0.37V vs HgO)，电解6 min-10 min； 5）外加电位为1.4 V vs RHE(0.47V vs HgO)，电解6 min-10 min； 6）外加电位为1.45 V vs RHE(0.52V vs HgO)，电解6 min-10 min； 7）外加电位为1.5 V vs RHE(0.57V vs HgO)，电解6min-10 min； 8）外加电位为1.55 V vs RHE(0.62V vs HgO)，电解6min-10 min； 9）外加电位为1.6 V vs RHE(0.67V vs HgO)，电解6min-10 min； 10）外加电位为1.65 V vs RHE(0.72V vs HgO)，电解6 min-10 min； 11）外加电位为1.7 V vs RHE(0.77V vs HgO)，电解6 min-20 min； 12）外加电位为1.8 V vs RHE(0.87V vs HgO)，电解6 min-10 min； 13）外加电位为1.9 V vs RHE(0.97V vs HgO)，电解6 min-10 min； 电解时间请尽量保证，以防电解不充分，催化剂没有发生重构，从而没有变化或变化不明显。
电解液成分	1 M KOH PH=14
Raman扫描范围	50~4000
激光器波长	532
对接单和参考文献打包上传	https://shiyanjia-files.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/ufile/20231114151256wGHJ.rar
特殊要求	
无	
是否有附件：	无附件

测试过程中发现结果异常等，请及时通过系统进行【问题反馈】