VDS 链霉亲和素分选磁珠产品说明书

产品简介

VDS链霉亲和素分选磁珠是在150-200nm的可降解葡聚糖纳米磁珠表面共价偶联链霉亲和素蛋白。根据需求搭配生物素化抗体可实现温和分选，获得高纯度，高活率，高得率的目的细胞，轻松对接下游培养、测序等实验。

基质	可降解葡聚糖磁珠
粒径	150-200nm
表面配基	链霉亲和素
反应种属	生物素化分子
处理细胞数	Up to 1 x 10^9 total cells
性状	棕色溶液
保存液	PBS (PH 7.2)，0.5% BSA，2 mM EDTA

使用方法

1、样本准备

1) 当样本为人外周血时，建议使用密度梯度离心法获得外周血单个核细胞(PBMC)；对于其他组织，可使用单细胞悬液制备仪或手动制备单细胞悬液。
2) 较多的死细胞或红细胞可能会影响分选效果，可利用死细胞去除试剂和红细胞裂解液去除死细胞和红细胞（注：将 10x 的红细胞裂解液稀释到 1x 工作浓度，加入和样本体积相同的体积稀释后的红细胞裂解液，室温裂解 15min，1500rpm，离心 5min，重悬后使用）。
3) 为了获得最佳性能，用 30μm 细胞滤器过滤细胞悬液，去除细胞团块。

2、磁性分选

注：以下步骤给出的试剂推荐用量可处理 1×10^7 个总细胞，如细胞数量少于 1×10^7 或多于 1×10^7，应按比例相应减少或增加试剂用量。如果使用本产品进行阴性分选，只需执行 1）-5）步骤；如果使用本产品进行阳性分选，则需要执行 1）-8）步骤。

1) 取 1×10^7 个细胞至 5mL 试管中 1500rpm，离心 5min。
2) 弃上清，将细胞沉淀重悬于 100μL 细胞分选缓冲液（分选缓冲液：10mM PBS， PH=7.2，2% FBS，1mM EDTA）。随后加入生物素化抗体（针对不同抗体和标记细胞占比，抗体用量需要优化），混合均匀后室温孵育 15min。
3) 加入 3mL 细胞分选缓冲液重悬样品，1500rpm 离心 5min，弃上清，用 100μL 细胞分选缓冲液重悬细胞。
4) 加入 20μL VDS 链霉亲和素分选磁珠，混合均匀后室温孵育 15min。
5) 将孵育完成后的样品，放置在 VDO 5mL 单孔超强磁极中（货号：CS2001-1），磁吸 3min，收集上清，这是未标记的细胞。
6) 将样品从磁极上取下，加入 3mL 细胞分选缓冲液重悬磁性标记的细胞，吹打均匀（请勿涡旋）磁吸 3min，移除上清。
7) 重复步骤 6）
8) 用 200μL 分选缓冲液重悬细胞，此为阳性细胞群。

注意事项

1. 磁珠与细胞孵育时需要温和地彻底混匀，以提高分选效率。
2. 本产品仅适用于体外细胞培养，不可直接用于临床治疗。

电话：+86-512-80905220
网址：www.vdobiotech.com.cn
地址：苏州市星湖街 218 号生物医药产业园 C18
Suzhou Vdobiotech Co.,Ltd.
苏州为度生物技术有限公司

产品列表

名称	货号	规格
VDS 链霉亲和素	CS1011-1	200μL
分选磁珠	CS1011-2	2x1mL

储存条件及有效期


2-8℃储存，切勿冷冻，有效期 12 个月。

应用案例

1. 阴性分选：CD3+ T 细胞

使用VDS链霉亲和素分选磁珠搭配生物素化的抗体组合对PBMC样本中的T细胞进行阴性分选。对分选前和分选后的样本进行CD3-FITC荧光染色，并通过流式细胞术进行分析。


分选前　　分选后



2. 阳性分选：CD3+ T 细胞

使用 VDS 链霉亲和素分选磁珠搭配生物素化的 CD3 抗体对 PBMC 样本中的 T 细胞进行阳性分选。对分选前和分选后的样本进行 CD3-FITC 荧光染色，并通过流式细胞术进行分析。

分选前　　分选后



其他

如需定制其他规格的产品请电话联系 0512-80905220 或发送邮件至 vdo@vdobiotech.com 详询。