VDS CD138 分选试剂盒（抗人）产品说明书

产品简介

VDS CD138 分选试剂盒（抗人）可以从全血或骨髓样本中高效地分选 CD138 阳性细胞。通过在磁珠上偶联抗人 CD138 单克隆抗体，实现 CD138 阳性细胞的分选。纳米级 CD138 分选磁珠与全血或骨髓孵育并进行磁性分离，使 CD138 阳性细胞富集并分离，从而达到纯化 CD138 阳性细胞的作用。

基质	可降解葡聚糖磁珠
粒径	150-200nm
表面配基	anti-human CD138 antibody
反应种属	人
处理细胞数	最多 100mL 全血或骨髓
性状	棕色溶液
保存液	PBS (PH 7.2)，0.5% BSA，2 mM EDTA

使用方法:

1、试剂准备

分选缓冲液：磷酸盐缓冲液（PBS），pH 7.2，0.5% 牛血清白蛋白 (BSA)，2 mM EDTA。

注：▲可用人血清白蛋白 (HSA)、人血清或胎牛血清 (FBS) 代替 BSA。

▲可用柠檬酸钠代替 EDTA。

2、样本预处理

全血

收集全血到抗凝管中

骨髓

1) 用 5-10 倍的 DPBS 稀释样本，充分混匀。
2) 用 70μm 的滤网过滤样本以去除骨渣及细胞团块。
3) 300g 离心 10min，离心机降速设为 0。
4) 用吸管小心去除上层的血浆，注意不要吸到细胞层。
5) 用适量细胞分选 buffer 重悬细胞

3、磁性流程

1) 向 1mL 抗凝全血或骨髓中，加入 9 倍体积的红细胞裂解液。如 1mL 新鲜全血加入 9mL 红细胞裂解液，轻轻涡旋或颠倒混匀。
2) 冰上放置 15 分钟，其间轻轻涡旋混匀两次，红细胞裂解后，溶液应清亮透明。
3) 4℃，450×g 离心 10 分钟以沉淀白细胞，小心吸弃上清液。
4) 用 100μL 分选 buffer 重悬细胞，加入 100μL 分选磁珠。
5) 混合均匀，室温（19-25℃）孵育 10min。
6) 加入 3mL 分选 buffer，置于 VDO 5ml 单孔超强磁极中（货号：CS2001-1），静置 5min。
7) 倾倒磁力架以弃去上清（此部分为阴性组分），再加入 3mL 重悬 buffer，置于磁力架上静置 5min。
8) 重复上一步。
9) 倾倒磁力架以弃去上清，用适量 PBS 重悬吸附于管壁的部分（此为阳性组分）。

电话：+86-512-80905220
网址：www.vdobiotech.com.cn
地址：苏州市星湖街 218 号生物医药产业园 C18

Suzhou Vdobiotech Co.,Ltd.
苏州为度生物技术有限公司

10) 细胞可以用于下游实验。

注意事项:

本产品仅适用于体外细胞培养，不可直接用于临床治疗。

产品列表


名称	货号	规格
VDS CD138 分选试剂盒（抗人）	CS1013-1	1x1mL
	CS1013-2	1x5mL
	CS1013-3	2x5mL

储存条件及有效期

2-8℃储存，切勿冷冻，有效期 12 个月。

应用案例:

起始样本为加入 10-20%的 U266 细胞系的 PBMC 样本，使用 VDS CD138 分选试剂盒（抗人）及配套磁性分离器分选 CD138 阳性细胞，分选结束后用 CD138-PE 荧光抗体对细胞进行染色，并通过流式细胞术进行分析。



其他

如需定制其他规格的产品请电话联系 0512-80905220 或发送邮件至 vdo@vdobiotech.com 详询。