磁性微球产品说明书

产品描述:

本产品（MS04T）适用于从真核总 RNA 或直接从细胞、动物和植物组织的粗提物中快速分离完整的高纯度 mRNA。分离的 mRNA 可直接用于分子生物学的大多数下游应用，如 RT-PCR、固相 cDNA 文库构建、S1 核酸酶分析、核糖核酸酶保护分析、引物延伸、斑点杂交、体外翻译实验、RACE、削减杂交、northern 分析、基因克隆和基因表达分析。

Oligo(dT)30 磁性微球基于碱基互补配对原则以及 mRNA 含有 poly(A)尾巴的特点设计而成。退火后，将反应管置于磁力架上，浓缩收集与磁性微球结合的 mRNA，弃去含杂质的上清液。该方案可在 15 分钟内进行，无需制备总 RNA 或进行其他纯化步骤。磁性微球表面的 Oligo(dT) 30 可以用于捕获 mRNA，且在逆转录酶的作用下，以 Oligo(dT) 30 为引物，可合成第一链 cDNA。

产品信息:

固含	1.0%（1ml 溶液中含有 10mg 微球颗粒）
平均粒径	0.7μm
微球表面	$Oligo(dT)_{30}$
密度	1.4 g/cm^3
保存溶液	PBS pH 7.4，含 0.1% Proclin 300

结合能力:

每 100μL（1 mg）磁性微球可分离高达 10μg mRNA，取决于组织或细胞类型及 mRNA 的表达水平。

储存条件及有效期:

2℃-25℃，切勿冷冻，有效期 3 年。

注意事项:

1. 切勿冷冻，25℃以上应加少量冰块保持适宜的温度，切勿将冰块与磁珠直接接触；
2. 对于小体积样本，在洗涤过程中完全去除所有缓冲液是非常重要的；
3. 建议 Oligo(dT)30-mRNA 复合物立即用于 RT-PCR 实验；
4. 如需储存，从磁性微球上洗脱 mRNA 并进行冷冻保存；
5. 取用磁珠前应当充分振荡重悬均匀，移取过程中应避免气泡；
6. RNA 酶非常稳定，一般反应不需要辅助因子。在实验操作过程中可以根据情况添加一些 RNase 抑制剂，这个是非必需的。但是如果需要保存洗脱后的 mRNA，推荐添加 RNase 抑制剂；
7. 本产品仅用于科研。

其他:

如需定制其他规格的产品请电话联系 0512-80905220 或发送邮件至 vdo@vdobiotech.com 详询。

电话：+86-512-80905220
网址：www.vdobiotech.com.cn
地址：苏州市星湖街 218 号生物医药产业园 C18

Suzhou Vdobiotech Co.,Ltd.
苏州为度生物技术有限公司