Тема 14. ПСИХОТРОПНЫЕ СРЕДСТВА УГНЕТАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ

Вопросы для самостоятельной подготовки

1. Понятие и составляющие психики. Основные психические расстройства.
2. Классификация психотропных средств. Этические аспекты использования психотропных средств.
3. Нейролептики: механизм действия, фармакологические эффекты, показания, противопоказания, побочные эффекты.
4. Транквилизаторы (анксиолитики): механизм действия, фармакологические эффекты, показания, противопоказания, побочные эффекты.
5. Нормотимики: предназначение, типичные и атипичные нормотимики, показания, противопоказания и побочные эффекты отдельных препаратов.
6. Седативные средства: общая характеристика, классификация и известные механизмы действия, показания и противопоказания.

Рекомендуемы темы презентаций

(необязательное задание)

- Типичные и атипичные нейролептики.
- Использование нейролептиков вне психиатрической практики (хирургии, онкологии и др.)
- Атипичные (небензиадезипиновые) анксиолитики.
- Нормотимики – особенности применения отдельных препаратов.
- Безрецептурные седативные фиотпрепараты.

Ситуационные задачи

Решите ситуационные задачи, кратко ответьте на вопросы.

I. Определить вещество: обладает антипсихотическим действием, угнетает центр терморегуляции, блокирует хеморецепторы пусковой зоны рвотного центра, обладает холинолитическим, адренолитическим и дофаминолитическим эффектами, оказывает противогистаминное и анальгезирующее действие.

II. У больного неврастения, по поводу которой он лечился седативным препаратом. Через 3 недели лечения у больного отмечалась повышенная сонливость, апатия. На коже появилась угревая сыпь. Больного беспокоит насморк и явления конъюнктивита.
    1) Какой препарат получал больной?
    2) Объясните с чем связаны возникшие осложнения.
    3) Что такое кумуляция и какая она бывает?

III. Пациентка в возрасте 21 лет после неудачной сессии стала крайне раздражительна, испытывает тревогу, беспокойство, затруднение при засыпании. При беседе контактна, понимает свое состояние.

1) Какие препараты Вы назначите для нормализации данного психического состояния?
2) В каких случаях используются нейролептики, анксиолитики или седативные средства?
3) Какие из перечисленных выше групп препаратов вызывают зависимость.

IV. Пациентка в возрасте 15 лет доставлена в приемное отделение после демонстративной суицидальной попытки: поверхностные надрезы в области левого локтевого сгиба. Поведение театральное с невыраженной агрессивностью, считает себя неудачницей, но в своих проблемах винит окружающих. Наблюдается психомоторная и вербальная гиперактивность. Причину суицидальной попытки объясняет отсутствием взаимопонимания со стороны одноклассника, который предпочел её подругу.

1) Какие препараты можно назначить для нормализации состояния?
2) Перечислите побочные эффекты характерные для данной группы препаратов?
3) Существуют ли ограничения оборота данной группы препаратов?

V. Пациентка 45 лет доставлена в приемное отделение с признаками нарушения поведения. Контакт затруднен. Дезориентирована в пространстве и времени. Благодушно переругивается с «голосами»; описывает, что в углу комнаты «видит» каких-то мелких животных, ловит их и гладит. Со слов, сопровождающих известно, что на протяжении многих лет злоупотребляет алкоголем.

1) Какие группы психотропных препаратов можно назначить?
2) Перечислите побочные эффекты характерные для данной группы препаратов?
3) Существуют ли ограничения оборота данной группы препаратов?

Тестовые задания

1. Основными фармакологическими эффектами нейролептиков являются:
   1) Антипсихотический
   2) Психостимулирующий
   3) Противорвотный
   4) Потенцирующий действие наркозных средств

2. Укажите показания для назначения аминазина:
   1) Шизофрения
   2) Истерия
   3) Неукротимая рвота у беременной
   4) Премедикация перед операцией
   5) Невроз
   6) Потенцированный наркоз

3. Выберите показания для назначения нейролептиков:
    1) Острый психоз
    2) Лечение паркинсонизма
    3) Лечение упорной рвоты
    4) В составе нейролептаналгезии

4. Антипсихотический эффект наблюдается у:
    1) Препаратов брома
    2) Аминазина
    3) Дроперидола

5. Антипсихотический эффект нейролептиков связан:
    1) С блокадой дофаминергических рецепторов
    2) С ограничением влияния лобных долей на лимбическую систему

6. Побочные эффекты аминазина включают:
    1) Артериальную гипертензию
    2) Гепатотоксичность
    3) Паркинсонизм
    4) Аллергический дерматит

7. Отметьте препараты для лечения и профилактики маниакального состояния при маниакально-депрессивном психозе:
    1) Бензодиазепины
    2) Нейролептики
    3) Препараты лития
    4) Седативные средства

8. К седативным средствам относят:
    1) Экстракт элеутерококка
    2) Корвалол
    3) Экстракт валерианы
    4) Бромкамфору

9. Укажите правильные утверждения:
    1) Препараты лития при маниях оказывают быстрый эффект
    2) Препараты лития при маниях оказывают отсроченный эффект
    3) Препараты лития являются специфическими средствами для лечения и профилактики маниакального состояния при МДП

10. Побочным эффектом, общим для большинства фенотиазинов, является:
    1) Повышение АД
    2) Паркинсонизм
    3) Подавление высвобождения пролактина

11. Бензодиазепины обладают следующими фармакологическими эффектами:
    1) Седативным
    2) Снотворным

3) Центральным миорелаксирующим
4) Противосудорожным

12. Бензодиазепины могут применяться:
    1) В составе премедикации
    2) Как антиконвульсанты
    3) Для снятия стресса перед выступлением

13. Бензодиазепины могут вызвать:
    1) Аналгезию
    2) Беспокойство
    3) Безразличие

Выпишите рецепты

1. Хлорпромазин (род. Chlorpromazini) – таблетки, покрытые пленочной оболочкой
2. Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин (род. Bromdihydrochlorphenylbenzodiazepini) – таблетки
3. Диазепам (род. Diazepami) - таблетки
4. Лития карбонат (род. Lithii carbonatis) – таблетки, покрытые пленочной оболочкой
5. Бромкамфора (род. Bromcamphorae) - таблетки
6. Корвалол (Corvalol) – капли для приема внутрь