Тема 16. ПСИХОТРОПНЫЕ ПРЕПАРАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ

Вопросы для самостоятельной подготовки

1. Антидепрессанты: классификация, фармакологические эффекты, показания для применения, побочные эффекты, противопоказания.
2. Психостимуляторы: механизм действия, фармакологические эффекты, показания для применения, побочные эффекты, противопоказания.
3. Ноотропы: отличия от психостимуляторов, классификация, фармакологические эффекты, показания, побочные эффекты и противопоказания.
4. Общетонизирующие средства (адаптогены): особенности действия, классификация, фармакологические эффекты, показания, побочные эффекты и противопоказания.
5. Аналептики: классификация, фармакологические эффекты, показания для применения.

Рекомендуемы темы презентаций

(необязательное задание)

- Ноотропные препараты метаболического действия.
- Ноотропные препараты, воздействующие на микроциркуляцию и кровоснабжение головного мозга.
- Адаптогены животного происхождения.
- Лекарственные средства для лечения мигрени

Ситуационные задачи

Решите ситуационные задачи, кратко ответьте на вопросы.

I. Пациент 38 лет поступил в стационар с явлениями ажитации, маниакально приподнятого настроения, говорит быстро сбиваясь и перескакивая с темы на тему. Жалуется на бессонницу, боли в животе, метеоризм, жидкий стул и мышечные судороги, периодически возникающие в нижних конечностях. Объективно: кожа влажная горячая, обнаруживается повышение температуры тела 38,5°С, тахикардия до 110 уд./мин. в покое, учащённое дыхание, гиперрефлексия и мидриаз. Из анамнеза известно, что пациент уже в течение 3-х недель принимает препарат назначенные ему по поводу депрессии.
    1) Предположите какой препарат возможно принимал пациент?
    2) Чем объясняется возникшее состояние?
    3) Лечение и меры профилактики возникшего состояния.

II. Пациентка 47 лет доставлена ночью скорой помощью в приёмное отделение в состоянии оглушённости. Жалуется на пульсирующую головную боль. Обильное потоотделение. Объективно обнаружено повышение АД до 220/140 мм рт. ст., тахикардия до 120 уд./мин., повышение температуры до 37,8°С. Из анамнеза известно что пациентка уже на протяжение длительного времени принимает

незарегистрированный в России антидепрессант группы неселективных ингибиторов МАО – «PARNATE». Своё состояние связывает с употреблением вечером в пищу большого количества различных сыров, привезённых подругой из одной из европейских стран, причём подруга чувствует себя хорошо.

1) Предположите с чем может быть связано возникшее состояние?
2) Дайте классификацию антидепрессантов?
3) Имеют ли препараты группы антидепрессантов ограничения оборота в России?

III. Пациентка 54 лет стала замечать, что хуже выполняет свои профессиональные обязанности, затрачивает значительно больше времени на выполнение обычных операций, которые раньше не вызывали никаких затруднений. Связывает это с рассеянностью, ухудшением памяти на текущие события, замедлением процессов мышления и счёта.

1) Ваши предложения по назначению препаратов.
2) Объясните механизм действия предложенных средств.
3) Дайте классификацию ноотропных средств.

IV. На прием доставлен пациент 2 лет. При обследовании установлена задержка психического развития и некоторая психомоторная заторможенность. Соматических причин для такого состояния не выявлено.

1) Возможна ли фармакологическая коррекция имеющегося состояния?
2) Если возможна, то предложите необходимые препараты.
3) Объясните механизм действия выбранных препаратов.

V. На приёме пациент 28 лет после перенесенной вирусной инфекции жалуется на непреходящее чувству усталости, снижение настроения и слабость. Утверждает, что с большим трудом выполняет свои профессиональные обязанности, необходимость частых перерывов в работе.

1) Возможна ли фармакологическая коррекция имеющегося состояния?
2) Ваши предложения по назначению препаратов.
3) Укажите основной механизм их действия.

Тестовые задания

1. Применение кофеина показано в следующих случаях:
   1) Для лечения энуреза у детей
   2) Для лечения бессонницы
   3) Для стимуляции психической деятельности

2. Адаптогенным действием обладают
   1) Настойка лимонника
   2) Настойка белладонны
   3) Экстракт родиолы
   4) настойка элеутерококка
   5) Настой валерианы

3. Адаптогенным действием обладают растения
    1) Красавка
    2) Наперстянка
    3) Родиола
    4) Левзея
    5) Валериана

4. Кофеин вызывает эффекты
    1) Кардиотонический
    2) Психостимулирующий
    3) Аналептический
    4) Анксиолитический

5. К психостимуляторам относятся
    1) Амфетамин
    2) Мезокарб (сиднокарб)
    3) Кофеин
    4) Моклобемид
    5) Теофиллин

6. Амфетамин обладает следующими эффектами:
    1) Повышает аппетит
    2) Увеличивает выделение норэпинефрина (норадреналина) и дофамина из пресинаптических окончаний
    3) Возбуждает центр дыхания
    4) Угнетает центр голода

7. Антидепрессанты (трициклические соединения) обладают следующими фармакологическими эффектами:
    1) Антидепрессивный
    2) Антипсихотический
    3) Непрямая стимуляция серотониновых и адренорецепторов в цнс

8. К общетонизирующим средствам (адаптогенам) относят:
    1) Кофеин
    2) Пантокрин
    3) Фенамин
    4) Препараты женьшеня

9. К психостимуляторам относят:
    1) Фенамин
    2) Кофеин
    3) Аминалон
    4) Пантокрин

10. К ноотропным препаратам относят:
    1) Аминалон
    2) Кофеин

3) Ноотропил
4) Церебролизин

11. Пирацетам вызывает следующие побочные эффекты:
    1) Повышенную раздражительность
    2) Гепатотоксичность
    3) Депрессию дыхания
    4) Нарушение сна

12. Фармакологические эффекты пирацетама включают:
    1) Пробуждающее действие при коматозных состояниях
    2) Улучшает память и обучение при их нарушении
    3) Увеличивает кровоток в капиллярах мозга

Выпишите рецепты

1. Кофеин (род. Coffeini) – таблетки
2. Флуоксетин (род. Fluoxetini) – капсулы
3. Пирацетам (род. Piracetami) – таблетки, покрытые оболочкой
4. Нафтидрофурил (род. Naftidrofuryli) – таблетки, покрытые пленочной оболочкой
5. Женьшеня настоящего корней настойка (род. Tincturae Ginsengi) – настойка для приёма внутрь
6. Золмитриптан (род. Zolmitriptani) – таблетки, покрытые пленочной оболочкой