Э_Фармакология_3_ЛД_П

ТЗ1 и ТЗ2

ТЗ1

ОПК-3

№1

Что такое допинг?

1 (●) Это использование или попытка использования субстанции, запрещенной для использования в спорте.
2 ( ) Использование лекарственных средств, содержащих вещества, включённые в список запрещённых субстанций для использования в спорте, в процессе оказания спортсмену неотложной медицинской помощи.
3 ( ) Реабилитационная фармакологическая терапия, направленная на скорейшее восстановление спортсмена и получение высоких спортивных результатов.

№2

Какие рецепторы содержат нервно-мышечные синапсы?

1 ( ) Альфа-адренорецепторы.
2 ( ) Бета-адренрецепторы.
3 (●) Никотиновые холинорецепторы.
4 ( ) Мускариновые холинорецепторы.

№3

Какие лекарственные средства усиливают мышечную силу и ускоряют нервно-мышечную передачу

1 (●) Ингибиторы холинэстеразы в малых дозах.
2 ( ) Ингибиторы холинэстеразы в больших дозах.
3 ( ) М-холиномиметики.
4 ( ) М-холинолитики.

№4

Может ли врач скорой помощи при оказании экстренной медицинской помощи спортсмену применять лекарственные средства, запрещённые для использования в спорте?

1 (●) Да
2 ( ) Нет
3 ( ) Только после получения разрешение на терапевтическое использование

№5

Несёт ли врач первичного звена административную или уголовную ответственность за назначение спортсмену лекарственных средств, запрещённые для использования в спорте?

1 ( ) Да
2 ( ) Нет
3 (●) Только в случае сознательного склонения спортсмена к их применению

№6

Может ли спортсмен применять лекарственные средства, запрещённые для использования в спорте?

1 ( ) Да
2 ( ) Нет
3 (●) Только после получения разрешение на терапевтическое использование

№7

Может ли спортсмен применять незарегистрированное лекарственное средство, которое отсутствует в списке запрещённых для использования в спорте?

1 ( ) Да
2 (●) Нет
3 ( ) Только после прохождения клинических исследований

№8

Верно ли утверждение: "Все лекарственные средства, влияющие на спортивные результаты запрещены для использования в спорте"?

1 ○ Верно
2 ◉ Не верно

№9

Отметьте группу или лекарственное средство, которое влияет на спортивные результаты (улучшает), но не является допингом?

1 ○ Анаболические стероиды
2 ○ Бета адреномиметики
3 ○ Инсулины
4 ◉ Витамины

№10

Отметьте группу или лекарственное средство, которое не влияет на спортивные результаты, но является допингом?

1 ○ Этиловый спирт
2 ○ Нестероидные противовоспалительные средства
3 ◉ Наркотические анальгетики
4 ○ Антиагреганты и антикоагулянты

№11

Являются ли допингом (веществами, запрещёнными для использования в спорте) бета блокаторы?

1 ○ Да
2 ○ Нет
3 ◉ В отдельных видах спорта

№12

Являются ли допингом (веществами, запрещёнными для использования в спорте) стероидные противовоспалительные средства?

1 ○ Да
2 ○ Нет
3 ◉ Да, при системном пероральном или парентеральном применении

№13

Являются ли допингом (веществами, запрещёнными для использования в спорте) пероральные контрацептивные средства?

1 ○ Да
2 ◉ Нет
3 ○ Да, в случае применения для подавления менструального цикла

№14

Являются ли допингом (веществами, запрещёнными для использования в спорте) антиэстрогены?

1 ◉ Да
2 ○ Нет
3 ○ Да, в случае применения для подавления менструального цикла

№15

Являются ли допингом (веществами, запрещёнными для использования в спорте) диуретики?

1 ◉ Да
2 ○ Нет
3 ○ Да, в случае применения их для маскировки других веществ

№16

Являются ли допингом (веществами, запрещёнными для использования в спорте) стероидные противовоспалительные средства?

1 ○ Да
2 ○ Нет
3 ◉ Нет при местном и ингаляционном применении

ОПК-7

№17

Отметьте самый быстрый механизм транспорта лекарственных веществ через мембрану клеток?

1 ◉ Пассивная диффузия
2 ○ Облегчённая диффузия
3 ○ Активный транспорт

№18

Выберите самый быстрый путь выведения лекарственного вещества из организма?

1 ◉ Через лёгкие
2 ○ Через почки
3 ○ Через желудочно-кишечный тракт
4 ○ Через кожу

№19

Определите какой термин соответствует эффекту взаимодействия лекарственных веществ, когда одно вещество усиливает действие другого, но при этом его собственный эффект снижается?

1 ○ Синергизм
2 ○ Антагонизм
3 ○ Суммация
4 ◉ Сенситивный синергизм

№20

Ослабление эффекта одного лекарственного вещества вследствие усиления его биотрансформации под влиянием другого лекарственного вещества, это ...?

1 ○ Фармакологический антагонизм
2 ○ Физиологический антагонизм
3 ◉ Фармакокинетический антагонизм
4 ○ Фармакодинамический антагонизм

№21

Определяете какой термин соответствует эффекту постепенному снижения эффекта лекарственного вещества при его многократном применении?

1 ○ Зависимость
2 ◉ Толерантность
3 ○ Тахифилаксия
4 ○ Анафилаксия

№22

Для какого пути введения лекарственного вещества биодоступность составляет 100 %?

1 ○ Пероральный
2 ○ Ректальный
3 ◉ Внутривенный
4 ○ Внутримышечный

№23

Эмбриотоксическое действие лекарственного средства реализуется в следующие сроки беременности:

1 ◉ В первые три недели
2 ○ После 8 недель
3 ○ С 3 по 8 неделю

№24

Тератогенное действие лекарственного средства развивается в следующие сроки беременности:

1 ○ В первые 3 недели
2 ◉ С 3 - 8 нед
3 ○ После 8 недели

№25

Толерантность к лекарственному средству может быть следствием следующих механизмов:

1 ☐ Психической зависимости
2 ☑ Снижения чувствительности рецепторов
3 ☑ Ускорение выведения лекарственного вещества
4 ☑ Ускорение биотрансформации (например, микросомального окисления)

№26

Какой механизм снижения концентрации лекарственного вещества в крови не приводит к его элиминации?

1 ◉ Аккумуляция
2 ○ Биотрансформация
3 ○ Экскреция
4 ○ Дистрибьюция

№27

Какому показателю соответствует общее количество поступившего в организм лекарственного вещества?

1 ○ Доза
2 ◉ Площадь фармакокинетической кривой
3 ○ Биодоступность
4 ○ Объём распределения

№28

Какому показателю соответствует отношение общего количество поступившего в организм лекарственного вещества к его концентрации в крови?

1 ○ Доза
2 ○ Площадь фармакокинетической кривой
3 ○ Биодоступность
4 ◉ Объём распределения

№29

Термин "биодоступность" означает

1 ○ Степень связывания вещества с белками плазмы
2 ○ Способ получения лекарственных веществ из биологических жидкостей
3 ◉ Отношение количества, попавшего в общий кровоток вещества к введённой дозе
4 ○ Способность вещества проходить через гематоэнцефалический барьер

№30

Какое количество вещества подвергается элиминации за время равное 5 периодам полувыведения?

1 ○ 50 %
2 ○ 75 %
3 ◉ 97 %
4 ○ 100 %

№31

Внутривенное введение лекарственных средств имеет следующие особенности:

1 ☑ Отсутствует адсорбция
2 ☑ Высокая биодоступность
3 ☑ Возможность управления дозировкой лекарств путем регулирования скорости введения
4 ☐ Высокая пресистемная элиминация

№32

В каких реакция биотрансформации лекарственных веществ участвует система печёночных цитохромов Р 450?

1 ○ Участвует в процесс ацетилирования
2 ○ Стимулирует реакцию восстановления лекарственных веществ
3 ○ Активирует эстеразы, обеспечивающие процессы гидролиза
4 ◉ Обеспечивает процессах окисления веществ микросомальными ферментами

№33

Что из перечисленного относится к твёрдым лекарственным формам?

1 ○ мазь, крем, гель, линимент, паста, пластырь, суппозитории, пилюли
2 ◉ таблетки, драже, гранулы, порошки, капсулы, пастилки, карамельки

3 ○ микстура, настой, отвар, тинктура, экстракт, эликсир, эмульсия, суспензия

№34

Какая из твёрдых лекарственных форм производится путём прессования порошков?

1 ○ Драже
2 ◉ Таблетки
3 ○ Порошок
4 ○ Гранулы

№35

Какая из твёрдых лекарственных форм производится путём наслаивания сахара на гранулы?

1 ◉ Драже
2 ○ Таблетки
3 ○ Порошок
4 ○ Гранулы

№36

К какой лекарственной форме относится присыпка?

1 ○ Драже
2 ○ Таблетки
3 ◉ Порошок
4 ○ Гранулы

№37

Как называются специальные твёрдые или эластичные оболочки, наполненные лекарственным веществом?

1 ○ Драже
2 ○ Таблетки
3 ◉ Капсулы
4 ○ Гранулы
5 ○ Пилюли

№38

Как называется твёрдая лекарственная форма в виде однородных частиц круглой, цилиндрической или неправильной формы?

1 ○ Драже
2 ○ Таблетки
3 ○ Капсулы
4 ◉ Гранулы

№39

Какие твёрдые лекарственные формы используются для лечения заболеваний слизистой оболочки полости рта и глотки путём растворения во рту?

1 ○ Драже и таблетки
2 ○ Капсулы и гранулы
3 ○ Облатки и плёнки
4 ◉ Карамели и пастилки

№40

Какие из перечисленных твёрдых лекарственных форм является недозированными?

1 ☐ Таблетки
2 ☐ Карамели
3 ☐ Драже
4 ☑ Порошок
5 ☑ Гранулы
6 ☐ Капсулы

№41

Какая твёрдая лекарственная форма представляет собой смесь нескольких видов измельченного растительного лекарственного сырья?

1 ◉ Лекарственный сбор
2 ○ Суспензия
3 ○ Гель
4 ○ Гранулы
5 ○ Драже

№42

Какие из перечисленных лекарственных форм относятся к жидким?

1 ○ Мазь, крем, гель, линимент, паста, пластырь, суппозитории, пилюли
2 ○ Таблетки, драже, гранулы, порошки, капсулы, пастилки, карамельки
3 ◉ Раствор, настой, отвар, настойка, экстракт, эликсир, микстура, эмульсия, суспензия, слизь

№43

Какая из лекарственных форм является жидкой?

1 ○ Мазь
2 ◉ Суспензия
3 ○ Драже
4 ○ Порошок

№44

Чем отвар отличается от настоя?

1 ◉ Его получают путём длительной термической обработки
2 ○ Используются различные растворители
3 ○ Используется различное сырье
4 ○ Это разные лекарственные формы.

№45

Какие из перечисленных ниже лекарственных форм относятся к мягким?

1 ◉ мазь, крем, гель, линимент, паста, пластырь, суппозитории, пилюли
2 ○ таблетки, драже, гранулы, порошки, капсулы, пастилки, карамельки,
3 ○ раствор, настой, отвар, тинктура, экстракт, эликсир, микстура, эмульсия, суспензия, слизь

№46

Чем пасты отличаются от мазей?

1 ○ Различная основа для мазей и паст
2 ○ Различные растворители
3 ○ Различные технологии приготовления
4 ◉ Различное содержание порошкообразных веществ

№47

Какая из перечисленных мягких лекарственных форм относится к дозированным?

1 ○ Пластырь
2 ◉ Суппозитории
3 ○ Паста
4 ○ Мазь

№48

Что используется в качестве мазевой основы?

1 ☐ Оксид цинка
2 ☑ Вазелин
3 ☑ Ланолин
4 ☐ Крахмал
5 ☐ Тальк

№49

К какой лекарственной форме относится линимент?

1 ○ Жидкие лекарственные формы
2 ◉ Мягкие лекарственные формы

3 ○ Твёрдые лекарственные формы
4 ○ Инъекционные лекарственные формы

№50

Укажите мягкую лекарственную форму, содержащую не менее 25% порошкообразных веществ в своём составе?

1 ○ Мазь
2 ○ Линимент
3 ○ Гель
4 ◉ Паста
5 ○ Крем

№51

Укажите мягкую лекарственная форма, содержащая коллоидную систему?

1 ◉ Гель
2 ○ Крем
3 ○ Паста
4 ○ Линимент
5 ○ Мазь

№52

Укажите сложную лекарственную форму "жидкость в газе" для ингаляционного применения?

1 ○ Раствор
2 ◉ Аэрозоль
3 ○ Отвар
4 ○ Экстракт

№53

В каких случаях целесообразно назначать жидкую пероральную форму в каплях?

1 ◉ Если разовая доза составляет менее 1 мл
2 ○ Если разовая доза составляет более 1 мл
3 ○ Если объём дозы не имеет значения

№54

Сколько капель в 1 мл?

1 ○ 1 капля
2 ○ 5 капель
3 ○ 10 капель
4 ◉ 20 капель
5 ○ 100 капель

№55

Какое вещество пишется первым в рецепте для аптечного приготовления?

1 ○ Вещества пишутся в алфавитном порядке
2 ○ Не имеет значения, какое вещество написать первым
3 ○ Вещество с самым длинным названием пишется первым
4 ◉ Вещество с основным фармакологическим эффектом пишется первым
5 ○ Вещество, улучшающее вкус, пишется первым

№56

Какие эффекты характерные для стимуляции парасимпатической регуляции глаза?

1 ☐ Мидриаз
2 ☑ Мейоз
3 ☑ Спазм аккомодации
4 ☐ Паралич аккомодации
5 ☑ Снижение внутриглазного давления
6 ☐ Повышение внутри глазного давления

№57

Отметьте эффекты характерные для стимуляции симпатической регуляции глаза?

1 ☑ Мидриаз
2 ☐ Мейоз
3 ☐ Спазм аккомодации
4 ☐ Паралич аккомодации
5 ☑ Снижение внутриглазного давления
6 ☐ Повышение внутри глазного давления

№58

Отметьте эффекты характерные для блокады парасимпатической регуляции глаза атропином?

1 ☑ Мидриаз
2 ☐ Мейоз
3 ☐ Спазм аккомодации
4 ☑ Паралич аккомодации
5 ☐ Снижение внутриглазного давления
6 ☑ Повышение внутри глазного давления

№59

Для М-холиномиметиков характерны следующие эффекты:

1 ☐ Тахикардия
2 ☑ Брадикардия
3 ☑ Бронхоспазм
4 ☑ Саливацию и стимуляция бронхиальной секреции

№60

Действие антихолинэстеразных средств от М-холиномиметиков отличается:

1 ☐ Возбуждением М-холинорецепторов
2 ☑ Возбуждением вегетативных ганглиев
3 ☑ Возбуждением Н-холинорецепторов скелетной мускулатуры
4 ☐ Изменением активности адренорецепторов

№61

Противопоказание для применения атропина?

1 ○ Почечная колика
2 ○ Язвенная болезнь желудка
3 ◉ Глаукома
4 ○ Миастения

№62

Выберите показания для назначения антихолинэстеразных препаратов:

1 ☑ Атония кишечника
2 ☑ Глаукома
3 ☐ Язвенная болезнь желудка
4 ☑ Миастения
5 ☑ Деменция

№63

Отметьте эффекты ганглиоблокаторов:

1 ☐ Саливация
2 ☐ Мейоз
3 ☑ Нарушение зрения
4 ☑ Артериальная гипотензия
5 ☑ Задержка мочи и атония кишечника

№64

Показания к применению ганглиоблокаторов:

1 ☐ Язвенная болезнь
2 ☐ Кардиогенный шок

3 ☑ Расслаивающаяся аневризма аорты
4 ☑ Управляемая гипотензия

№65

Показания к применению Н-холиномиметиков:

1 ○ Язвенная болезнь
2 ○ Кардиогенный шок
3 ◉ Облегчение отказа от курения
4 ○ Стимуляция дыхательного центра при остановке дыхания

№66

Норадреналин оказывает следующие эффекты: ...

1 ☐ Снижает артериальное давление
2 ☑ Повышает артериальное давление
3 ☐ Стимулирует бета-2 адренорецепторы матки
4 ☑ Вызывает сужение сосудов
5 ☑ Стимулирует альфа-адренорецепторы

№67

Укажите какое средство относится к симпатомиметикам (непрямым адреномиметикам)?

1 ◉ Эфедрин
2 ○ Норэпинефрин
3 ○ Эпинефрин
4 ○ Добутамин

№68

Противопоказаниями к применению адреналина являются: ...

1 ☐ Бронхоспазм
2 ☐ Анафилактический шок
3 ☑ Артериальная гипертензия
4 ☑ Ишемическая болезнь сердца
5 ☑ Во время анестезии галотаном (фторотаном)

№69

Какие нейромедиаторы используются в симпатической нервной системе?

1 ☐ Адреналин
2 ☐ Эфедрин
3 ☑ Норадреналин
4 ☐ Серотонин
5 ☑ Ацетилхолин

№70

Отметьте правильные утверждения:

1 ☑ Норадреналин обладает высоким сродством к альфа-адренорецепторам
2 ☐ Норадреналин обладает высоким сродством к бета-адренорецепторам
3 ☐ Адреналин обладает высоким сродством к альфа-адренорецепторам
4 ☑ Адреналин обладает высоким сродством к бета-адренорецепторам

№71

Адреналин является: ...

1 ○ Селективным альфа1-агонистом
2 ○ Неселективным бета-агонистом
3 ◉ Неселективный альфа- и бета-адренергическим агонистом

№72

Альфа-1-адреноблокаторы применяются для: ...

1 ☐ Повышения артериального давления
2 ☐ Лечения бронхиальной астмы

3 ☑ Улучшения периферического кровоснабжения
4 ☑ Снижения артериального давления

№73

Стимуляция бета-1-адренорецепторов вызывает следующие эффекты: ...

1 ☐ Снижение высвобождения ренина
2 ☐ Снижение частоты сердечных сокращений
3 ☑ Усиление проводимости миокарда
4 ☑ Повышение сократительной способности миокарда
5 ☑ Повышение возбудимости миокарда

№74

Стимуляция бета-2-адренорецепторов вызывает следующие эффекты: ...

1 ☑ Расширение бронхов
2 ☑ Расширение сосудов
3 ☐ Сужение сосудов
4 ☐ Спазм бронхов

№75

Бета-1-адреноблокаторы оказывают следующие эффекты: ...

1 ☑ Снижают частоту сердечных сокращений
2 ☑ Снижают проводимость и возбудимость миокарда
3 ☑ Снижают потребность миокарда в кислороде
4 ☐ Стимулируют выделение ренина почками
5 ☐ Увеличьте сердечный выброс

№76

Где локализуются постсинаптические адренорецепторы периферической нервной системы?

1 ○ Нервно-мышечное соединение
2 ○ Ганглионарные синапсы парасимпатической вегетативной нервной системы
3 ○ Ганглионарные синапсы симпатической вегетативной нервной системы
4 ○ Конечные синапсы парасимпатической вегетативной нервной системы
5 ◉ Конечные синапсы симпатической вегетативной нервной системы

№77

Какие структуры обладают двойной (симпатической и парасимпатической) вегетативной иннервацией?

1 ☑ Орган зрения
2 ☑ Предсердия
3 ☐ Сосуды
4 ☑ Трахея и главные бронхи
5 ☐ Бронхиолы
6 ☑ Желудочно-кишечный тракт

№78

Какие структуры обладают только парасимпатической вегетативной иннервацией?

1 ○ Орган зрения
2 ○ Предсердия
3 ○ Сосуды
4 ○ Трахея и главные бронхи
5 ◉ Бронхиолы
6 ○ Желудочно-кишечный тракт

№79

Какие структуры обладают только симпатической вегетативной иннервацией?

1 ○ Орган зрения
2 ○ Предсердия
3 ◉ Сосуды
4 ○ Трахея и главные бронхи

5 ○ Бронхиолы
6 ○ Желудочно-кишечный тракт

№80

Отметьте правильные утверждения:

1 ☑ Местные анестетики блокируют генерацию и проведение потенциала действия
2 ☑ Местные анестетики блокируют калиевые каналы
3 ☐ Местные анестетики блокируют натриевые каналы
4 ☐ Местные анестетики блокируют кальциевые каналы

№81

Где местные анестетики могут блокировать проведение импульса?

1 ○ Только по чувствительным нервным волокнам
2 ○ Только по волокнам вегетативной нервной системы
3 ○ Только по двигательным волокнам нервной системы
4 ◉ По любому нервному волокну

№82

Какой из описанных местных анестетиков является наиболее длительно действующим?

1 ○ Лидокаин
2 ○ Тримекаин
3 ○ Прокаин
4 ◉ Бупивакаин

№83

Какой из перечисленных местных анестетиков амидного типа?

1 ○ Прокаин
2 ○ Тримекаин
3 ◉ Лидокаин
4 ○ Дикаин

№84

Какие из перечисленных местных анестетиков относятся к эфирному типу?

1 ☑ Дикаин
2 ☑ Тримекаин
3 ☑ Прокин
4 ☐ Лидокаин

№85

В чём причина прекращения действия местных анестетиков?

1 ☐ Выведение из организма
2 ☑ Резорбция из места введения
3 ☑ Разрушение молекул лекарственного средства

№86

При появлении признаков токсичности действия местного анестетика необходимо:

1 ◉ Прекратить введение препарата
2 ○ Ввести противосудорожное средство
3 ○ Продолжить введение препарата
4 ○ Промыть желудок

№87

Какой из перечисленных местных анестетиков наиболее токсичен?

1 ◉ Дикаин
2 ○ Прокаин
3 ○ Лидокаин
4 ○ Бупивакаин

№88

Отметьте правильные утверждения:

1 ☑ Ароматическая часть молекулы местного анестетика обеспечивает диффузию через мембрану
2 ☑ Аминогруппа местного анестетика обеспечивает блокирование Na+ каналов
3 ☐ Эфирная часть молекулы местного анестетика обеспечивает блокирование Na+ каналов

№89

Какой препарат обладает одновременно вяжущим и адсорбирующим действием?

1 ○ Сульфат цинка
2 ○ Нитрат серебра
3 ◉ Танин
4 ○ Отвар коры дуба

№90

Вяжущие средства в месте нанесения оказывают следующие эффекты: ...

1 ☑ Уменьшение симптомов воспаления (снижение проницаемости сосудов, уменьшение экссудации)
2 ☐ Денатурируют поверхностные белки клеток слизистой и кожи
3 ☑ Образуют защитную таниновую плёнку
4 ☐ Раздражают нервные окончания

№91

Прижигающие средства в месте нанесения оказывают следующие эффекты: ...

1 ☑ Денатурируют поверхностные белки клеток слизистой и кожи
2 ☐ Адсорбируют токсичные вещества
3 ☑ Защищают чувствительные окончания от раздражения
4 ☐ Раздражают нервные окончания

№92

Перечислите побочные эффекты ацетилсалициловой кислоты:

1 ☐ Психическая зависимость
2 ☑ Кровотечения
3 ☑ Ульцерогенный эффект
4 ☑ Синдром Рейе

№93

Укажите основные фармакологические эффекты анальгетиков-антипиретиков (метамизол, парацетамол):

1 ☐ Противоаллергическое действие
2 ☐ Противовоспалительное действие
3 ☐ Антиагрегантное
4 ☑ Обезболивающее
5 ☑ Жаропонижающее

№94

Ульцерогенный эффект нестероидных противовоспалительных средств обусловлен...?

1 ○ Повышенной выработкой гастрина
2 ◉ Нарушением синтеза гастропротекторных простагландинов
3 ○ Прямым раздражающим действием на слизистую оболочку желудка
4 ○ Стимулирующим действием на центр блуждающего нерва

№95

Морфин оказывает следующие эффекты на дыхательную систему:

1 ☐ Расширяет бронхи
2 ☑ Может вызвать бронхоспазм, обусловленный выбросом гистамина
3 ☑ Подавляет кашель
4 ☑ Подавляет дыхательный центр, вплоть до остановки дыхания

№96

К наркотическим опиоидным анальгетикам относятся: ...?

1 ☐ Трамадол

2 ☐ Налоксон
3 ☑ Морфин
4 ☑ Тримеперидин (Промедол)
5 ☐ Метамизол

№97

Толерантность к наркотическим анальгетикам - это ...?

1 ○ Непереносимостью препарата
2 ○ Необходимость снижения дозы препарата для достижения эффекта
3 ◉ Необходимость увеличения дозы препарата для достижения эффекта
4 ○ Непреодолимая тяга к употреблению препарата

№98

Отметьте правильные утверждения:

1 ☐ Налоксон устраняет психическую и физическую зависимость от опиоидов.
2 ☑ Налоксон уменьшает угнетение дыхания при отравлении опиоидами.
3 ☑ Налоксон вызывает симптомы отмены у опиоидных наркоманов.

№99

Острое отравление морфином сопровождается

1 ☑ Снижением температуры тела
2 ☐ Расширением зрачков
3 ☑ Угнетением дыхания
4 ☑ Брадикардией
5 ☐ Расслабление гладкомышечных сфинктеров

№100

При остром отравлении морфином необходимы следующие меры...?

1 ☐ Введение антихолинэстеразных препаратов
2 ☑ Промывание желудка#
3 ☑ Введение налоксона
4 ☑ Искусственная вентиляция легких (ИВЛ)

№101

Отметьте эффекты необходимые для наркоза:

1 ☑ Выключение сознания
2 ☐ Повышение тонуса гладкой мускулатуры
3 ☑ Снижение тонуса скелетных мышц
4 ☐ Стимуляция спинномозговых рефлексов
5 ☑ Выключение чувствительности

№102

Выберите возможные нежелательные эффекты галотана:

1 ☐ Острая почечная недостаточность
2 ☑ Аритмия
3 ☑ Токсический гепатит
4 ☑ Артериальная гипотензия
5 ☐ Бронхоспазм

№103

Опасным побочным эффектом галотана (фторотана) является?

1 ○ Острая почечная недостаточность
2 ◉ Токсический гепатит
3 ○ Бронхоспазм
4 ○ Артериальная гипертензия

№104

Укажите специфический побочный эффект кетамина?

1 ○ Артериальная гипотензия
2 ○ Бронхоспазм
3 ◉ Посленаркозный психоз
4 ○ Угнетение дыхательного центра

№105

Отметьте правильные утверждения:

1 ☐ Возбуждение под воздействием алкоголя обусловлено его стимулирующим действием на кору головного мозга
2 ☑ Алкоголь может вызывать психическую и физическую зависимость
3 ☐ Этиловый спирт назначают для профилактики переохлаждения
4 ☑ Тетурам усиливает токсическое действие алкоголя, блокируя его окисление и накопление ацетальдегида

№106

Преимущества неингаляционных анестетиков:

1 ☐ Контроль наркоза
2 ☑ Отсутствие стадии возбуждения
3 ☑ Отсутствие загрязнения воздуха в операционной
4 ☑ Быстрое введение в наркоз

№107

Для мононаркоза закисью азота характерно: ...?

1 ○ Отключение сознания
2 ○ Угнетение дыхания
3 ◉ Выраженная анальгезия
4 ○ Расслабление мышц

№108

Какие препараты используются как угнетающие неингаляционные средства для наркоза?

1 ☐ Кетамин
2 ☑ Мидазолам
3 ☑ Оксибутират натрия
4 ☑ Тиопентал натрия

№109

Для какого неингаляционного анестетика характерна "дисассоциативная анестезия" и осложнение в виде психоза?

1 ◉ Кетамин
2 ○ Мидазолам
3 ○ Оксибутират натрия
4 ○ Тиопентал натрия

№110

Бензодиазепины могут вызывать:

1 ☑ Анальгезию
2 ☑ Анестезию
3 ☑ Атараксию
4 ☐ Анорексию

№111

Бензодиазепины могут быть использованы:

1 ☑ Для премедикации наркоза
2 ☑ В качестве вводного наркоза
3 ☑ Как противосудорожные средства
4 ☑ Как анксиолитики
5 ☐ Для снятия стресса перед экзаменом

№112

Выберите препарат, относящиеся к группе бензодиазепинов?

1 ○ Галоперидол
2 ○ Фенобарбитал
3 ◉ Диазепам
4 ○ Дифенин

№113

Какие противоэпилептические препараты не вызывают сонливости:

1 ☐ Фенобарбитал
2 ☑ Этосуксимид
3 ☑ Дифенин
4 ☐ Диазепам

№114

Фармакологические эффекты барбитуратов включают:

1 ☑ Снотворный эффект
2 ☑ Противосудорожное действие
3 ☑ Анксиолитическое действие
4 ☐ Антипсихотическое действие

№115

Отметьте фармакологические эффекты нейролептиков:

1 ☑ Антипсихотическое действие
2 ☐ Психостимулирующее действие
3 ☑ Противорвотное действие
4 ☑ Потенцирование наркозных средств

№116

Отметьте противопоказания для назначения нейролептиков:

1 ○ Острый психоз
2 ◉ Паркинсонизм
3 ○ Рвота у беременных женщин
4 ○ Сочетание с другими угнетающими средствами в составе нейролептанальгезии

№117

У каких препаратов есть антипсихотический эффект?

1 ○ Препаратов брома
2 ○ Бензодиазепины
3 ◉ Нейролептики
4 ○ Препараты лития
5 ○ Нормотимики

№118

Укажите побочные эффекты нейролептика хлорпромазина:

1 ☐ Артериальная гипертензия
2 ☑ Гепатотоксичность
3 ☑ Паркинсонизм
4 ☑ Фотодерматит

№119

Какие препараты применяются для лечения и профилактики маниакального состояния при маниакально-депрессивном психозе:

1 ○ Бензодиазепины
2 ○ Нейролептики
3 ◉ Препараты лития
4 ○ Седативные средства

№120

Какие из перечисленных средств относятся к седативным:

1 ☐ Экстракт элеутерококка

2 ☑ Корвалол
3 ☑ Экстракт валерианы
4 ☑ Бромкамфору

№121

Показания для применения кофеина: ...?

1 ☑ Для лечения энуреза у детей
2 ☐ Для лечения бессонницы
3 ☑ Для стимуляции умственной деятельности
4 ☑ Нарушения дыхания у новорожденных.

№122

Фармакологические эффекты пирацетама включают:

1 ☐ Пробуждающее действие при коме
2 ☑ Улучшает память и обучение, когда они нарушены
3 ☑ Увеличивает приток крови в капилляры головного мозга

№123

Какие препараты обладают адаптогенным действием?

1 ☑ Настойка лимонника
2 ☐ Настойка белладонны
3 ☑ Экстракт родиолы розовой
4 ☑ Настойка элеутерококка
5 ☐ Настой валерианы

№124

Фармакологические эффекты кофеина:

1 ☑ Кардиотоническое
2 ☑ Психостимулирующее
3 ☑ Аналептическое
4 ☐ Анксиолитическое

№125

Антидепрессанты обладают следующими фармакологическими эффектами:

1 ☑ Анорексигенное действие
2 ☑ Антидепрессивное действие
3 ☐ Антипсихотическое действие
4 ☐ Аналептическое действие

№126

Отметьте основной механизм действия антидепрессантов?

1 ○ Прямая стимуляция серотониновых рецепторов в центральной нервной системе
2 ○ Прямая стимуляция адренергических рецепторов в центральной нервной системе
3 ○ Прямая стимуляция дофаминовых рецепторов в центральной нервной системе
4 ◉ Непрямая стимуляция серотониновых, адренергических и дофаминовых рецепторов в центральной нервной системе

№127

Для какой группы препаратов характерно минимальной количество побочных эффектов

1 ○ Витамины
2 ○ Нестероидные противовоспалительные средства
3 ◉ Ноотропы
4 ○ Снотворные средства

№128

Какие препараты относятся к общеукрепляющим средствам (адаптогенам)?

1 ☐ Кофеин
2 ☑ Пантокрин
3 ☐ Амфетамин

4 ☑ Препараты женьшеня

№129

Какие препаратам относятся к ноотропным средствам?

1 ☑ Аминалон
2 ☐ Кофеин
3 ☑ Ноотропил
4 ☑ Церебролизин

№130

Побочные эффекты ноотропного препарата Пирацетама?

1 ○ Гепатотоксичность
2 ○ Угнетение дыхания
3 ◉ Нарушения сна

№131

Выберите группу первой линии из перечисленных средств, подавляющих секрецию соляной кислоты?

1 ○ Блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов
2 ○ Блокаторы М1-холино рецепторов
3 ◉ Блокаторы Н-К-АТФазы
4 ○ Ганглиоблокаторы

№132

Отметьте желудочно-кишечные средства заместительной терапии:

1 ☑ Панкреатин
2 ☑ Фестал
3 ☑ Ацидин-пепсин
4 ☐ Линекс

№133

Какие препараты относятся к истинным гепатопротекторам?

1 ☑ Адеметионин
2 ☐ Но-шпа
3 ☑ Эссенциале (Фосфолипиды)

№134

К средствам, снижающим секрецию желудка, относят:

1 ☑ Ранитидин
2 ☐ Маалокс
3 ☐ Сукральфат
4 ☑ Омепразол

№135

Отметьте средства, снижающим болевой симптом при язвенной болезни желудка:

1 ☐ Ранитидин
2 ☑ Маалокс
3 ☑ Сукральфат
4 ☐ Омепразол

№136

К средствам, усиливающим перистальтику кишечника, относят:

1 ☐ Агонист опиоидных рецепторов Лоперамид
2 ☐ М-холинолитик Атропин
3 ☑ Антагонист D2-рецепторами и ингибитор ацетилхолинэстеразы Итоприд
4 ☑ Раздражитель рецепторов слизистой оболочки кишечника Бисакодил

№137

Выберите препараты, блокирующие Н2-гистаминовые рецепторы желудка:

1 ☑ Фамотидин

2 ☑ Ранитидин
3 ☐ Пирензепин
4 ☐ Сукральфат

№138

Противорвотным эффектом обладают:

1 ☑ Нейролептики
2 ☑ Блокаторы Н1-гистаминовых рецепторов
3 ☐ Блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов
4 ☑ М-холинолитики

№139

Противорвотным эффектом обладают:

1 ☑ Антагонисты 5-НТ3-серотониновых рецепторов
2 ☐ Агонисты 5-НТ3-серотониновых рецепторов
3 ☑ Антагонисты D2-дофаминовых рецепторов
4 ☐ Агонисты D2-дофаминовых рецепторов
5 ☑ Антагонисты NK1-рецепторов нейрокинина 1 субстанции Р
6 ☐ Агонисты NK1-рецепторов нейрокинина 1 субстанции Р

№140

При острых отравлениях в качестве слабительного средства оптимально применение:

1 ○ Средств, вызывающие химическое раздражение рецепторов слизистой оболочки кишечника: корень ревеня, кора крушины, касторовое масло
2 ○ Средства, механического действия (за счёт наполнения и растяжения) морская капуста, льняное семя, агар-агар и др.
3 ◉ Солевые слабительные: натрия сульфат, магния сульфат.);
4 ○ Средства, способствующие размягчению каловых масс и облегчающие их продвижение по кишечнику: вазелиновое, миндальное, оливковое и другие растительные масла.

№141

Показания к использованию блокаторов Н2-гистаминовых рецепторов:

1 ☐ Препараты первой линий лечения язвенной болезни желудка
2 ☑ Препараты второй линий лечения язвенной болезни желудка
3 ☑ Гастринома (синдром Золлингера - Эллисона)
4 ☐ Крапивница, профилактика аллергического ринита

№142

К антацидным препаратам относятся:

1 ☐ Ранитидин
2 ☑ Альмагель (Алгелдрат + Магния гидроксид)
3 ☑ Гастал (Алюминия гидроксид-магния карбонат + Магния гидроксид)
4 ☑ Ренни (Кальция карбонат + Магния карбонат)
5 ☐ Эзиклен (Калия сульфат + Магния сульфат + Натрия сульфат)

№143

Секрецию соляной кислоты в желудке снижают:

1 ☑ Пирензепин
2 ☑ Фамотидин
3 ☐ Панкреатин
4 ☐ Гастрин
5 ☑ Омепразол

№144

Препараты каких групп снижают секрецию соляной кислоты в желудке?

1 ☐ М-холиномиметики
2 ☑ М-холинолитики
3 ☑ Блокаторы Н2-гистаминовыхрецепторов
4 ☐ Антихолинэстеразные средства

5 ☑ Ингибиторы протонного насоса

№145

Что усиливает желчевыделение?

1 ☐ Гистамин
2 ☑ Холецистокинин
3 ☐ Панкреатин
4 ☑ Магния сульфат
5 ☑ Ксилит

№146

К стимуляторам желчеобразования (холеретикам) относят:

1 ☑ Урсодезоксихолевая кислота
2 ☑ Аллохол (желчь КРС, чеснока посевного луковицы сушеные, уголь активированный, крапивы двудомной листья)
3 ☐ Сернокислая магнезия
4 ☐ Но-шпа (Дротаверин)
5 ☐ Эссенциале (Фосфолипиды)

№147

К противорвотным лекарственным средствам относят

1 ☑ Метоклопрамид
2 ☐ Апоморфин
3 ☑ Домперидон
4 ☐ Фенолфталеин
5 ☑ Фосапрепитант

№148

Выберите группу препаратов, применяемую для снятия бронхоспазма при бронхиальной астме?

1 ◉ Бета-адреномиметики
2 ○ Ингаляционные глюкокортикоиды
3 ○ М-холиноблокаторы
4 ○ Блокаторы Н1-гистаминовых рецепторов

№149

Кодеин обладает следующими эффектами: ...?

1 ☑ Анальгетическое
2 ☐ Аналептическое
3 ☑ Противокашлевое
4 ☑ Вызывает лекарственную зависимость

№150

Какие препараты подходят для купирования приступа бронхиальной астмы?

1 ☑ Сальбутамол
2 ☐ Беклометазон
3 ☑ Адреналин
4 ☐ Ипратропия бромид

№151

Укажите правильные утверждения:

1 ☑ Бромгексин улучшает реологические свойства мокроты и стимулирует выработку сурфактанта
2 ☐ Ингаляционные глюкокортикоиды используются для купирования приступов астмы.
3 ☑ Ингаляционные глюкокортикоиды применяются в качестве базисной терапии бронхиальной астмы.

№152

Какое М-холинолитическое средство используется для лечения бронхиальной астмы?

1 ○ Атропин
2 ○ Скополамин
3 ○ Тригексифенидил (Циклодол)

4 ◉ Ипратропия бромид

№153

Каковы эффекты стабилизаторов мембран тучных клеток?

1 ☑ Воздействует на аллергический компонент патогенеза бронхиальной астмы
2 ☐ Может купировать приступ бронхиальной астмы
3 ☑ Используется для профилактики сезонных обострений бронхиальной астмы

№154

Укажите правильное утверждение:

1 ◉ Внутривенное введение больших доз глюкокортикоидов применяется при астматическом статусе
2 ○ При астматическом статусе показано ингаляционное введение глюкокортикоидов
3 ○ Внутривенное введение глюкокортикоидов применяется для лечения бронхиальной астме легкой степени тяжести.

№155

Какие препараты относятся к отхаркивающим средствам рефлекторного действия?

1 ☑ Термопсис
2 ☑ Мукалтин
3 ☐ Бромгексин
4 ☐ Леводропропизин

№156

Отметьте селективные бета-2-агонисты: ...?

1 ☑ Сальбутамол
2 ☐ Адреналин
3 ☑ Фенотерол
4 ☐ Изадрин

№157

Укажите правильные утверждения:

1 ☐ Кодеин назначают детям младше 2 лет, поскольку он не угнетает дыхательный центр
2 ☑ Отхаркивающие средства рефлекторного типа в больших дозах могут вызвать рвоту
3 ☑ Противокашлевые средства не назначаются при легочных кровотечениях

№158

Укажите правильные утверждения:

1 ☑ Ингаляционные глюкокортикоиды оказывают минимальное системное действие
2 ☐ Стабилизаторы мембран тучных клеток предотвращают бронхоспазм
3 ☑ Стабилизаторы мембран тучных клеток снижают потребность в глюкокортикоидах и бета-агонистах
4 ☑ Теофиллин обладает небольшим спектром терапевтического действия и обладает множеством нежелательных эффектов.

№159

Каковы противопоказания к применению противокашлевых средств?

1 ☑ Бронхиальная астма
2 ☐ Сухой изнуряющий кашель
3 ☑ Легочное кровотечение
4 ☑ Влажный кашель с обилием мокроты

№160

Что характерно для преноксдиазина?

1 ☑ Подавляет кашлевой рефлекс, действуя периферически, снижая возбудимость чувствительных нервных окончаний
2 ☑ Эквивалентно кодеину при кашле
3 ☐ Угнетает кашлевой центр
4 ☑ Не вызывает привыкания

№161

Какой из перечисленных препаратов относится к муколитическим средствам?

1 ○ Кодеин
2 ◉ Бромгексин
3 ○ Окселадин
4 ○ Цититон
5 ○ Либексин

№162

Какие из перечисленных препаратов относится к отхаркивающие средствам?

1 ☑ Бромгексин
2 ☐ Тусупрекс
3 ☐ Глауцин
4 ☑ Ацетилцистеин

№163

Отметьте показания для противокашлевых средств:

1 ☑ Экссудативный плеврит
2 ☑ Сухой кашель
3 ☑ Онкологические заболевания дыхательной системы
4 ☐ Туберкулез легких

№164

Препараты, подавляющие кашель, не следует назначать при: ...?

1 ○ Пре- и постоперационном периоде
2 ○ Изнуряющем кашле
3 ○ Бронхиальной астме
4 ◉ Кровохарканье

№165

Выберите группы лекарственных средств применяемы при лечении бронхиальной астмы:

1 ☐ М-холиномиметики
2 ☑ М-холинолитики
3 ☐ альфа-1-адреноблокаторы
4 ☐ Агонисты гистаминовых рецепторов
5 ☑ бета-2-адреномиметики

№166

Каков механизм отхаркивающего действия травы термопсиса?

1 ○ Рефлекторное действие при раздражении рецепторов бронхов
2 ◉ Рефлекторное действие при раздражении рецепторов желудка
3 ○ Стимуляция холинергических рецепторов
4 ○ Прямая стимуляция кашлевого центра

№167

Выберите группу препаратов первой линии профилактики стенокардии при ишемической болезни сердца?

1 ◉ Бета-блокаторы
2 ○ Сердечные гликозиды
3 ○ Ингибиторы АПФ
4 ○ Нитраты

№168

Выберите препарат, блокирующие преимущественно бета1-рецепторы?

1 ○ Фенилэфрин
2 ◉ Атенолол
3 ○ Эфедрин
4 ○ Эпинефрин

№169

Укажите, к какой фармакологической группе относится антигипертензивный препарат клонидин (клофелин)?

1 ○ Ингибитор АПФ
2 ○ Бета-адреноблокатор
3 ○ Блокатор кальциевых каналов
4 ◉ Центрально действующий альфа-2 адреномиметик

№170

Показаниями для использования осмотических диуретиков являются:

1 ☐ Отёк легких
2 ☑ Форсированный диурез
3 ☑ Отёк мозга
4 ☐ Гипертонический криз

№171

Для ингибиторов угольной ангидразы характерно:

1 ☑ Слабый диуретический эффект
2 ☑ Быстрое развитие резистентности
3 ☐ Усиление продукции цереброспинальной жидкости
4 ☑ Снижение продукции внутриглазной жидкости

№172

Отметьте особенности действия фуросемида:

1 ☐ Медленное развитие эффекта
2 ☑ Быстрое развитие эффекта
3 ☑ Непродолжительное действие (2-4 часа)
4 ☑ Высокая диуретическая активность

№173

Особенности действия дихлотиазида:

1 ☐ Продолжительность действия 4-8 часов
2 ☑ Продолжительность действия 8-12 часов
3 ☑ Понижает артериальное давление при артериальной гипертензии
4 ☐ Ослабляет действие гипотензивных средств

№174

Отметьте диуретик, влияющий преимущественно на восходящую часть петли Генле:

1 ○ Спиронолактон
2 ◉ Этакриновая кислота
3 ○ Дихлотиазид
4 ○ Диакарб

№175

Для лечения хронической сердечной недостаточности используют:

1 ☑ Ингибиторы АПФ
2 ☑ Диуретики
3 ☑ Бета-адреноблокаторы
4 ☐ Ганглиоблокаторы
5 ☑ Сердечные гликозиды

№176

Внепочечные эффекты фуросемида включают:

1 ☑ Вазодиляцию артериол и снижение постнагрузки
2 ☑ Вазодиляцию венул и снижение преднагрузки
3 ☐ Брадикардия

№177

Типичные осложнения характерные для петлевых диуретиков:

1 ☑ Гипокалиемия
2 ☑ Гипонатриемия

3 ☑ Гиповолемия
4 ☐ Метаболический ацидоз

№178

Укажите побочные эффекты иАПФ:

1 ☑ Сухой кашель
2 ☑ Гипотензия
3 ☐ Мидриаз
4 ☐ Сухость слизистых оболочек
5 ☑ Ангионевротический отёк

№179

Лечение интоксикации и включает:

1 ☐ Форсированный диурез
2 ☑ Применение сывороток, содержащих антитела к сердечным гликозидам
3 ☑ Симптоматические лечение аритмий
4 ☑ Отмена препарата, вызвавшего интоксикацию

№180

Калийсберегающие диуретики оказывают следующие эффекты:

1 ☑ Слабый диуретический
2 ☐ Сильный диуретический
3 ☑ Снижают потерю калия
4 ☐ Резко снижают артериальное давление

№181

Показаниями для назначения петлевых диуретиков являются:

1 ☑ Хроническая сердечная недостаточность
2 ☑ Отёк легких
3 ☐ Интоксикация сердечными гликозидами
4 ☐ Интоксикация антибиотиками из группы аминогликозидов

№182

Механизм действия сердечных гликозидов связан с:

1 ◉ Поступлением Са в кардиомиоциты
2 ○ Выведением Са из клеток
3 ○ Поступлением К в клетки
4 ○ Выведением К из клеток

№183

Сердечные гликозиды оказывают следующие эффекты:

1 ☑ Положительный инотропный
2 ☐ Отрицательный инотропный
3 ☐ Положительный хронотропный
4 ☑ Отрицательный хронотропный

№184

Показания для сердечных гликозидов:

1 ☐ Лечение желудочковых аритмий
2 ☐ Лечение брадиаритмий
3 ☑ Лечение хронической сердечной недостаточности
4 ☑ Лечение суправентрикулярных тахиаритмий

№185

Механизм действия петлевых диуретиков связан с:

1 ☐ Обменом натрия на ионы водорода
2 ☑ Подавлением реабсорбции хлора
3 ☑ Подавлением реабсорбции натрия

№186

Препаратами первого ряда при хронической сердечной недостаточности являются:

1 ◉ Ингибиторы АПФ
2 ○ Диуретики
3 ○ Бета-адреноблокаторы
4 ○ Сердечные гликозиды

№187

Какие токсические эффекты аминогликозидов усиливаются при их комбинированном применении с петлевыми диуретиками?

1 ☐ Гематотоксичность
2 ☐ Гепатотоксичность
3 ☑ Нефротоксичность
4 ☑ Ототоксичность

№188

Признаки интоксикации сердечными гликозидами включают:

1 ☑ Экстрасистолию
2 ☑ Нарушение цветового восприятия
3 ☐ Угнетение дыхательного центра
4 ☑ Брадикардию
5 ☑ АВ блокаду

№189

Какая группа лекарственных средств применяется при невысоком риске тромбообразования?

1 ○ Гепарины
2 ◉ Антиагреганты
3 ○ Пероральные антикоагулянты
4 ○ Использование профилактических не требуется

№190

Какие клинические эффекты фибринолитиков?

1 ○ Способствует гемостазу - останавливают кровотечение
2 ○ Увеличивают размер тромба
3 ◉ Разрушают свежие тромбы

№191

Каковы клинические эффекты ингибиторов фибринолиза?

1 ○ Способствует гемостазу - останавливают кровотечение
2 ○ Увеличивают размер тромба
3 ◉ Останавливают разрушение свежих тромбов

№192

Что из перечисленного относится к ингибиторам фибринолиза?

1 ☑ Апротинин
2 ☑ Аминокапроновая кислота
3 ☑ Аминометилбензойная кислота
4 ☐ Стрептокиназа

№193

Что из перечисленного относится к фибринолитикам?

1 ○ Апротинин
2 ○ Аминокапроновая кислота
3 ○ Аминометилбензойная кислота
4 ◉ Стрептокиназа

№194

Пероральные антикоагулянты используются для: ...?

1 ○ Профилактики тромбоза при низком риске

2 ◉ Профилактики тромбоза со средним риском
3 ○ Профилактики тромбоза высокого риска
4 ○ Лечения тромбоза - предотвращения расширения тромбоза

№195

Гепарины используются для: ...?

1 ☐ Профилактики тромбоза при низком риске
2 ☐ Профилактики тромбоза при умеренном риске
3 ☑ Профилактики тромбоза с высоким риском
4 ☑ Лечение тромбоза - профилактика расширения тромбоза

№196

К препаратам, повышающим тонус миометрия, относятся: ...?

1 ☑ Эргометрин
2 ☑ Окситоцин
3 ☐ Фенотерол
4 ☐ Гексопреналин

№197

Какой препарат относите к группе селективных ингибиторов ЦОГ-2?

1 ○ Преднизолон
2 ○ Индометацин
3 ○ Диклофенак натрия
4 ◉ Целекоксиб
5 ○ Ацетилсалициловая кислота

№198

Для какого препарата возможен побочный эффект в виде острой печёночной недостаточности и энцефалопатии (синдром Рея)?

1 ◉ Ацетилсалициловая кислота
2 ○ Нимесулид
3 ○ Целекоксиб
4 ○ Пенициллин

№199

Препараты какой группы одновременно обладают противоаллергическим и противовоспалительным действием?

1 ○ Нестероидные противовоспалительные средства
2 ◉ Стероидные противовоспалительные средства
3 ○ Блокаторы Н1-гистаминовых рецепторов
4 ○ Нитраты

№200

Для какой группы препаратов побочные эффекты обязательны?

1 ○ Витамины
2 ○ Стероидные противовоспалительные средства
3 ◉ Цитостатики
4 ○ Адаптогены

№201

Какой антибактериальный препарат относите к группе пенициллинов?

1 ○ Ванкомицин
2 ◉ Ампициллин
3 ○ Доксициклин
4 ○ Ко-Тримоксазол

№202

Системные хинолоны действуют на:

1 ☑ Грам"+" кокки
2 ☑ Грам"-" бактерии

3 ☐ Анаэробы
4 ☑ Синегнойную палочку

№203

К мочевым 8-оксихинолинам относят:
1 ○ Невиграмон
2 ○ Таривид
3 ◉ Нитроксолин

№204

Отметьте верные утверждения:
1 ☑ Сульфаниламиды уступают антибиотикам по своей антибактериальной активности
2 ☑ Комбинация сульфаниламидов с триметопримом приближается по своей активности к антибиотикам
3 ☐ Сульфаниламиды используют для лечения тяжёлых назокомиальных инфекций

№205

Общие принципы химиотерапии туберкулеза:
1 ☑ Обязательная комбинация 2-3х противотуберкулезных препаратов
2 ☑ Длительный курс лечения
3 ☑ Учет внутриклеточной локализации микобактерий
4 ☐ С целью снижение побочных эффектов применятся перерывы в лечении

№206

Укажите противотуберкулезный препарат, угнетающий синтез миколевых кислот
1 ○ Рифампицин
2 ○ Стрептомицин
3 ◉ Изониазид

№207

Побочные эффекты сульфаниламидов включают:
1 ☑ Гематотоксичность
2 ☑ Гепатотоксичность
3 ☑ Кристаллурию
4 ☐ Поражение костной ткани

№208

Отметьте верные утверждения:
1 ☐ Сульфаниламиды обладают бактерицидным действием
2 ☑ Сульфаниламиды обладают бактериостатическим действием
3 ☐ Комбинация триметоприма с сульфаниламидом дает бактериостатический эффект
4 ☑ Комбинация триметоприма с сульфаниламидом дает бактерицидный эффект

№209

Отметьте верные утверждения:
1 ☑ Офлоксацин обладает бактерицидным действием
2 ☑ Офлоксацин нарушает процесс спирализации ДНК, блокируя ДНК-гиразу
3 ☑ Офлоксацин обладает широким спектром антимикробного действия
4 ☐ Офлоксацин нарушает синтез клеточной стенки

№210

Профилактика невритов, вызванных изониазидом, включает в себя применение:
1 ○ Витамина К
2 ○ Обильное щелочное питье
3 ○ Витамина D
4 ◉ Витаминов В1 и В6

ТЗ2

ОПК-3

№211

Определите причины запрещения для использования в отдельных видах спорта (у определённых групп спортсменов) определённых лекарственных средств:

1	(1)	Гонадотропин и лютеинизирующий гормон, а также их рилизинг-факторы	[1]	относятся к запрещённым для использования в спорте только для мужчин.
2	(2)	Бета-блокаторы относятся к запрещённым веществам так как их применение позволяет уменьшить частоту сердечных сокращений и тем самым потребность в кислороде	[2]	в таких видах спорта как "подводная охота", "подводное плавание" и "подводный спорт".
3	(3)	Бета-блокаторы относятся к запрещённым веществам так как их применение позволяет предотвратить избыточную физиологическую реакцию на психоэмоциональное напряжение и улучшить концентрацию внимания	[3]	в таких видах спорта как "автомобильный спорт", "бильярдный спорт", "дартс", "гольф" и все виды стрельбы по мишеням.

№212

Определите причины запрещения для использования в спорте определённых лекарственных средств:

1	(1)	Диуретические средства	[1]	при увеличении объёма мочи возможна затруднение (маскировка) определения в ней допинговых веществ.
2	(2)	Внутривенное введение альбумина и коллоидных инфузионных растворов	[2]	при увеличении объёма плазмы крови возможно затруднение (маскировка) измерения в ней допинговых веществ.
3	(3)	Ингибиторы ароматазы	[3]	фермент ароматаза обеспечивает превращение андрогенов в эстрогены, при ингибировании которого происходит накопление андрогенов и усиления их анаболического действия.

№213

Определите причины запрещения для использования в спорте определённых лекарственных средств:

1	(1)	Рекомбинантный соматотропный гормон, его аналоги и либерины	[1]	выраженное анаболическое действие, увеличение мышечной массы.
2	(1)	Андрогены и их аналоги	[2]	по причине возможной маскировки травм и воспалительных процессов, что может нанести вред здоровью спортсмена.
3	(1)	Инсулин и инсулиномиметики		
4	(2)	Системное применение глюкокортикосероидов в соревновательный период		

№214

Установите соответствие между препаратами, улучшающими когнитивные функции, и их групповой принадлежностью

1	(1)	Пирацетам	[1]	препарат ГАМК
2	(2)	Ривастигмин	[2]	ингибитор холинэстеразы
3	(3)	Глутаминовая кислота	[3]	аминокислота, возбуждающий нейромедиатор
4	(4)	Вазопрессин	[4]	гормон, нейропептид
5	(5)	Пиридоксин	[5]	витамин В6

№215

Определите механизм действия противорвотных препаратов:

1	(1)	Метоклопрамид	[1]	блокатор D2-дофаминовых рецепторов
2	(2)	Ондансетрон	[2]	селективный блокатор серотониновые 5-НТ3-рецепторов
3	(3)	Апрепитант	[3]	селективный высокоаффинный антагонист рецепторов нейрокинина I (NK1) субстанции Р.
4	(4)	Трифлуоперазин	[4]	нейролептик

№216

Установите соответствие между препаратом, запрещённым для использования в спорте и его фармакологической группой

1	(1)	Сальбутамол	[1]	бета-2-адреномиметик
2	(2)	Соматропин	[2]	аналог гормона роста гипофиза, с выраженным анаболическим действием
3	(3)	Дарбэпоэтин альфа	[3]	стимулятор эритропоэза
4	(4)	Небиволол	[4]	бета-1-адреноблокатор

№217

Установите соответствие между обозначениями витаминов и их коферментной формой

1	(1)	Витамин ВС	[1]	тетрагидрофолиевая кислота
2	(2)	Витамин РР	[2]	никотинамидадениндинуклеотид (НАД)
3	(3)	Витамин В2	[3]	флавиномононуклеотид (ФМН)
4	(4)	Витамин В1	[4]	тиамина пирофосфат
5	(5)	Витамин В6	[5]	пиридоксальфосфат

№218

Установите соответствие между витаминными препаратами и их "мишенью"

1	(1)	Тиамин	[1]	нервная система
2	(2)	Аскорбиновая кислота	[2]	соединительная ткань
3	(3)	Эргокальциферол	[3]	костная ткань
4	(4)	Ретинол	[4]	эпителий кожи и слизистых оболочек

№219

Установите соответствие между витаминными препаратами и их применением

1	(1)	Аскорбиновая кислота	[1]	цинга
2	(2)	Цианокобаламин	[2]	злокачественная мегалобластная анемия
3	(3)	Никотиновая кислота	[3]	пеллагра
4	(4)	Ретинол	[4]	гемералопия
5	(5)	Викасол	[5]	кровотечение

№220

Установите соответствие между витаминами и признаками их гипервитаминоза

1	(1)	Витамин С	[1]	оксалатурия
2	(2)	Витамин В1	[2]	Н-холинолитическое действие
3	(3)	Витамин РР	[3]	ульцерогенный эффект
4	(4)	Витамин А	[4]	явления менингизма
5	(5)	Витамин В12	[5]	кальцификация мягких тканей

ОПК-7

№221

Сопоставьте термины и их значение:

1	(1)	лекарственное вещество	[1]	вещество или комбинация веществ, обладающие биологической активностью и разрешены для применения для профилактики, диагностики или лечения заболеваний
2	(2)	лекарственная форма	[2]	состояние лекарственного средства, соответствующее способу его введения и содержащее определённую дозу или концентрацию лекарственного вещества
3	(3)	лекарственный препарат	[3]	готовое лекарственное средство, имеющее форму и предназначенное для профилактики, диагностики или лечения заболеваний
4	(4)	лекарственное средство	[4]	одно или несколько активных веществ, обладающих фармакологической активностью, независимо от природы происхождения веществ, предназначенное для контакта с организмом человека и (или) проникновения в органы и ткани, с целью профилактики, диагностики или лечения заболеваний

№222

Расставьте последовательно стадии фармакокинетики

1 Адсорбция
2 Дистрибьюция
3 Аккумуляция
4 Биотрансформация
5 Экскреция

Ответ: 1 2 3 4 5

№223

Укажите как изменяется концентрация лекарственного вещества в крови в разные фармакокинетические стадии:

1	(1)	Адсорбция	[1]	концентрация в крови повышается
2	(2)	Дистрибьюция	[2]	концентрация в крови не изменяется
3	(3)	Аккумуляция	[3]	концентрация в крови снижается

4 (3) Биотрансформация
5 (3) Экскреция

№224

Сопоставьте обозначение массы с предписанной рецептурной дозой:

1	(1)	5 мг	[1]	0,005
2	(2)	5 г	[2]	5,0
3	(3)	500 мг	[3]	0,5
4	(4)	50 мг	[4]	0,05
5	(5)	500 мкг	[5]	0,0005

№225

Определите технологическую группу для каждого из опиоидных лекарственных средств.

1	(1)	Настойка опия	[1]	Галеновый препарат
2	(2)	Омнопон - смесь алкалоидов, извлеченных из опия	[2]	Новогаленовый препарат
3	(3)	Морфин - основной алкалоид опия	[3]	Лекарственное вещество естественного происхождения
4	(4)	Фентанил - искусственно созданный аналог морфина	[4]	Синтетическое лекарственное вещество

№226

Дайте определение терминам:

1	(1)	Идиосинкарзия	[1]	Генетически детерминированная иммунонезависимая реакция гиперреактивности индивидуума на определенное лекарственное вещество
2	(2)	Анафилаксия	[2]	Опасная для жизни реакция гиперреактивности иммунной системы немедленного типа
3	(3)	Толерантность	[3]	Постепенное снижение эффекта препарата при постоянном применении
4	(4)	Тахифилаксия	[4]	Резкое генетически обусловленное снижение эффекта препарата

№227

Определите преобладающий механизм всасывания в желудочно-кишечном тракте по физико-химическим свойствам веществ?

1	(1)	Амфифильные вещества	[1]	пассивная диффузия
2	(2)	Гидрофильные незаряженные вещества	[2]	фильтрация - облегчённая диффузия
3	(3)	Гидрофильные заряженные вещества	[3]	только за счёт активного переноса
4	(4)	Липофильные вещества	[4]	пиноцитоз, с образованием хиломикрон

№228

Установите соответствие между офтальмологическими холинергическими препаратами и эффектами, которые они вызывают.

1	(1)	Пилокарпин	[1]	миоз = расширение Шлеммова канала = спазм аккомодации
2	(2)	Атропин	[2]	мидриаз = закрытие Шлеммова канала = паралич аккомодации

№229

Определите, к какой группе относятся местные анестетики.

1	(1)	Лидокаин	[1]	амидный
2	(1)	Артикаин	[2]	эфирный
3	(1)	Бупивакаин		
4	(2)	Прокаин		
5	(2)	Тетракаин		
6	(2)	Оксибупрокаин		

№230

Установите соответствие между препаратом, влияющим на афферентную иннервации и механизмом его действия

1	(1)	Отвар коры дуба	[1]	вызывает образование плотной плёнки, закрывающей нервные окончания от раздражения
2	(2)	Препараты термопсиса	[2]	оказывает рефлекторное отхаркивающее действие, за счёт раздражения чувствительных рецепторов желудка

3	(3)	Лидокаин	[3]	блокада Na-каналов нервных волокон чувствительных нейронов
4	(4)	Сульфат магния	[4]	раздражает механорецепторы кишечника и вызывает усиление перистальтики

№231

Выберите соответствующие симптомы для каждой стадии анестезии

1	(1)	Стадия обезболивания	[1]	сознание сохранено, но снижено
2	(2)	Стадия возбуждения	[2]	сознание отключено
3	(2)	Стадия хирургического наркоза	[3]	двигательное возбуждение
			[4]	расслабление мышц
			[5]	полная потеря болевой чувствительности

№232

Установите соответствие между средством, используемым в анестезиологии, и целью его применения

1	(1)	Галотан	[1]	ингаляционный анестетик
2	(2)	Тиопентал натрия	[2]	неингаляционный анестетик
3	(3)	Атропин	[3]	премедикационное средство для предотвращения рефлекторной брадикардии, бронхоспазма и гиперсекреции
4	(4)	Тримеперидин	[4]	опиоидный анальгетик для анальгезии при выходе из наркоза

№233

Установите соответствие между средством для неингаляционного наркоза и механизмом его действия:

1	(1)	Кетамин	[1]	антагонист возбуждающих NMDA-рецепторов, вызывает диссоциативную анестезию
2	(2)	Мидазолам	[2]	производное бензодиазепина, агонист бензадиазепиновых рецепторов, аллостерический модификатор ГАМК-рецепторного комплекса
3	(3)	Натрия оксибутират	[3]	аналог гамма-аминомасляной кислоты, агонист ГАМК-рецепторов
4	(4)	Пропофол	[4]	неспецифическое действие на липидные мембраны нейронов аналогичное ингаляционным анестетикам
5	(5)	Тиопентал натрия	[5]	барбитурат, аллостерический модификатор ГАМК-рецепторного комплекса

№234

Установите соответствие между средством, используемым в анестезиологии, и целью его применения

1	(1)	Суксаметоний	[1]	быстрый миорелаксант для интубации трахеи
2	(2)	Неостигмин	[2]	антихолинэстеразное средство для профилактики и лечения послеоперационной атонии кишечника
3	(3)	Бемегрид	[3]	аналептик, используемый при передозировке барбитуратов
4	(4)	Атропин	[4]	М-холинолитик для предотвращения ваготонии и слюнотечения

№235

Установите соответствие между психотропным средством, его группой и целью применения

1	(1)	Лоразепам	[1]	безадиазепиновый анксиолитик, лечение неврозов, сопровождающихся тревогой, волнением, страхами
2	(2)	Флуоксетин	[2]	депрессия
3	(2)	Амитриптилин	[3]	психоз
4	(3)	Галоперидол		

№236

Установите соответствие между противосудорожным препаратом и целью его применения:

1	(1)	Леводопа	[1]	базовое лечение паркинсонизма
2	(2)	Фенобарбитал	[2]	препарат для профилактики генерализованных эпилептических приступов
3	(3)	Диазепам	[3]	препарат для профилактики и купирования любых эпилептических приступов
4	(4)	Этосуксимид	[4]	профилактика малых и атипичных эпилептических приступов

№237

Установите соответствие между противосудорожным препаратом и целью его применения:

1	(1) Фенобарбитал	[1]	крупные эпилептические припадки
2	(2) Этосуксимид	[2]	небольшие приступы эпилепсии (абсансы)
3	(3) Вальпроат натрия	[3]	парциальные (очаговые) припадки
4	(4) Карбамазепин	[4]	все формы эпилепсии

№238

Установите соответствие между противосудорожным препаратом и механизмом его действия:

1	(1) Вальпроат	[1]	Способствует увеличению ГАМК, предотвращая его инактивацию
2	(2) Ламотриджин	[2]	блокирует Са-каналы Т-типа, уменьшая выброс нейромедиаторов
3	(3) Фенобарбитал	[3]	повышает чувствительность ГАМК-рецепторов
4	(4) Фенитоин	[4]	блокирует Na-каналы нейронов
5	(5) Перампанел	[5]	антагонист глутаматных AMPA рецепторов

№239

Установите соответствие между противопаркинсоническим препаратом и механизмом его действия:

1	(1) Леводопа	[1]	предшественник дофамина
2	(2) Бромокриптин	[2]	агонист дофаминовых рецепторов ЦНС
3	(3) Карбидопа	[3]	ингибитор периферической декарбоксилазы, снижает потребность в леводопе и её побочные эффекты
4	(4) Энтакапон	[4]	ингибитор катехол-О-метилтрансферазы (КОМТ)

№240

Установите соответствие между психотропными препаратами и показаниями для их применения:

1	(1) Диазепам	[1]	невроз
2	(2) Галоперидол	[2]	психоз
3	(3) Амитриптилин	[3]	депрессия
4	(4) Пирацетам	[4]	снижение умственной работоспособности

№241

Установите соответствие между антидепрессантами и механизмами их действия:

1	(1) Амитриптилин	[1]	ингибитор обратного захвата серотонина и норадреналина
2	(2) Флуоксетин	[2]	ингибитор обратного захвата серотонина нейронами
3	(3) Ниаламид	[3]	неселективный ингибитор МАО-А и МАО-В

№242

Установите соответствие между снотворным препаратом и его фармакологической группой

1	(1) Фенобарбитал	[1]	барбитураты
2	(2) Нитразепам	[2]	бензодиазепины
3	(3) Зопиклон	[3]	небензодиазепиновый агонист бензодиазепиновых рецепторов
4	(4) Хлоралгидрат	[4]	алифатические соединения

№243

Установите соответствие между лекарственным средством, действующим на опиоидные рецепторы и его применением

1	(1) Морфин	[1]	обезболивание при остром инфаркте миокарда
2	(2) Фентанил	[2]	обезболивание при хирургических операциях
3	(3) Лоперамид	[3]	антидиарейное средство
4	(4) Апоморфин	[4]	стимуляция рвотного центра
5	(5) Кодеин	[5]	подавление кашля

№244

Установите соответствие между препаратами анальгетиков и их показания к применению

1	(1) Фентанил	[1]	для нейролептанальгезии
2	(2) Баралгин	[2]	при почечной колике
3	(3) Морфин	[3]	для устранения боли при инфаркте миокарда
4	(4) Аспирин	[4]	для уменьшения агрегации тромбоцитов

№245

Установите соответствие между обезболивающим препаратом и областью его применения

1	(1)	Прокаин	[1]	местный анестетик для инфильтрационной анестезии
2	(2)	Тримеперидин	[2]	опиоидный анальгетик, устраняющее онкологическую боль
3	(3)	Диклофенак	[3]	НПВС, уменьшающее боль при воспалении
4	(4)	Галотан	[4]	средство для ингаляционной анестезии

№246

Установите соответствие между наркотическим анальгетиком и типом взаимодействия с опиоидными рецепторами

1	(1)	Морфин	[1]	агонист мю-, дельта- и каппа-рецепторов
2	(2)	Бупренорфин	[2]	агонистом мю- и антагонистом каппа-рецепторов
3	(3)	Налоксон	[3]	антагонист мю-, дельта- и каппа-рецепторов
4	(4)	Трамадол	[4]	агонист опиоидных рецепторов и симпатомиметик

№247

Установите соответствие между слабительными средствами и механизмом их действия

1	(1)	Сульфат магния	[1]	увеличивает объем содержимого кишечника
2	(2)	Касторовое масло	[2]	при расщеплении выделяется рициноловая кислота, которая раздражает кишечник
3	(3)	Сеннозиды А и В	[3]	высвобождают хризофановую кислоту при расщеплении кишечными бактериями
4	(4)	Жидкий парафин (вазелиновое масло)	[4]	размягчает содержимое толстого кишечника

№248

Установите соответствие между препаратами для лечения язвенной болезни желудка и целью их применения

1	(1)	Омепразол	[1]	снижение секреции соляной кислоты и повреждение слизистой оболочки желудка
2	(2)	Амоксициллин	[2]	эрадикация Helicobacter pylori
3	(3)	Маалокс(r) (Альгельдрат + гидроксид магния)	[3]	нейтрализация HCl, защита слизистой оболочки желудка и облегчение острой боли

№249

Установите соответствие между противорвотным препаратом и его фармакологической группой

1	(1)	Метоклопрамид	[1]	блокатор D2-дофаминовых рецепторов
2	(2)	Скополамин	[2]	блокатор М-холинорецепторов
3	(3)	Дифенгидрамин	[3]	блокатор Н1-гистаминовых рецепторов
4	(4)	Дексаметазон	[4]	глюкокортикоид

№250

Установите соответствие между психотропными средствами и их применением

1	(1)	Диазепам	[1]	при неврозах
2	(2)	Галоперидол	[2]	при психозах
3	(3)	Амитриптилин	[3]	при депрессии
4	(4)	Пирацетам	[4]	для улучшения памяти

№251

Установите соответствие между препаратами антидепрессантами и механизмами их действия

1	(1)	Амитриптилин	[1]	ингибитор захвата серотонина и норадреналина
2	(2)	Флуоксетин	[2]	ингибитор нейронального захвата серотонина
3	(3)	Ниаламид	[3]	ингибитор МАО-А и МАО-В

№252

Установите соответствие для каждого препарата, улучшающие память и его групповой принадлежностью

1	(1)	Пирацетам	[1]	препарат ГАМК
2	(2)	Ривастигмин	[2]	ингибитор холинэстеразы
3	(3)	Глутаминовая кислота	[3]	аминокислота возбуждающего действия
4	(4)	Цитиколин	[4]	предшественником фосфолипидов клеточной мембраны
5	(5)	Пиридоксин	[5]	витамин В6

№253

Установите соответствие между средствами, влияющими на перистальтику желудочно-кишечного тракта, и их клиническим эффектом:

1	(1)	Апоморфин	[1]	рвотное средство
2	(2)	Метаклопромид	[2]	противорвотное средство

3	(3)	Касторовое масло	[3]	слабительное средство
4	(4)	Лоперамид	[4]	противодиарейное средство

№254

Установите соответствие между средствами, влияющими на перистальтику желудочно-кишечного тракта, и механизмом их действия:

1	(1)	Апоморфин	[1]	агонист центральных опиоидных рецепторов
2	(2)	Метаклопромид	[2]	антагонист дофаминовых (D2) рецепторов и серотониновых (5-НТ3) рецепторов
3	(3)	Касторовое масло	[3]	раздражение рецепторов желудочно-кишечного тракта
4	(4)	Лоперамид	[4]	Агонист желудочно-кишечных опиоидных рецепторов

№255

Установите соответствие механизмов действия для препаратов слабительных средств.

1	(1)	Магния сульфат	[1]	увеличивает объём кишечного содержимого за счёт задержки воды (осмотическое действие)
2	(2)	Масло касторовое	[2]	выделяет рициноловую кислоту, раздражает хеморецепторы
3	(3)	Препарат сенны	[3]	выделяет хризофановую кислоту, раздражает хеморецепторы
4	(4)	Масло вазелиновое	[4]	размягчает содержимое толстого кишечника, облегчает продвижение каловых масс

№256

Установите соответствие между препаратами слабительных средств и его применением.

1	(1)	Магния сульфат	[1]	при остро возникшем запоре
2	(2)	Препарат корня ревеня	[2]	при хронических запорах
3	(1)	Масло касторовое		
4	(1)	Бисакодил		
5	(2)	препарат коры крушины		

№257

Установите соответствие между желудочно-кишечным средством и показанием для его применения.

1	(1)	Магния сульфат	[1]	остро возникший запор
2	(2)	Омепразол	[2]	язвенная болезнь 12-перстной кишки
3	(3)	Сенаде	[3]	хронические запоры
4	(4)	Эспумизан	[4]	метеоризм
5	(5)	Аллохол	[5]	хронический холецистит

№258

Сопоставьте отхаркивающее средство с механизмом его действия

1	(1)	Бикарбонат натрия	[1]	подщелачивает мокроту и растворяет муцин
2	(2)	Ацетилцистеин	[2]	разрушает дисульфидные связи протеогликанов мокроты
3	(3)	Препарат термопсис	[3]	рефлекторно стимулирует отхаркивание
4	(4)	Амброксол	[4]	препятствует полимеризации мукопротеинов и мукополисахаридов мокроты
5	(5)	Трипсин	[5]	вызывает деполимеризацию белковых молекул мокроты

№259

Установите соответствие между лекарственными средствами, применяемыми при бронхиальной астме, и их фармакологической группой:

1	(1)	Ипратропий	[1]	М-холинолитик
2	(2)	Фенотерол	[2]	бета-2 адреностимулятор
3	(3)	Аминофиллин	[3]	миотропный аденозинергический спазмолитик
4	(4)	Препараты термопсиса	[4]	отхаркивающее средство

№260

Установите соответствие между препаратами, используемыми при бронхиальной астме, и областью применения:

1	(1)	Сальбутамол	[1]	для купирования бронхоспазма
2	(2)	Кромоглициевая кислота	[2]	для уменьшения потребности в других средствах профилактики и купирования бронхоспазма
3	(3)	Беклометазон	[3]	для профилактики бронохоспазма и десентизации адренорецепторов

4	(4)	Аминофиллин	[4]	для профилактики и купирования тяжелого бронхоспазма

№261

Установите соответствие между препаратами для лечения респираторных инфекций и их фармакологической группой:

1	(1)	Ко-тримоксазол	[1]	синтетический комбинированный антимикробный препарат
2	(2)	Ацетилсалициловая кислота	[2]	нестероидный противовоспалительный препарат
3	(3)	Преноксдиазин	[3]	противокашлевое средство
4	(4)	Ацетилцистеин	[4]	отхаркивающее средство
5	(5)	Скипидарное масло	[5]	раздражающее средство

№262

Установите соответствие между диуретиками и локализацией их действия в нефроне:

1	(1)	Ацетазоламид	[1]	проксимальный каналец
2	(2)	Фуросемид	[2]	восходящая петля Генле
3	(3)	Гидрохлоротиазид	[3]	начало дистального канальца
4	(4)	Спиронолактон	[4]	дистальный отдел нефрона
5	(5)	Маннитол	[5]	все части нефрона

№263

Установите соответствие между диуретиками и механизмом их действия:

1	(1)	Ацетазоламид	[1]	ингибитор карбоангидразы
2	(2)	Этакриновая кислота	[2]	ингибитор сукцинатдегидрогеназы
3	(3)	Фуросемид	[3]	блокатор котранспортера Na-K-2Cl петли Генле
4	(4)	Триамтерен	[4]	блокатор Na-каналов дистального канальцевого эпителия
5	(5)	Маннитол	[5]	осмотическая стимуляция фильтрации

№264

Установите соответствие между диуретиками и их применением:

1	(1)	Фуросемид	[1]	для форсированного диуреза при отравлении
2	(2)	Гидрохлоротиазид	[2]	для длительного снижения АД при артериальной гипертензии
3	(3)	Ацетазоламид	[3]	при неонатальной гипертензии

№265

Установите соответствие между препаратами для лечения сердечной недостаточности и ее целями:

1	(1)	Дигоксин	[1]	увеличение сердечного выброса
2	(2)	Лидокаин	[2]	лечение аритмий
3	(3)	Эналаприл	[3]	разгрузка миокарда за счет расширения сосудов
4	(4)	Гидрохлоротиазид	[4]	разгрузка миокарда за счет уменьшения объема циркулирующей крови

№266

Установите соответствие между антиаритмическими препаратами и механизмом их действия

1	(1)	Амиодарон	[1]	блокирует K-каналы (замедляет реполяризацию)
2	(2)	Хинидин	[2]	блокирует Na- и K-каналы
3	(3)	Верапамил	[3]	блокирует Ca-каналы миокарда
4	(4)	Лидокаин	[4]	блокирует Na-каналы
5	(5)	Атенолол	[5]	блокирует бета-1-адренорецепторы сердца

№267

Установите соответствие между антиаритмическими препаратами и их показаниями к применению:

1	(1)	Пропранолол	[1]	при тахиаритмиях любой локализации
2	(2)	Дигоксин	[2]	при наджелудочковых тахиаритмиях
3	(3)	Лидокаин	[3]	при желудочковых тахиаритмиях
4	(4)	Атропин	[4]	при брадиаритмиях и блокадах сердца

№268

Установите соответствие между сосудорасширяющими средствами и механизмом их действия

1	(1)	Нитроглицерин	[1]	донор NO, являющегося эндогенным релизинг фактором
2	(2)	Папаверин	[2]	аденозинергический ингибитор фосфодиэстеразы
3	(3)	Верапамил	[3]	блокатор медленных Ca-каналов

4	(4)	Клонидин	[4]	центральный альфа2-адренергический агонист
5	(5)	Эналаприл	[5]	ингибитор ангиотензинпревращающего фермента

№269

Установите соответствие между блокаторами Са-каналов и их применением

1	(1)	Верапамил	[1]	при предсердных тахиаритмиях
2	(2)	Нифедипин	[2]	при ишемической болезни сердца и артериальной гипертензии
3	(3)	Циннаризин	[3]	при нарушении мозгового кровообращения

№270

Установите соответствие между антигипертензивными препаратами, действующими на ренин-альдостерон-ангиотензиновую систему (РААС), и механизмом их действия

1	(1)	Алискирен	[1]	уменьшает высвобождение ренина
2	(2)	Эналаприл	[2]	ингибирует ангиотензинпревращающий фермент
3	(3)	Лозартан	[3]	блокирует рецепторы ангиотензина
4	(4)	Спиронолактон	[4]	антагонист альдостерона

№271

Установите соответствие между антигипертензивными препаратами и их основными побочными эффектами

1	(1)	Пропранолол	[1]	AV-блокада
2	(2)	Гидрохлоротиазид	[2]	гипокалиемия
3	(3)	Резерпин	[3]	повышенная желудочная секреция и образование язв
4	(4)	Эналаприл	[4]	сухой кашель
5	(5)	Празозин	[5]	ортостатическая гипотензия, "феномен первой дозы"

№272

Установите соответствие между антиатеросклеротическими препаратами и их групповой принадлежностью

1	(1)	Холестирамин	[1]	секвестрант желчных кислот
2	(2)	Никотиновая кислота	[2]	витамин, ингибирующий липолиз
3	(3)	Токоферола ацетат	[3]	антиоксидант, активный в липидной фазе
4	(4)	"Эссенциале" (фосфолипиды)	[4]	комплекс полиненасыщенных жирных кислот

№273

Установите соответствие между противовоспалительным средством и его групповой принадлежностью

1	(1)	Пеницилламин	[1]	иммунодепрессанты
2	(2)	Ибупрофен	[2]	нестероидные противовоспалительные препараты
3	(3)	Преднизолон	[3]	глюкокортикостероиды, стероидные противовоспалительные средства
4	(4)	Скипидарное масло	[4]	местные раздражители

№274

Установите соответствие между противовоспалительным средством и целью его применения при ревматоидном артрите

1	(1)	Пеницилламин	[1]	противорецидивное средство
2	(2)	Ибупрофен	[2]	лечение легких и среднетяжелых обострений
3	(3)	Преднизолон	[3]	лечение тяжелого обострения
4	(4)	Скипидарное масло	[4]	отвлекающий эффект, улучшение трофики суставов

№275

Установите соответствие между нестероидными противовоспалительными средствами и их химической группой:

1	(1)	Ацетилсалициловая кислота	[1]	производное салициловой кислоты
2	(2)	Метамизол натрия	[2]	производное пиразолона
3	(3)	Диклофенак	[3]	производное фенилуксусной кислоты
4	(4)	Ибупрофен	[4]	производное фенилпропионовой кислоты
5	(5)	Индометацин	[5]	производное индолуксусной кислоты
6	(6)	Целекоксиб	[6]	коксибы

№276

Установите соответствие между препаратами метаболического действия и их применением в гематологии

1	(1)	Ферроплекс	[1]	при гипохромной анемии
2	(2)	Цианкобаламин	[2]	при гиперхромной анемии

3	(3)	Метилурацил	[3]	при агранулоцитозе
4	(4)	Преднизолон	[4]	при остром лейкозе
5	(5)	Ацетилсалициловая кислота	[5]	для профилактики тромбоза

№277

Установите соответствие между противоопухолевыми препаратами и их группой

1	(1)	Метотрексат	[1]	антиметаболит
2	(2)	Тиамазол	[2]	антитиреоидный препарат
3	(3)	Циклофосфамид	[3]	алкилирующие агенты
4	(4)	Нандролон	[4]	анаболический препарат
5	(5)	Винкристин	[5]	противоопухолевые средства растительного происхождения

№278

Установите соответствие между противоопухолевыми препаратами и механизмом их действия

1	(1)	Циклофосфамид	[1]	алкилирование ДНК
2	(2)	Метотрексат	[2]	антиметаболит фолиевой кислоты
3	(3)	Демекольцин (Колхамин)	[3]	нарушение сборки и образования веретена деления
4	(4)	Доксорубицин	[4]	противоопухолевый антибиотик антрациклинового ряда, ингибирует синтез нуклеиновых кислот путём встраивания в двойную спираль ДНК между парами азотистых оснований и вызывает ее расщепление
5	(5)	L-аспарагиназа	[5]	создает дефицит аспарагина в опухолевых клетках

№279

Установите соответствие между гемостатическими средствами и механизмом их действия

1	(1)	Препарат кальция	[1]	фактором свертывания крови (F IV)
2	(2)	Менадиона натрия бисульфит	[2]	синтетический аналог витамина К, стимулирует синтез протромбина
3	(3)	Аминокапроновая кислота	[3]	ингибирует фибринолиз
4	(4)	Этамзилат	[4]	стимулирует образование тромбоцитов и их высвобождение из костного мозга, активирует образование тканевого тромбопластина (F III) в месте повреждения мелких сосудов

№280

Установите соответствие между гормональными препаратами и механизмом их действия

1	(1)	Инсулин	[1]	активирует тирозинкиназу
2	(2)	Альдостерон	[2]	стимулирует синтез пермеаз в почках
3	(3)	Преднизолон	[3]	ингибирует фосфолипазу А2
4	(4)	Кортикотропин	[4]	стимулирует аденилатциклазу, повышает уровень цАМФ - аллостерического модулятора протеинкиназ

№281

Установите соответствие между лекарственным средством и его влиянием на лактацию

1	(1)	Никотиновая кислота	[1]	увеличивает лактацию
2	(2)	Пиридоксин	[2]	снижает лактацию
3	(3)	Фуросемид	[3]	снижает секрецию молока
4	(4)	Токоферол	[4]	увеличивает секрецию молока

№282

Установите соответствие между пероральными гипогликемическими препаратами и их основным механизмом действия

1	(1)	Глибенкламид	[1]	блокада К-канала бета-клеток поджелудочной железы, увеличение секреции инсулина
2	(2)	Метформин	[2]	стимуляция анаэробного гликолиза
3	(3)	Акарбоза	[3]	блокада альфа-глюкозидазы и снижение переваривания полисахаридов и всасывания глюказы
4	(4)	Глюкагон	[4]	усиление синтеза гликогена

№283

Установите соответствие между препаратами, снижающими высвобождение биологически активных веществ при гиперчувствительности немедленного типа, и механизмом их действия

1 (1) Адреналин [1] стимулятор аденилатциклазы
2 (2) Эуфиллин [2] ингибитор фосфодиэстеразы
3 (3) Верапамил [3] блокатор кальциевых каналов
4 (4) Преднизолон [4] глюкокортикостероид

№284

Установите соответствие между лекарственными средствами, влияющими на метаболизм простагландинов, и его основным механизмом действия

1 (1) Преднизолон [1] ингибирование фосфолипазы А2
2 (2) Диклофенак [2] ингибирование ЦОГ-1 и ЦОГ-2
3 (3) Зафирлукаст [3] блокада лейкотриеновых рецепторов (LTD4)

№285

Установите соответствие между противоаллергическими препаратами и их показаниями

1 (1) Преднизолон [1] анафилактический шок
2 (2) Фенотерол [2] бронхоспазм
3 (3) Димедрол [3] крапивница

№286

Установите соответствие между иммунодепрессантом и его группой

1 (1) Циклоспорин [1] антибиотик - ингибитор IL-2
2 (2) Преднизолон [2] глюкокортикостероид
3 (3) Хлорохин [3] противомалярийный препарат
4 (4) Метотрексат [4] противоопухолевый антиметаболит

№287

Установите соответствие между антибактериальным средством и чувствительным к нему микроорганизмом.

1 (1) Бензилпенициллин [1] Стафилококковые инфекции
2 (2) Азитромицин (Сумамед) [2] Хламидиоз
3 (3) Гентамицин [3] Синегнойная палочка
4 (4) Тетрациклин [4] Холерный вибрион

№288

Установите соответствие между антибактериальным средством и типом его действия

1 (1) Ампициллин [1] бактерицидное
2 (2) Тетрациклин [2] бактериостатическое
3 (1) Полимиксин
4 (2) Эритромицин
5 (1) Цефотаксим

№289

Установите соответствие между антибиотиками и механизмом их действия

1 (1) Полимиксин [1] нарушение проницаемости цитоплазматической мембраны
2 (2) Рифампицин [2] ингибирование синтеза РНК
3 (3) Бензилпенициллин [3] нарушение синтеза клеточной стенки
4 (4) Тетрациклин [4] ингибирование синтеза белка на рибосомах

№290

Сопоставьте группу антибиотиков с их типичными нежелательными эффектами

1 (1) Аминогликозиды [1] ототоксичность
2 (2) Цефалоспорины [2] нефротоксичность
3 (3) Левомицетин [3] угнетение кроветворения
4 (4) Пенициллины [4] аллергические реакции
5 (5) Тетрациклины [5] гепатотоксичность, повреждение костей

№291

Установите соответствие между противотуберкулезными препаратами и механизмом их действия

1 (1) Стрептомицин [1] ингибирование синтеза белка на уровне рибосом
2 (2) Рифампицин [2] ингибирование синтеза РНК
3 (3) Ципрофлоксацин [3] ингибирование топоизомераз II и IV и репликации ДНК
4 (4) Изониазид [4] нарушение синтеза миколовой кислоты клеточной стенки
5 (5) Аминосалициловая кислота [5] конкуренция с парааминобензойной кислотой (ПАБК)

№292

Сопоставьте противотуберкулезные препараты с их основными нежелательными эффектами

1	(1)	Этамбутол	[1]	нарушение зрения
2	(2)	Стрептомицин	[2]	ототоксичность
3	(3)	Рифампицин	[3]	повреждение хрящевой ткани
4	(4)	Изониазид	[4]	периферический неврит (полинейропатия)
5	(5)	Ципрофлоксацин	[5]	дисфункция печени

№293

Установите соответствие между противовирусными препаратами и чувствительной к ним вирусной инфекцией

1	(1)	Ацикловир	[1]	герпетическая инфекция
2	(2)	Арбидол	[2]	гриппозная инфекция
3	(3)	Зидовудин	[3]	ВИЧ-инфекция
4	(4)	Метисазон	[4]	вирус оспы и аденовирусы

№294

Установите соответствие между противовирусными средствами и механизмом их действия

1	(1)	Римантадин	[1]	ингибирует высвобождение вирусного генома
2	(2)	Ацикловир	[2]	ингибирует синтез вирусных нуклеиновых кислот
3	(3)	Интерферон	[3]	повышает устойчивость клеток хозяина к вирусной атаке
4	(4)	Арбидол	[4]	интерфероноген - стимулирует выработку интерферонов

№295

Установите соответствие между противовирусными препаратами и их группой

1	(1)	Арбидол	[1]	интерфероноген
2	(2)	Римантадин	[2]	ингибитор вирусного мембранного белка (М2)
3	(3)	Диоксотетрагидрокситетрагидронафталин (оксолин)	[3]	вирулицидный препарат для местного применения
4	(4)	Интерферон	[4]	иммуностимулятор

№296

Установите соответствие между противоамёбными чредствами и локализацией их действия

1	(1)	Эметин	[1]	действует на амеб как в стенке кишечника, так и в печени
2	(2)	Хлорохин	[2]	действует на амеб в печени
3	(3)	Метронидазол	[3]	действует на амеб любой локализации
4	(4)	Тетрациклин	[4]	непрямой амебицид, подавляет рост кишечной микрофлоры - лишает амеб пищевой базы

№297

Установите соответствие между антигельминтными препаратами и чувствительными к ним гельминтозами

1	(1)	Пирантел	[1]	аскаридоз и энтеробиоз
2	(2)	Празиквантел	[2]	цестодозы и трематоды
3	(3)	Никлозамид	[3]	кишечные цестодозы, кроме тениоза

№298

Установите соответствие между противоинфекционными препаратами и инфекцией, для лечения которой они используются

1	(1)	Хлорохин	[1]	малярия
2	(2)	Ацикловир	[2]	герпес слизистых оболочек
3	(3)	Метронидазол	[3]	трихомониаз
4	(4)	Зидовудин	[4]	ВИЧ-инфекция
5	(5)	Бензилпенициллин	[5]	сифилис

№299

Установите соответствие между противогрибковыми препаратами и заболеванием, при котором они применяются

1	(1)	Амфотерицин В	[1]	системные и глубокие микозы
2	(2)	Нистатин	[2]	кандидоз слизистых оболочек
3	(3)	Спиртовой раствор йода	[3]	дерматомикоз

№300

Установите соответствие между синтетическими антибактериальными средствами и их фармацевтической группой

1	(1)	Ко-тримоксазол	[1]	комбинированный сульфаниламид
2	(2)	Нитрофурантоин	[2]	производное нитрофурана
3	(3)	Ципрофлоксацин	[3]	производное фторхинолона
4	(4)	Диоксидин	[4]	производное 8-гидроксихинолина
5	(5)	Нитроксолин (5-NOC)	[5]	производное хиноксалина

№301

Установите соответствие между синтетическими антибактериальными средствами и механизмом их действия

1	(1)	Сульфадиметоксин	[1]	конкуренция с парааминобензойной кислотой (ПАБК) в процессе синтеза фолиевой кислоты
2	(2)	Ципрофлоксацин	[2]	ингибирование гиразы и топоизомеразы во время репликации ДНК
3	(3)	Нитрофурал	[3]	восстановление нитрогруппы и образование комплексов с рибосомальными белками

№302

Установите соответствие между маточными средствами и их показаниями для применения.

1	(1)	Фенотерол	[1]	для задержки преждевременных родов
2	(2)	Окситоцин	[2]	для стимуляции родов
3	(3)	Атропин	[3]	для понижения тонуса шейки матки
4	(4)	Кислота аминокапроновая	[4]	для остановки маточных кровотечений при повышенном фибринолизе

№303

Установите соответствие между средством, используемым при слабой родовой деятельности и его предназначением.

1	(1)	Атропин	[1]	для расслабления шейки матки
2	(2)	Окситоцин	[2]	для стимуляции миометрия
3	(3)	Тримеперидин (Промедол)	[3]	для обезболивания родов
4	(4)	Гексэстрол	[4]	аналог эстрогенов нестероидного строения – для повышения эстрогенного фона

ИИ

№304

Сопоставьте следующие лекарственные препараты с их основными механизмами действия:

1	(1)	Омепразол	[1]	Ингибитор протонного насоса
2	(2)	Амлодипин	[2]	Блокатор кальциевых каналов
3	(3)	Варфарин	[3]	Ингибитор витамина К редуктазы
4	(4)	Левофлоксацин	[4]	Ингибитор топоизомеразы II

№305

Расставьте следующие этапы фармакокинетики в правильной последовательности:

1 Абсорбция
2 Распределение
3 Метаболизм
4 Выделение

Ответ: 1 2 3 4

№306

Сопоставьте препараты с их типичными побочными эффектами:

1	(1)	Метформин	[1]	Гастроинтестинальные нарушения
2	(2)	Преднизолон	[2]	Повышенная восприимчивость к инфекциям
3	(3)	Тимолол	[3]	Брадикардия
4	(4)	Ципрофлоксацин	[4]	Тендонит

№307

Установите соответствие между препаратами и их преимущественным использованием:

1	(1)	Клопидогрел	[1]	Профилактика тромбоза
2	(2)	Литий	[2]	Лечение биполярного расстройства
3	(3)	Нифедипин	[3]	Стабильная стенокардия
4	(4)	Ранитидин	[4]	Язвенная болезнь

№308

Укажите порядок действий при внутривенном введении препаратов:

1 Проверка целостности упаковки и срока годности препарата.
2 Дезинфекция места инъекции.
3 Набор препарата в шприц.
4 Подключение к системе инфузий.

Ответ: 1 2 3 4

№309

Сопоставьте классы антибиотиков с их типичным спектром действия:

1	(1) Пенициллины	[1] Грамположительные бактерии
2	(2) Тетрациклины	[2] Широкий спектр действия
3	(3) Аминогликозиды	[3] Грамотрицательные бактерии
4	(4) Макролиды	[4] Атипичные патогены

№310

Определите последовательность действий при подготовке и проведении парентерального введения лекарственных средств:

1 Проверка правильности препарата и дозировки.
2 Подготовка кожи пациента.
3 Введение препарата.
4 Утилизация использованных материалов.

Ответ: 1 2 3 4

№311

Соотнесите медикаменты с их главными индикациями:

1	(1) Дигоксин	[1] Сердечная недостаточность
2	(2) Цефтриаксон	[2] Бактериальные инфекции
3	(3) Ибупрофен	[3] Боль и воспаление
4	(4) Инсулин	[4] Диабет 1 типа

№312

Сопоставьте антигипертензивные препараты с их типичными целевыми органами:

1	(1) Атенолол	[1] Сердце
2	(2) Каптоприл	[2] Почки
3	(3) Амлодипин	[3] Сосуды
4	(4) Гидрохлоротиазид	[4] Почечные трубочки

№313

Расположите в правильном порядке этапы лекарственной терапии при лечении туберкулеза:

1 Интенсивная фаза с четырьмя препаратами.
2 Мониторинг побочных эффектов.
3 Поддерживающая фаза с двумя препаратами.
4 Оценка эффективности терапии.

Ответ: 1 2 3 4

№314

Свяжите противоэпилептические препараты с их основными побочными эффектами:

1	(1) Ламотриджин	[1] Атаксия и нарушение координации
2	(2) Вальпроевая кислота	[2] Гепатотоксичность
3	(3) Карбамазепин	[3] Сыпь
4	(4) Фенитоин	[4] Гингивальная гиперплазия

№315

Укажите последовательность клинической оценки нового противоракового препарата:

1 Предклинические испытания.
2 Клинические испытания фазы I.
3 Регистрация препарата.
4 Клинические испытания фазы III.

Ответ: 1 2 3 4

ТЗЗ

Задача 1

Сообщение

Пациенту с язвенной болезнью был назначен Омепразол, но эффективность снятие болевого синдрома оказалось недостаточной, поэтому врач порекомендовал дополнительно Фосфалюгель (Алюминия фосфат). У пациента прошли боли, но возникла задержка стула (запор).
Выберите один или несколько правильных ответов.

№316

Какие лекарственные средства снижают секрецию соляной кислоты в желудке?

1 ☑ М-холинолитики
2 ☑ Блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов
3 ☑ Блокаторы Н+/К+-АТФазы
4 ☐ Гастропротекторы
5 ☐ Антациды

№317

К какой группе относится Омепразол?

1 ○ М-холинолитики
2 ○ Блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов
3 ◉ Блокаторы Н+/К+-АТФазы
4 ○ Гастропротекторы
5 ○ Антациды

№318

Какими фармакологическими эффектами обладает Фосфалюгель (Алюминия фосфат)?

1 ☑ Антацидное
2 ☑ Обволакивающее
3 ☑ Адсорбирующее
4 ☐ Эрадикационное
5 ☐ Раздражающее

Задача 2

Сообщение

У пациента с язвенной болезнью желудка с повышенной кислотностью желудочного сока в образцах биопсии слизистой оболочки была обнаружена Helicobacter pylori. Пациенту были назначены препараты, подавляющие рост H. pylori в слизистой оболочке желудка: препараты, содержащие соли висмута, ингибиторы протонной помпы, антибиотики. Выберите один или несколько правильных ответов.

№319

Отметьте препараты, которые являются ингибиторами протонной помпы.

1 ☑ Омепразол
2 ☑ Лансопразол
3 ☐ Пирензепин
4 ☐ Ранитидин

№320

Выберите антибиотики, эффективные против H. pylori

1 ☑ Амоксициллин
2 ☐ Пенициллин
3 ☑ Метронидазол
4 ☑ Кларитромицин

№321

Как действует дицитрат трикалия висмута?

1 ☐ Стимулирует гистаминовые рецепторы
2 ☑ Подавляет развитие H. pylori
3 ☑ Образует защитную нерастворимую плёнку преимущественно на поражённой слизистой в желудке
4 ☐ Снижает секреторную функцию желудка

Задача 3

Сообщение

В связи с изнуряющим кашлем пациентке были назначены таблетки преноксдиазина. Пациентка разжевала таблетку и проглотила ее. Через некоторое время кашель заметно уменьшился, но пациентка почувствовала "онемение" во рту.
Выберите один или несколько правильных ответов.

№322

Выберите свойства, характерные для преноксдиазина

1. [x] Это периферическое противокашлевое средство
2. [ ] Угнетает кашлевой центр
3. [x] Снижает возбудимость чувствительных нервных окончаний бронхов
4. [x] Не вызывает привыкания
5. [ ] Обладает отхаркивающим действием

№323

Укажите показания к назначению противокашлевых средств:

1. [x] Острый ларингит
2. [x] Непродуктивный кашель
3. [x] Онкологические заболевания дыхательной системы
4. [ ] Туберкулез легких

№324

Укажите противопоказания для назначения противокашлевых препаратов:

1. [x] Гиперсекреторный бронхит
2. [ ] Сухой непродуктивный кашель
3. [x] Легочное кровотечение
4. [x] Бронхоэктазы
5. [ ] Острый фарингит

Задача 4

Сообщение

Пациент был госпитализирован в отделение неотложной помощи с приступом астмы, который не купировался ингаляционным бета-2 адреномиметиком. После проведения комплексной терапии пациент был выписан через три дня в удовлетворительном состоянии.
Выберите один или несколько правильных ответов.

№325

Укажите важнейшее направления терапии астматического статуса, направленное на восстановление чувствительности бета-2 адренорецепторов?

1. ( ) Ингаляционное применение бета-2 адреномиметиков
2. ( ) Внутривенное введение бета-2 адреномиметиков
3. ( ) Ингаляционное применение глюкокортикостероидов
4. (•) Внутривенное введение глюкокортикостероидов

№326

Для снятия бронхоспазма при астматическом статусе применяется ...?

1. ( ) Ингаляционное применение бета-2 адреномиметиков
2. ( ) Внутривенное введение бета-2 адреномиметиков
3. ( ) Пероральный приём Теофиллина
4. (•) Внутривенной введение Аминофиллина (Эуфиллина)

№327

Укажите группы лекарственных средств, обладающих броходилатирующим действием - способные снять бронхоспазм:

1. [x] Бета-2 адреномиметики
2. [x] Метилксантины - аденозинергические средства
3. [ ] Глюкокортикостероиды
4. [x] М-холинолитики
5. [ ] Альфа-адреномиметики

Задача 5

Сообщение

Пациент предъявляет жалобы на общую слабость, недомогание, снижение работоспособности, изменение вкуса, нарушение глотания с ощущением инородного тела в горле, учащенное сердцебиение, одышку. Лабораторные исследования показали картину гипохромной анемии.
Выберите один или несколько правильных ответов.

№328

Какова возможная причина гипохромной анемии?

1 ◉ Дефицит железа
2 ○ Дефицит фолиевой кислоты
3 ○ Дефицит витамина B12
4 ○ Дефицит кобальта

№329

В какой форме железо лучше всего усваивается организмом?

1 ○ В неионизированном виде
2 ◉ В виде двухвалентного иона
3 ○ В виде трехвалентного иона

№330

Каковы наиболее распространенные побочные эффекты энтеральных препаратов железа?

1 ○ Коллапс
2 ○ Артралгия
3 ○ Брадикардия
4 ○ Гиперемия лица и шеи
5 ◉ Диспептические расстройства

Задача 6

Сообщение

Пациентка, 18 лет, обратилась к врачу. При осмотре: астенический тип, питание понижено, язык ярко-красный, гладкий, наблюдаются неврологические симптомы - нарушение чувствительности и походки. В анализе крови обнаружены снижением гемоглобина, мегалоциты и гиперсегментированные нейтрофилы.
Выберите один или несколько правильных ответов.

№331

Каковы возможные причины гиперхромной мегалобластной анемии?

1 ☐ Дефицит железа
2 ☑ Дефицит фолиевой кислоты
3 ☑ Дефицит витамина B12
4 ☐ Дефицит кобальта

№332

Какие препараты используются для лечения гиперхромной анемии?

1 ☑ Цианокобаламин
2 ☐ Бисульфит натрия менадиона (витамин К1)
3 ☐ препараты железа
4 ☑ Фолиевая кислота

№333

Как применяется цианокобаламин для лечения мегалобластной анемии?

1 ☐ Энтерально
2 ☑ Подкожно
3 ☑ Внутримышечно
4 ☑ Внутривенно

Задача 7

Сообщение

Водитель автомобиля по совету родственника принял Дифенгидрамин (Димедрол) для устранения кожного зуда, который появился после завтрака, включавшего вареное яйцо и кофе. Через час после приёма препарата водитель попал в аварию, не справившись с управлением на перекрестке.
Выберите один или несколько правильных ответов.

№334

Каковы фармакологические эффекты Дифенгидрамина?

1 ☐ Усиливает действие гистамина
2 ☑ Противорвотное
3 ☑ Седативное и снотворное
4 ☑ Противоаллергическое
5 ☑ Увеличивает секрецию соляной кислоты в желудке

№335

Каков механизм действия Дифенгидрамина?

1 ○ Блокирует ГАМК-рецепторы
2 ◉ Блокирует Н1-гистаминовые рецепторы
3 ○ Стимулирует бета-2-адренорецепторы
4 ○ Ингибирует синтез гистамина

№336

Какие антигистаминные средства не обладают седативным действием?

1 ☑ Лоратадин
2 ☐ Дифенгидрамин (Димедрол)
3 ☐ Хлоропирамин (Супрастин)
4 ☑ Дезлоратадин

Задача 8

Сообщение

В клинику поступил пациент с острым инфарктом миокарда. Ему назначили внутривенное введение Гепарина и Фениндион перорально.
Выберите один или несколько правильных ответов.

№337

К какой фармакологической группе относится Фениндион (Фенилин)?

1 ○ Антитромбоцитарные средства
2 ○ Антикоагулянты прямого действия
3 ◉ Непрямые антикоагулянты
4 ○ Прямые ингибиторы тромбина
5 ○ Активаторы плазминогена

№338

Перечислите свойства непрямых антикоагулянтов:

1 ☐ Действуют немедленно
2 ☐ Не обладают кумулятивным эффектом
3 ☑ Действие отсроченное
4 ☑ Действие длительное
5 ☑ Активны только in vivo
6 ☐ Активен как in vivo, так и in vitro

№339

Каков механизм действия непрямых антикоагулянтов?

1 ○ Активация плазминогена
2 ○ Снижение вязкости крови
3 ◉ Конкурентный антагонизм с витамином К и ингибирование синтеза факторов свертывания крови
4 ○ Инактивация факторов свертывания в плазме крови

Задача 9

Сообщение

Для профилактики тромбообразования во время операции с использованием системы искусственного кровообращения использовался Гепарин. Это привело к неконтролируемому кровотечению.
Выберите один или несколько правильных ответов.

№340

Какое вещество используется при передозировке гепарина?

1 ○ Фениндион
2 ◉ Протамина сульфат
3 ○ Надропарин кальция
4 ○ Аминометилбензойная кислота

№341

К какой фармакологической группе относится Гепарин?

1 ○ Антиагреганты
2 ◉ Антикоагулянты прямого действия
3 ○ Антикоагулянты непрямого действия
4 ○ Прямые ингибиторы тромбина
5 ○ Активаторы плазминогена

№342

Назовите противопоказания к применению гепарина:

1 ☑ Активное кровотечение
2 ☑ Беременность
3 ☑ Предстоящая операция
4 ☐ Гиперкоагуляция

Задача 10

Сообщение

Пациенту с жалобами на плохой сон, раздражительность был назначен препарат из группы бензодиазепинов. Через три дня после ежедневного приема препарата пациентка отметила значительное улучшение: нормализовался сон, снизилась раздражительность, исчезла тревожность.
Выберите один или несколько правильных ответов.

№343

Выберите препараты, относящиеся к группе бензодиазепинов:

1 ☐ Галоперидол
2 ☐ Фенобарбитал
3 ☑ Диазепам
4 ☐ Дифенин
5 ☑ Феназепам

№344

Укажите фармакологические эффекты бензодиазепинов?

1 ☑ Седативное действие
2 ☑ Снотворные действие
3 ☑ Миорелаксирующее действие центрального типа
4 ☑ При внутривенный введение - средство для наркоза

№345

Что является антидотом при передозировке бензодиазепина?

1 ○ Налоксон
2 ◉ Флумазенил
3 ○ Атропин
4 ○ Леводопа

Задача 11

Сообщение

В клинику поступил пациент с симптомами острого отравления барбитуратами.
Выберите один или несколько правильных ответов.

№346

Каковы признаки отравления барбитуратами?

1 ☑ Длительное бессознательное состояние
2 ☐ Общее возбуждение
3 ☑ Угнетение дыхания
4 ☐ Галлюцинации

№347

Каков механизм действия барбитуратов?

1 ☐ Ингибирование центральных адренорецепторов
2 ☑ Конформационные ГАМК-рецепторы и открытие хлоридных каналов
3 ☑ Гиперполяризация пресинаптических мембран
4 ☐ Блокада ГАМК-рецепторов
5 ☐ Возбуждение бензодиазепиновых рецепторов

№348

Укажите необходимые меры при лечении отравления барбитуратами:

1 ☑ Форсированный диурез
2 ☑ Искусственная вентиляция легких
3 ☑ Использование ЛП для стимуляции дыхания (аналептики)
4 ☐ Назначение кардиостимулирующих препаратов

Задача 12

Сообщение

Для лечения неврастения пациенту У., были назначены соли брома. После 3 недель лечения пациент отметил повышенную сонливость, апатию. На коже появилась угревая сыпь. Пациента беспокоят насморк и конъюнктивит.
Выберите один или несколько правильных ответов.

№349

Укажите препараты, относящиеся к седативным средствам?

1 ☑ Бромид натрия
2 ☐ Экстракт родиолы розовой
3 ☑ Экстракт валерианы
4 ☑ Настойка пустырника
5 ☐ Кофеин

№350

Каковы свойства солей брома?

1 ☑ Усиливают процессы торможения в коре головного мозга
2 ☑ Обладают противоэпилептической активностью
3 ☑ Могут вызывать отравление - "бромизм"
4 ☐ Помогают при артериальной гипотензии

№351

Отметьте верные утверждения:

1 ☑ Бромиды хорошо всасываются в желудочно-кишечном тракте
2 ☐ При передозировке препаратов брома возможны судорожные припадки
3 ☑ Отравления солями брома - "бромизм" проявляется кожными высыпаниями, ринитом и конъюнктивитом

Задача 13

Сообщение

45-летний пациент был доставлен в отделение неотложной помощи с признаками поведенческих расстройств. Контакт затруднен. Пациент дезориентирован в пространстве и времени, сочувственно препирается с "голосами"; описывает, что в углу комнаты он "видит" каких-то мелких животных, ловит их и гладит. Со слов сопровождающих лиц известно, что он много лет злоупотребляет алкоголем.
Выберите один или несколько правильных ответов.

№352

Какую группу препаратов использовать в данном случае?

1 ◉ Нейролептики
2 ○ Средства для лечения мании (соли лития)
3 ○ Антидепрессанты
4 ○ Психостимуляторы
5 ○ Ноотропы и корректоры мозгового кровообращения

№353

Каковы показания к назначению нейролептиков?

1 ☑ Острый алкогольный психоз
2 ☑ Введение в наркоз в составе нейролептанальгезии
3 ☐ Аритмия сердца
4 ☑ Управляемая хирургическая гипотермия

№354

Каковы механизмы антипсихотического действия галоперидола?

1 ☑ Блокада дофаминергических рецепторов
2 ☑ Блокада серотониновых рецепторов
3 ☑ Блокада центральных и периферических адренорецепторов
4 ☑ Блокада центральных и периферических холинорецепторов
5 ☐ Стимуляция адренорецепторов коры головного мозга

Задача 14

Сообщение

Пациентка 54 лет стала замечать, что хуже выполняет свои профессиональные обязанности. Связывает это с рассеянностью, ухудшением памяти на текущие события. Ей был назначен препарат из группы ноотропов Пирацетам. Состояние больной улучшилось.
Выберите один или несколько правильных ответов.

№355

Укажите какие из перечисленных лекарственных средств относятся к ноотропным препаратам?

1 ☑ Гамма-аминомасляная кислота
2 ☐ Кофеин
3 ☑ Пирацетам
4 ☑ Церебролизин

№356

Каковы фармакологические эффекты Пирацетама?

1 ☐ Пробуждающее действие при коме или наркозе
2 ☑ Улучшает память и способность к обучению, когда они нарушены
3 ☑ Увеличивает приток крови в капилляры головного мозга

№357

Каковы побочные эффекты Пирацетама?

1 ☑ Повышенная возбудимость
2 ☐ Гепатотоксичность
3 ☐ Угнетение дыхания
4 ☑ Нарушение сна

Задача 15

Сообщение

Во время анестезии галотаном у пациента начало падать кровяное давление.
Выберите один или несколько правильных ответов.

№358

Какой препарат следует использовать для восстановления артериального давления?

1 ◉ Фенилэфрин (Мезатон)
2 ○ Норадреналина гидротартрат
3 ○ Эфедрина гидрохлорид
4 ○ Адреналина гидрохлорид

№359

Что характерно для наркоза галотаном?

1 ☑ Потеря сознания
2 ☑ Мышечное расслабление
3 ☐ Контролируемая гипотензия

№360

Какими побочными эффектами обладает галотан?

1 ☐ Вызывает тахикардию
2 ☑ Снижает сократительную способность миокарда
3 ☑ Повышает чувствительность миокарда к адреналину
4 ☑ Снижает АД

Задача 16

Сообщение

Перед вправлением вывиха пациенту внутривенно ввели анестетик из группы производных барбитуровой кислоты. Анестезия наступила через 30 секунд и продолжалась 7 минут. На момент введения препарата наблюдалось кратковременное апноэ.
Выберите один или несколько правильных ответов.

№361

Какой препарат был введен пациенту?

1 ○ Гидроксибутират натрия
2 ○ Галотан
3 ◉ Тиопентал натрия
4 ○ Энфлуран
5 ○ Пропанидид

№362

Каковы недостатки внутривенной анестезии?

1 ☐ Быстрое начало анестезии
2 ☑ Слабый контроль анестезии
3 ☐ Тяжелая II стадия анестезии (стадия возбуждения)
4 ☑ Недостаточное расслабление мышц

№363

Каковы основные побочные эффекты тиопентала?

1 ☐ Вызывает обезболивание
2 ☑ Снижает кровяное давление
3 ☑ Угнетает дыхание
4 ☑ Подавляет сократительную способность миокарда

Задача 17

Сообщение

7-летний ребенок был доставлен в больницу с признаками отравления: головная боль, головокружение, слюнотечение, тошнота, рвота, бледность кожных покровов, снижение АД и тахикардия. В последующем появились фибрилляция отдельных мышц и тонико-клонические судороги. Установлено, что ребенок выкурил несколько сигарет.
Выберите один или несколько правильных ответов.

№364

Какие фармакологические эффекты вызывают Н-холиномиметики

1 ☑ Рефлекторное возбуждение дыхания
2 ☐ Прямое возбуждение дыхательного центра
3 ☑ Повышенный выброс адреналина из надпочечников
4 ☐ Блокирование вегетативных ганглиев

№365

Где локализуются Н-холинорецепторы?

1 ☐ В стенке кровеносных сосудов
2 ☑ В чувствительных клубочках каратиноидных синусов
3 ☐ Сердечной мышце
4 ☑ В скелетных мышцах
5 ☑ В мозговом веществе надпочечников

№366

Каковы особенности действия никотина?

1 ☑ Оказывает двухфазное действие на Н-холинорецепторы - сначала стимуляция, а при увеличении дозы блокирование
2 ☑ Действует как на центральные, так и периферические Н-холинорецепторы
3 ☐ Действует только на центральные Н-холинорецепторы
4 ☐ Возбуждает М-холинорецепторы

Задача 18

Сообщение

Во время операции пациенту внутривенно вводили Дитилин (Суксаметония йодид). Вместо ожидаемого кратковременного (10 минут) расслабления скелетных мышц наблюдалась длительная остановка дыхания.
Выберите один или несколько правильных ответов.

№367

Выберите миорелаксанты деполяризующего типа?

1 ◉ Суксаметония йодид
2 ○ Тубокурарина хлорид
3 ○ Ардуан (Пипекурония бромид)
4 ○ Тракриум (Атракурия бесилат)

№368

Особенности действия?

1 ☑ Инактивируется за счёт гидролиза преимущественно псевдохолинэстеразой
2 ☑ Блокирует Н-холинорецепторы мышц, вызывая длительную деполяризацию
3 ☐ Относится к антидеполяризующим миорелаксантам
4 ☑ Действует кратковременно
5 ☐ Действует длительное время
6 ☐ Расслабляет гладкую мускулатуру

№369

Какие меры принимаются при передозировке Суксаметония йодида (Дитилина)?

1 ◉ Пациента следует провести на искусственное дыхание
2 ○ Необходимо ввести антихолинэстеразные препараты
3 ○ Необходим ввести М-холинолитики - Атропин

Задача 19

Сообщение

Пациент был госпитализирован через 3 часа после приёма большой дозы морфина. Без сознания, дыхание редкое, аритмичное, поверхностное.
Выберите один или несколько правильных ответов.

№370

Какие симптомы характерны для острого отравления морфином?

1 ☑ Снижение температуры тела
2 ☑ Сужение зрачков
3 ☑ Угнетение дыхания
4 ☑ Брадикардия
5 ☐ Расслабление сфинктеров гладкой мускулатуры

№371

Какие меры следует предпринять при остром отравлении морфином?

1 ☐ Введение антихолинэстеразных препаратов
2 ☑ Промывание желудка
3 ☑ Введение антагониста опиатных рецепторов - Налоксона
4 ☑ Перевести пациента на искусственное дыхание

№372

Укажите механизмы анальгетического действия Морфина:

1 ☑ Повышение порога болевой чувствительности
2 ☑ Торможение проведения болевых импульсов
3 ☑ Снижение эмоциональной реакции на боль
4 ☐ Блокада опиатных рецепторов
5 ☐ Ингибирование циклоокисгеназы (ЦОГ) и образование простагландинов

Задача 20

Сообщение

40-летний пациент был доставлен в отделение неотложной помощи с жалобами на боль в эпигастрии в течение последних 24 часов, слабость и головокружение. Из анамнеза известно, что в течение длительного времени он принимал Аспирин (Ацетилсалициловую кислоту) от боли и припухлости суставов.
Выберите один или несколько правильных ответов.

№373

Каковы основные фармакологические эффекты ацетилсалициловой кислоты?

1 ☐ Антигистаминное действие
2 ☑ Противовоспалительное действие
3 ☑ Антиагрегационное действие
4 ☑ Обезболивающее действие
5 ☑ Жаропонижающее действие

№374

Укажите механизмы действия ацетилсалициловой кислоты?

1 ☑ Ингибирование циклооксигеназы
2 ☑ Снижение синтеза простагландинов
3 ☐ Стимуляция фосфолипазы
4 ☐ Стимуляция опиатных рецепторов

№375

Укажите возможные побочные и нежелательные эффекты ацетилсалициловой кислоты?

1 ☐ Психическая зависимость
2 ☑ Кровотечения
3 ☑ Ульцерогенный эффект
4 ☑ Синдром Рейе

Задача 21

Сообщение

После групповой прогулки в лесу у некоторых детей развилось тяжелое состояние, сопровождающееся обильном слюноотделение, обильный пот, слезотечение, сужение зрачков, тошнота, рвота и обильный водянистый понос. Пульс 60 ударов в минуту, нерегулярный. Затрудненное дыхание, хрипы. Головокружение, галлюцинации. Сознание спутано. Периодически возникает мышечная дрожь, слабые судороги.
Выберите один или несколько правильных ответов.

№376

Что могло вызвать описанную клинику?

1 ◉ Стимуляция М-холинорецепторов
2 ○ Стимуляция n-холинорецепторов
3 ○ Блокада М-холинорецепторов
4 ○ Блокада n-холинорецепторов

№377

Какую первую помощь следует оказать?

1 ☑ Промывание желудка
2 ☑ Таблетки активированного угля
3 ☑ Согревание
4 ☐ Охлаждение

№378

Какой антидот можно применить?

1 ◉ Атропин подкожно
2 ○ Новокаин
3 ○ Лобелин
4 ○ Цитизин
5 ○ Ипратропия бромид

Задача 22

Сообщение

Врач скорой помощи диагностировал у 5-летнего ребенка отравление с клиникой острого психоза, с двигательном и речевым возбуждением, галлюцинациями. Объективно: зрачки резко расширены, ребёнок натыкается на предметы, кожа красная, сухая, пульс 106, дыхание 24 в минуту.
Выберите один или несколько правильных ответов.

№379

Предположите каким веществом было отравлено?

1 ○ Физиостигмин
2 ○ Прозерин
3 ◉ Атропин
4 ○ Новокаин

№380

Показания для применения Атропина?

1 ☐ Атония кишечника
2 ☑ Как часть премедикации перед общим наркозом
3 ☐ Лечение и профилактика глаукомы
4 ☑ Как часть декураризации

№381

Какие антидотные препараты используются для лечения отравления атропином?

1 ☑ Физиостигмин
2 ☐ Новокаин
3 ☐ Лобелин
4 ☐ Цитизин
5 ☑ Прозерин

Задача 23

Сообщение

Перед дуоденальным зондированием горло пациента было смазано раствором местного анестетика. Через несколько минут начались подергивания мышц шеи и плеч, затем общие судороги. Кожа лица побледнела. Еще через 10 минут пациент был переведен в отделение интенсивной терапии.
Выберите один или несколько правильных ответов.

№382

Каков механизм действия местных анестетиков?

1 ○ Блокада калиевых каналов
2 ○ Блокада кальциевых каналов
3 ◉ Блокада натриевых каналов
4 ○ Активация бета-адренорецепторов

№383

Предположите причину возникшего осложнения?

1 ○ Аллергическая реакция
2 ◉ Токсическое действие вследствие резорбции местного анестетика
3 ○ Это обычная реакция на местные анестетики

№384

Какой местный анестетик мог вызвать это осложнение?

1 ◉ Дикаин (тетракаин)
2 ○ Кокаин
3 ○ Новокаин (прокаин)
4 ○ Лидокаин

Задача 24

Сообщение

Через несколько минут после введения Новокаина (Прокаина), во время проведения инфильтрационной анестезии, на коже появились крапивница, зуд, затем отёк слизистых оболочек, суставов и повышение температуры.
Выберите один или несколько правильных ответов.

№385

Укажите фармакологические свойства прокаина?

1 ☑ Местный анестетик
2 ☑ При системном введение угнетает центральную нервную систему
3 ☑ Подавляет вегетативные ганглии
4 ☐ Возбуждает центральную нервную систему
5 ☐ Используется для всех видов анестезии

№386

Какова природа возникшего осложнения?

1 ◉ Аллергическая реакция
2 ○ Токсический эффект в результате резорбтивного действия
3 ○ Это обычная реакция на местные анестетики

№387

Выберите неотложные меры для лечения возникшего осложнения?

1 ☑ Прекратить введение прокаина
2 ☐ Продолжить введение прокаина
3 ☑ Ввести адреналин внутривенно
4 ☑ Ввести преднизолон внутривенно

Задача 25

Сообщение

Пациенту М., после интенсивной мышечной нагрузки натощак, ввели инсулин под кожу в обычной дозе. Через некоторое время он почувствовал острое чувство голода, возбуждение, напоминающее алкогольное опьянение. Затем возбуждение сменилось сильной слабостью, обильным потоотделением, головокружением, сонливостью. Артериальное давление понизилось, пульс участился, 110 ударов в 1 минуту.
Выберите один или несколько правильных ответов.

№388

Показания к назначению инсулина?

1 ☑ Сахарный диабет 1 типа
2 ☑ Диабетическая кома
3 ☐ Гипогликемическая кома

4 ☑ В составе поляризующей смеси при инфаркте миокарда

№389

Возможные осложнения инсулинотерапии?

1 ☑ Липодистрофия в месте инъекции
2 ☑ Гипогликемическая кома
3 ☐ Гипергликемия
4 ☑ Анафилактический шок

№390

Что можно применить для терапии гипогликемической комы?

1 ○ Глюкагон и тироксин
2 ○ Инсулин для инъекций
3 ◉ Адреналин и преднизолон

Задача 26

Сообщение

Больной сахарным диабетом, 45 лет, с сопутствующим ожирением, принимал внутрь утром и вечером во время еды прописанные врачом таблетки. Содержание сахара в крови и моче снизилось. Однако появился металлический вкус во рту, слабость, потеря аппетита, снижение массы тела.

№391

Гипогликемические препараты для приема внутрь используют при:

1 ☑ Сахарном диабете I типа, в качестве дополнительной терапии
2 ☐ Диабетической коме
3 ☐ Гипогликемической коме
4 ☑ Сахарном диабете II типа, в качестве основной терапии

№392

Отметьте эффекты Глибенкламида

1 ☐ Угнетает гликонеогенез в печени
2 ☑ Стимулирует бета-клетки поджелудочной железы
3 ☐ Стимулирует анаэробный гликолиз
4 ☑ Тормозит активность инсулиназы

№393

Отметьте эффекты Метформинf

1 ☐ Угнетает инсулиназу
2 ☑ Повышает утилизацию глюкозы мышцами
3 ☑ Стимулирует анаэробный гликолиз
4 ☐ Активирует гексокиназу

Задача 27

Сообщение

Больной предъявляет жалобы на понос, воспаление кожи, боли в желудке, воспаление языка. При осмотре выявлена деменция, диарея, дерматит, гастрит. Врач поставил диагноз гиповитаминоз витамина РР. Выберите один или несколько правильных ответов.

№394

Выберите синоним витамина РР

1 ○ Цианокобаламин
2 ○ Пиридоксин
3 ○ Тиамин
4 ◉ Никотиновая кислота

№395

Укажите свойства витамина РР

1 ☑ Противопеллагрическое средство

2 ☑ Участвует в энергетическом метаболизме
3 ☑ Нормализует концентрацию липопротеинов крови
4 ☐ Стимулирует Н-холинорецепторы

№396

Отметьте водорастворимые витамины:

1 ☑ Тиамин
2 ☑ Пиридоксин
3 ☑ Аскорбиновая кислота
4 ☐ Эргокальциферол
5 ☐ Ретинол

Задача 28

Сообщение

К врачу обратился больной, 35 лет. Предъявляет жалобы на частые инфекционные заболевания (ОРВИ, грипп), быструю утомляемость, боли в сердце, в конечностях. При осмотре: на коже геморрагические высыпания, гингивит с кровотечением из десен, расшатывание и выпадение зубов. Врач назначил больному витамин С. Выберите один или несколько правильных ответов

№397

Выберите синоним витамина С

1 ○ Пиридоксин
2 ○ Тиамин
3 ○ Никотиновая кислота
4 ○ Цианокобаламин
5 ◉ Аскорбиновая кислота

№398

Отметьте свойства витамина С:

1 ☑ Активирует синтез глюкокортикоидов
2 ☐ Способствует повышению проницаемости капилляров
3 ☑ Стимулирует обмен углеводов, усиливая окисление глюкозы
4 ☑ Увеличивает адаптационные способности организма
5 ☐ Ингибирует активность окислительно-восстановительных процессов

№399

Отметьте клинические проявления недостаточности витамина С:

1 ☑ Гипертермия
2 ☐ Дерматит
3 ☑ Гингивит
4 ☐ Рахит
5 ☑ Стоматит

Задача 29

Сообщение

Больному с кавернозной формой туберкулеза легких была назначена комбинированная терапия стрептомицином, ПАСК и изониазидом. Через 3 недели от начала лечения больной почувствовал шум в ушах, нарушение походки, снижение слуха. Каков характер возникшего осложнения? Тактика врача при выявлении указанного осложнения? Выберите один или несколько правильных ответов

№400

Какой из трех препаратов мог вызвать указанное осложнение?

1 ◉ Стрептомицин
2 ○ ПАСК
3 ○ Изониазид

№401

Назовите токсические эффекты аминогликозидов:

1 ☑ Вестибулярные расстройства

2 ☑ Снижение слуха
3 ☑ Повреждение почек
4 ☐ Полиневриты

№402

Укажите механизм действия и особенности аминогликозидов:

1 ☑ Действуют на малую субъединицу рибосом
2 ☐ Действуют на большую субъединицу рибосом
3 ☐ Обладают низкой токсичностью
4 ☑ Оказывают ототоксический и нефротоксический эффекты

Задача 30

Сообщение

Больной получал противосифилитическое лечение. Через некоторое время он почувствовал боли и неприятные ощущения во рту при приеме пищи. Консультация стоматолога выявила воспаление слизистой оболочки ротовой полости и десен. Был поставлен диагноз: кандидоз ротовой полости. Выберите один или несколько правильных ответов

№403

Назовите причины грибковых поражений:

1 ☑ Применение сульфаниламидов, комбинированных с триметопримом
2 ☐ Использование антибиотиков группы амфотерицина
3 ☑ Использование антибиотиков группы пенициллинов
4 ☑ Кортикостероидная терапия

№404

Укажите полиеновые антимикотики, которые используют при лечении кандидомикозов

1 ☐ Гризеофульвин
2 ☑ Нистатин
3 ☑ Леворин
4 ☐ Карбенициллин

№405

Укажите механизм действия нистатина:

1 ☑ Связывание эргостеролов
2 ☐ Нарушение синтеза белка
3 ☑ Нарушение структуры цитоплазматических мембран
4 ☐ Блокада синтеза ДНК

Задача 31

Сообщение

Больному сифилисом было назначено стандартное лечение бензилпенициллином. После первого введения препарата через несколько минут развилась резкая слабость, затруднение дыхания, удушье, кашель, страх смерти, выраженная бледность кожных покровов, холодный пот, нарастающий отек тканей. Выберите один или несколько правильных ответов

№406

Отметьте свойства бензилпенициллина

1 ☑ Активно выводится из организма путем секреции в почках
2 ☐ Нарушает проницаемость цитоплазматических мембран
3 ☑ Обладает противоспирохетозным действием
4 ☑ Обладает значительной широтой терапевтического действия

№407

Механизм действия пенициллинов

1 ☑ связан с нарушением строения и функции клеточной стенки микроорганизмов
2 ☐ связан с дезинтеграцией цитоплазматических мембран микроорганизмов
3 ☐ определяется подавлением рибосомального биосинтеза белка
4 ☑ определяется конкуренцией с D-аланином

№408

Укажите типичное осложнение при лечении бензилпенициллином:

1 ○ Гепатотоксичность
2 ○ Снижение слуха и вестибулярные расстройства
3 ◉ Аллергические реакции
4 ○ Нефротоксичность

Задача 32

Сообщение

Беременная женщина без назначения врача принимала тетрациклин для лечения бронхита. Ребенок родился здоровым. Однако только в 3 года у него прорезались зубы. Зубы были желтого цвета, деформированы, подвержены кариесу. Выберите один или несколько правильных ответов

№409

Применение каких антибиотиков наиболее опасно при беременности:

1 ☑ Аминогликозидов
2 ☑ Тетрациклинов
3 ☑ Левомицетина
4 ☐ Пенициллинов
5 ☐ Макролидов

№410

Укажите механизм антимикробного действия тетрациклинов:

1 ☑ Воздействие на малую субъединицу рибосом микробов
2 ☐ Воздействие на большую субъединицу рибосом микробов
3 ☐ Конкуренция с d-аланином
4 ☐ Нарушение транспорта веществ через цитоплазматическую мембрану
5 ☑ Нарушение синтеза белка

№411

Назовите антибиотики группы тетрациклинов

1 ☑ Доксициклин
2 ☑ Метациклин
3 ☐ Гентамицин
4 ☐ Олеандомицин

Задача 33

Сообщение

Больной с целью самолечения принял после еды 20 капсул противоглистного средства экстракт папоротника мужского. Через 1 час у больного появилась тошнота, рвота, понос. Больной потерял сознание, появились судороги. При осмотре врачом скорой помощи обнаружена резкая бледность покровов. Пульс 50 ударов в минуту, артериальное давление 70 и 30 мм рт. ст. Выберите один или несколько правильных ответов

№412

Выберите препараты, относящиеся противоглистным средствам:

1 ☑ Левамизол
2 ☑ Экстракт папоротника мужского
3 ☐ Метронидазол
4 ☐ Котримаксозол
5 ☑ Пирантел

№413

Назовите механизм действия экстракта папоротника мужского:

1 ☑ Угнетает окислительное фосфолирование в митохондриях цестод
2 ☑ Вызывает паралич мускулатуры цестод
3 ☐ Поражает нервную систему гельминтов
4 ☐ Вызывает нейро-мышечную блокаду

№414

Выберите виды гельминтов, в отношении которых активен данный препарат:

1 ☑ Свиной цепень
2 ☑ Бычий цепень
3 ☐ Аскариды
4 ☐ Нематоды

Задача 34

Сообщение

Больному острым бронхитом было назначен норсульфазол. После лечения в течении 7-и дней состояние больного стало улучшаться, но вскоре он стал жаловаться на боль в области поясницы и затруднение мочеиспускания. При анализе мочи обнаружены кристаллурия, цилиндрурия, альбиминурия и макроскопическая гематурия Выберите один или несколько правильных ответов

№415

Укажите механизм действия противомикробных сульфаниламидов:

1 ☑ Нарушение синтеза дигидрофолиевой кислоты
2 ☑ Конкуренция с парааминобензойной кислотой
3 ☐ Конкуренция с d-аланином
4 ☐ Угнетение ДНК-гиразы

№416

Выберите механизм трансформации сульфаниламидов в печени:

1 ☐ Окисление
2 ☐ Дезаминирование
3 ☑ Ацетилирование
4 ☑ Конъюгация

№417

Назовите побочные эффекты сульфаниламидов:

1 ☑ Гематотоксичность
2 ☑ Кристаллурия
3 ☐ Поражение костной ткани

Задача 35

Сообщение

Студент в результате серии беспорядочных половых связей заболел гонореей. Врач-дерматовенеролог назначил ему пефлоксацин в дозе 0,8 г однократно. Выберите один или несколько правильных ответов

№418

Назовите фармакологическую группу, к которой относится пефлоксацин

1 ○ Цефалоспорины
2 ◉ Фторхинолоны
3 ○ Аминогликозиды
4 ○ Производное нитрооксолиновой кислоты

№419

Укажите механизм антимикробного действия пефлоксацина:

1 ○ Блок ДНК-полимеразы и нарушение синтеза ДНК
2 ◉ Блок ДНК-гиразы и нарушение сверхспирализации ДНК
3 ○ Блок транспептидазы и нарушение синтеза клеточной стенки
4 ○ Нарушение целостности ЦПМ

№420

Какие побочные явления может вызывать пефлоксацин:

1 ☑ Аллергические реакции
2 ☐ Лейкопению, анемию
3 ☑ Фотосенсибилизацию

4 ☑ Торможение развития хрящевой ткани