Тема 4. ТВЁРДЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ

Вопросы для самостоятельной подготовки

1. Характеристика и классификация твердых лекарственных форм.
2. Таблетки: получение, применение, варианты прописи, достоинства и недостатки.
3. Характеристика драже как лекарственной формы.
4. Гранулы: определение, пропись, применение, дозирование.
5. Порошки: определение, классификация, характеристика, особенности применения, виды прописей. Достоинства и недостатки порошков.
6. Капсулы: назначение, разновидности, применение, пропись.
7. Карамели и пастилки: определение, характеристика, пропись и применение.
8. Характеристика и правила выписывания сборов.

Рекомендуемы темы презентаций

(необязательное задание)

- Гранулы: определение, пропись, применение, дозирование.
- Порошки: определение, классификация, характеристика, особенности применения, виды прописей. Достоинства и недостатки порошков.
- Капсулы: назначение, разновидности, применение, пропись.
- Карамели и пастилки: определение, характеристика, пропись и применение.
- Инновационные лекарственные формы: таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, таблетки с модифицированным высвобождением, осмотические системы, системы с регуляцией высвобождения, пиллеты и др.

Ситуационные задачи

Решите ситуационные задачи, кратко ответьте на вопросы.

I. Какая из прописей таблеток ибупрофена неверна и почему?

Rp.: Ibuprofeni 0,2 *D.t.d. N. 10 in tabulettis* *S. По 1 таблетке внутрь при боли.*	*Rp.: Tabulettam Ibuprofeni 0,2* *D.t.d. N. 10* *S. По 1 таблетке внутрь при боли.*	*Rp.: Tabulettam Ibuprofeni 0,2* *D.t.d. N. 10 in tabulettis* *S. По 1 таблетке внутрь при боли.*

II. Какая из прописей таблеток «Ко-тримоксазол» верна и почему неверны две другие?

Rp.: Tabulettae «Cotrimoxazolum» *S. По 1 таблетке внутрь 2 раза в сутки.*	*Rp.: Tabulettas «Cotrimoxazolum» N. 6* *S. По 1 таблетке внутрь 2 раза в сутки.*	*Rp.: Tabulettam Cotrimoxazoli* *D.t.d. N. 6* *S. По 1 таблетке внутрь 2 раза в сутки.*

III. Укажите размеры и объёмы:

a) среднюю массу разделенного порошка _____
b) объём столовой ложки _____
c) объём чайной ложки _____
d) количество капель в 1 мл водного раствора _____
e) среднюю массу ректального суппозитория _____

Тестовые задания

1. К твёрдым лекарственным формам относятся:
    1) мази, кремы, гели, линименты, пасты, пластыри, суппозитории
    2) таблетки, драже, гранулы, порошки, капсулы, пастилки, карамели, пилюли
    3) растворы, настои и отвары, настойки, экстракты, эликсиры, микстуры, эмульсии, суспензии, слизи
2. Твёрдая лекарственная форма, получаемая прессованием порошков это:
    1) Драже
    2) Таблетка
    3) Порошок
    4) Гранула
3. Твёрдая лекарственная форма, получаемая наслаиванием на сахарные гранулы это:
    1) Драже
    2) Таблетки
    3) Порошки
    4) Гранул
4. В виде присыпки могут применяться…?
    1) Драже
    2) Таблетки
    3) Порошки
    4) Гранулы
5. Специальные твердые или эластичные оболочки для наполнения лекарственных веществ это:
    1) Драже
    2) Таблетки
    3) Капсулы
    4) Гранулы
6. Твердая лекарственная форма в виде однородных частиц округлой, цилиндрической или неправильной формы это:
    1) Драже
    2) Таблетки
    3) Капсулы
    4) Гранулы
7. Твердые лекарственные формы, используемые для лечения заболеваний слизистой рта и глотки это:
    1) Драже и таблетки
    2) Капсулы и гранулы

3) Облатки и плёнки
4) Карамели и пастилки

8. Отметить твердую лекарственную форму, которая может выписываться в недозированной форме
    1) порошок для приема внутрь
    2) таблетки
    3) гранулы
    4) драже
    5) капсулы
9. Порошок для приема внутрь выписывается в неразделенной форме, если назначаемая разовая доза лекарственного средства…?
    1) не превышает 1,0
    2) не превышает 0,1
    3) превышает 1,0
    4) превышает 0,1
    5) всегда выписывается в неразделенной форме
10. Среди перечисленных лекарственных форм указать недозированную форму
    1) таблетки
    2) карамели
    3) драже
    4) присыпка
    5) капсулы

Выпишите рецепты

1. 20 порошков тиамина хлорида (Thiamini chloridum) по 0,01. Назначить по 1 порошку 1 раз в день.
2. 6 порошков, содержащих кислоты ацетилсалициловой (Acidum acetylsalicylicum) и парацетамол Paracetamolum) по 0,25.
3. Гранулы уродана (Urodanum) в упаковке по 100,0 и назначить по 1 чайной ложке на половину стакана воды 3 раза в день перед едой.
4. Драже аминазина (Aminazinum) из разовой дозы 0,25 и назначить по 1 драже 2 раза в день в течение 20 дней.
5. Димедрол (Dimedrolum) в таблетках по 0,05.
6. Таблетки сложного состава «Теофедрин» (Theophedrinum) и назначить 1 таблетку 2 раза в день.
7. 60.0 присыпки, содержащей 5% дерматола (Dermatolum).
8. Присыпку для кожи на крахмале, содержащую 10% окиси цинка (Zinci oxydi) и 5% талька (Talcum).
9. Фурацилин (Furacillinum) в таблетках по 0,02 и назначить для полоскания горла после растворения 1 таблетки в половине стакана теплой воды.
10. Ноотропил (Nootropilum) по 0, 4 в капсулах и назначить по 1 капсуле 3 раза в день в течение месяца.
11. 40 таблеток нитроглицерина (Nitroglycerinum) по 0,0005 и назначить по 1 таблетке под язык при приступах стенокардии.

12. 15 капсул, содержащих по 0,2 мл 50% масляного раствора токоферола ацетата (Tocoferoli acetas) и назначить внутрь по 1 капсуле через день.
13. Порошок для ингаляций вентодиск (Ventodisk) в капсулах в разовой дозе 0,0002 и ингалировать с помощью дискового ингалятора 2 раза в сутки в течение 2 месяцев.
14. 20 таблеток нистатина (Nystatinum) по 250 000 ЕД, покрытых оболочкой. По 1 таблетке 3 раза в день.