

2023线性代数1讲义

目录

1 第一章：线性方程组与矩阵	1
1.1. 线性方程组入门, Introduction to systems of linear equations	1
1.2. 高斯消元法, Gaussian Elimination	8

1 第一章：线性方程组与矩阵

1.1. 线性方程组入门, Introduction to systems of linear equations

Definition 1.1. 令 n 为任意自然数, a_1, \dots, a_n , b 为常数。我们称 n 元一次方程

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b$$

为一个(含有 n 个未知数的)线性方程。

也就是说, 在本课程中, 线性与一次是同一个意思。比如方程 $2x_1^2 + \sin x_2 - 5x_3 = 0$ 不是一个线性方程, 因为 x_1 的次数为2, 并且 $\sin x_2$ 也不能写成 x_2 的一次形式。

Definition 1.2. 令 m 与 n 为任意自然数, $a_{11}, \dots, a_{1n}, a_{21}, \dots, a_{2n}, \dots, a_{m1}, \dots, a_{mn}, b_1, \dots, b_m$ 为常数, 我们称以下 m 个 n 元一次方程组成的方程组

$$\begin{aligned}a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1 \\a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &= b_2 \\&\vdots \\a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n &= b_m\end{aligned}$$

为一个线性方程组。特别地, 若 $b_1 = \dots = b_m = 0$, 则称该线性方程组为齐次线性方程组。显然, a_{ij} 指代第 i 个方程里第 j 个未知数 x_j 的系数。这里 i 的取值范围为 $1, 2, \dots, m$, j 的取值范围为 $1, 2, \dots, n$ 。

给定任何一个(由 m 个 n 元一次方程组成的)线性方程组

$$\begin{aligned}a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1 \\a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &= b_2 \\&\vdots \\a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n &= b_m\end{aligned}$$

我们将由未知数系数 a_{ij} , $i = 1, \dots, m$, $j = 1, \dots, n$ 组成的矩形点阵

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

为该线性方程组的**系数矩阵**(coefficient matrix)。显然 a_{ij} 位于该矩阵第 i 行与第 j 列相交的位置上。如果我们把方程组最右侧的常数 b_1, \dots, b_m 作为**列**添加到系数矩阵的最右边, 那么所得到的矩阵

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{bmatrix}$$

被称为该线性方程组的**增广矩阵**(augmented matrix)。

反之, 若给定一个由 m 行和 n 列组成的矩阵 A

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

(这里 a_{ij} 指代该矩阵第 i 行与第 j 列相交的位置上出现的常数)以及一个由 m 个坐标组成的向量 $\mathbf{b} = (b_1, \dots, b_m)$, 那么 A 与 \mathbf{b} 可以确定一个(由 m 个 n 元一次方程组成的)线性方程组

$$\begin{aligned}a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1 \\a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &= b_2 \\&\vdots \\a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n &= b_m\end{aligned}$$

显然，该线性方程组对应的系数矩阵为 A ，对应的增广矩阵为 (A, \mathbf{b}) 。注意我们经常用记号 (A, \mathbf{b}) 指代以下矩阵

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{bmatrix}$$

Remark 1.3. 1. 若一个矩阵由 m 行和 n 列所构成，我们称其为一个 $m \times n$ -矩阵。

因此一个(由 m 个 n 元一次方程组成的)线性方程组的系数矩阵为一个 $m \times n$ -矩阵，它的增广矩阵则为一个 $m \times (n+1)$ -矩阵。

2. 一个由 m 个坐标组成的向量(简称为 m -向量) $\mathbf{b} = (b_1, \dots, b_m)$ 可以被视为一个行向量，即一个 $1 \times m$ -矩阵；也可以被视为一个列向量，即一个 $m \times 1$ -矩阵，且在此时记为

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

比如在记号 (A, \mathbf{b}) 里我们就把 \mathbf{b} 看作一个列向量。究竟是把一个向量视为行向量还是列向量取决于具体的应用环境，我们在后面的课程学习中会逐渐了解。

3. 诚然每一个(由 m 个 n 元一次方程组成的)线性方程组都可以被它的增广矩阵唯一表示，但是矩阵作为线性代数里的一个独立概念并不是必须要与线性方程组联系起来(尽管目前我们使用矩阵的目的是为了求解线性方程组)。更多关于矩阵本身的知识与应用将在后续课程中逐渐展示。

例子：

1. 线性方程组

$$x - y = 1$$

$$2x + y = 6$$

的系数矩阵为

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix},$$

增广矩阵则为

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 6 \end{bmatrix}.$$

2. 线性方程组

$$x + y = 4$$

$$3x + 3y = 6$$

的系数矩阵为

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 3 \end{bmatrix},$$

增广矩阵则为

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 3 & 3 & 6 \end{bmatrix}.$$

3. 矩阵 $A =$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & -2 & 4 \\ 3 & -3 & 6 \end{bmatrix}$$

与向量 $\mathbf{b} = (5, 10, 15)$ 所对应的线性方程组为

$$x - y + 2z = 5$$

$$2x - 2y + 4z = 10$$

$$3x - 3y + 6z = 15.$$

即，该方程组的系数矩阵为 A , 增广矩阵为 (A, \mathbf{b}) 。

现在我们来解上面的第一个方程组

$$x - y = 1$$

$$2x + y = 6.$$

注意它的增广矩阵为 $B_1 =$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 6 \end{bmatrix}.$$

求解的思路当然是**消元**。具体步骤如下：

1. 首先我们将**第一个方程乘以 -2** , 然后**加到第二个方程上去**来消掉第二个方程里的未知数 x 。我们所得到的新方程组为

$$x - y = 1$$

$$3y = 4.$$

注意这个方程组的增广矩阵变成了 $B_2 =$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & 4 \end{bmatrix}.$$

显然， B_2 是通过将矩阵 B_1 的第一行乘以 -2 后加到第二行，同时保留第一行不变所得到的。

2. 对于方程组

$$x - y = 1$$

$$3y = 4$$

我们将第二个方程等号两边都乘以 $1/3$, 得到另一个方程组

$$x - y = 1$$

$$y = \frac{4}{3}$$

对应的增广矩阵为 $B_3 =$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{4}{3} \end{bmatrix}.$$

显然， B_3 是通过将矩阵 B_2 的第二行乘以 $1/3$ ，同时保留第一行不变所得到的。

3. 现在我们把方程组

$$x - y = 1$$

$$y = \frac{4}{3}$$

的第二个方程加到第一个方程上面，得到新方程组

$$x = \frac{7}{3}$$

$$y = \frac{4}{3}$$

显然这个最终得到的方程组给出了原方程组的解，其对应的增广矩阵为 $B_4 =$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{7}{3} \\ 0 & 1 & \frac{4}{3} \end{bmatrix}$$

并且系数矩阵为

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

注意 B_4 是通过将矩阵 B_3 的第二行加到第一行，同时保留第二行不变所得到的。

由以上观察我们可以得到以下结论：

- 对以上(由2个二元一次方程组成的)线性方程组进行**消元求解**的过程实际上是对该方程组所对应的**增广矩阵**的**行**进行一系列操作使其最终变为

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & s_1 \\ 0 & 1 & s_2 \end{bmatrix}$$

这种形式的过程，且此时 $x = s_1, y = s_2$ 即为该方程组**唯一的一组解**。

- 在此过程中矩阵**列与列之间**不发生任何关系。
- 在此过程中矩阵的行与行之间所进行的操作包括：
 1. 将某一行乘以某个**非零**的常数，其他行保持不变；
 2. 将某一行乘以某个常数后加到另外一行上去，且除了被加的行之外其他的行保持不变。

基于此，我们引入一下重要概念：

Definition 1.4 (初等行变换, elementary row operations). 假设 C 为任意 $m \times p$ -矩阵。以下三种操作被称为(对矩阵 C 的)初等行变换：

1. 将 C 的第 i 行 ($i = 1, \dots, m$) 乘以某个**非零**的常数 c ，其他行保持不变 (可记为： i -th row $\times c$);
2. 将 C 的第 i 行 ($i = 1, \dots, m$) 乘以某个常数 c 后加到第 k 行上去 ($k = 1, \dots, m$ 且 $k \neq i$)，且除了第 k 行之外其他的行保持不变 (可记为： i -th row $\times c + k$ -th row);
3. 将 C 的第 i 行 ($i = 1, \dots, m$) 与第 k 行 ($k = 1, \dots, m$ 且 $k \neq i$) 互换 (可记为： i -th row $\leftrightarrow k$ -th row)，其他行保持不变。

考虑线性方程组

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n &= b_m \end{aligned}$$

及其对应的增广矩阵为 $B = (A, \mathbf{b})$ (A 为其系数矩阵)

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{bmatrix}.$$

那么由之前的讨论我们知道

1. “将第 i 个方程的等号两边乘以 $c \neq 0$ ”对应“将 B 的第 i 行乘以某个非零的常数 c ，其他行保持不变”，即第一类初等行变换；
2. “将第 i 个方程乘以 c 再添加到第 k 个方程上去”对应“将 B 的第 i 行乘以某个常数 c 后加到第 k 行上去 ($k \neq i$)，且除了第 k 行之外其他的行保持不变”，即第二类初等行变换；
3. “将第 i 个方程与第 k 个方程互换”对应“将 A 的第 i 行与第 k 行 ($k \neq i$) 互换，其他行保持不变”，即第三类初等行变换。
4. 若 $m = n$ ，即方程个数与未知数个数相等，且通过对增广矩阵 $B = (A, \mathbf{b})$ 进行一系列初等行变换操作后得到以下形状的(增广)矩阵 $\tilde{B} =$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & s_1 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & s_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & s_n \end{bmatrix},$$

那么该方程组具有**唯一的一组解** $x_1 = s_1, x_2 = s_2, \dots, x_n = s_n$ 。这里我们把 \tilde{B} 记为 $\tilde{B} = (I_n, \mathbf{s})$, I_n 被称为 $n \times n$ -单位矩阵，它的对角线上所有元素均为1，其他不在对角线上的元素均为0；列向量 $\mathbf{s} = (s_1, \dots, s_n)$ 是方程的解。

因此，从现在开始，我们可以把对线性方程组 ($m = n$) 的消元求解过程转化为**如何通过一系列初等行变换将其对应的增广矩阵 $B = (A, \mathbf{b})$ 转化为 $\tilde{B} = (I_n, \mathbf{s})$ 的过程**，此时 \mathbf{s} 即为方程组的唯一解。特别地，我们现在操作的对象由方程组变为矩阵。

在结束本节之前，我们需要注意到另一个非常重要的问题：**并非所有线性方程组对应的增广矩阵都可以通过初等行变换转为 $\tilde{B} = (I_n, \mathbf{s})$ 的形式！** 比如当方程个数 m 与未知数个数 n 不相等时，原增广矩阵 B 无法变成 $\tilde{B} = (I_n, \mathbf{s})$ 的形式(为什么？)；同时，即使 $m = n$ ，一些线性方程组的增广矩阵依然不能通过初等行变换转为 $\tilde{B} = (I_n, \mathbf{s})$ 的形式，比如方程组

$$\begin{aligned} x - y + 2z &= 5 \\ 2x - 2y + 4z &= 10 \\ 3x - 3y + 6z &= 15 \end{aligned}$$

对应的增广矩阵 $B =$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 5 \\ 2 & -2 & 4 & 10 \\ 3 & -3 & 6 & 15 \end{bmatrix}$$

通过消元求解所对应的初等行变换后最终所得到的形式是

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

并不满足 (I_3, \mathbf{s}) 这样的形式。注意此时可以看出该方程组具有无穷多个解 $x = 5 + r - 2s, y = r, z = s$ ，这里 r 和 s 可以为任何数。

作为总结，我们在这一节中的收获为：

- 我们可以把对线性方程组 ($m = n$) 的消元求解过程转化为如何通过一系列初等行变换将其对应的增广矩阵 $B = (A, \mathbf{b})$ 转化为 $\tilde{B} = (I_n, \mathbf{s})$ 的过程。此时向量 \mathbf{s} 给出方程的唯一解。
- 并非所有方程组的增广矩阵 B 都可以通过一系列初等行变换转化为 $\tilde{B} = (I_n, \mathbf{s})$ 的形式。
- 一个线性方程组的增广矩阵 B 通过一系列初等行变换所转化成的某种“最终形态”决定了该方程组是否有解，以及解是否唯一。

在1.2节我们将学习如何将一个线性方程组的增广矩阵 B 通过一系列初等行变换转化成的一种特殊的“最终形态”，以及如何通过这个“最终形态”确定该方程组是否有解，解是否唯一，以及求出具体解 (在有解的情况下)。

1.2. 高斯消元法, Gaussian Elimination

在上一节我们提到，可以通过一系列初等行变换，将一个线性方程组的增广矩阵转化为一种特殊的“最终形态”，这种“最终形态”能够帮助我们确定该方程组是否有解，解是否唯一，以及求出具体解 (在有解的情况下)。在本节我们将会学习到这种“最终形态”就是所谓的阶梯型 (row echelon form) 或者简化阶梯型 (reduced row echelon form)。首先我们给出定义：

Definition 1.5 (阶梯型与简化阶梯型). 若一个矩阵满足以下三个条件：

1. 该矩阵中任何不为0的行里所包含的第一个非零的项都是1。我们称这样的项为主1 (leading 1);
2. 该矩阵中任何为0的行一定在不为0的行的下方;
3. 对于该矩阵中任意两个相邻且不为0的行，上面的行里所包含的主1一定位于下面的行里所包含的主1的左侧;

那么该矩阵被称为**阶梯型**。若一个**阶梯型**额外满足以下条件

- 该矩阵中任何不为0的行里所包含的主1是其所在的列里唯一一个不为0的项，

那么该矩阵被称为**简化阶梯型**。

例子：

1. 矩阵

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

不是阶梯型，因为第二行中第一个非零的项是2，不等于1。

2. 矩阵

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

不是阶梯型，因为不为0的第三行在为0的第二行下面。

3. 矩阵

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

不是阶梯型，因为第二行的主1在第三行主1的右边。

4. 矩阵

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & -3 & 7 \\ 0 & 0 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

是阶梯型，但不是简化阶梯型，因为第二行的主1不是它所在列中唯一的非零项，同样，第三行的主1不是它所在列中唯一的非零项。

5. 矩阵

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

是简化阶梯型。

下面我们介绍如果将任意给定的一个矩阵通过一系列初等行变化将其转化为一个阶梯型或者简化阶梯型。大家可以参照教材第14页到17页的两个例子的具体计算

过程。我们这里使用教材第14页上的矩阵作为示例：考虑矩阵 $B =$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 & 0 & 7 & 12 \\ 2 & 4 & -10 & 6 & 12 & 28 \\ 2 & 4 & -5 & 6 & -5 & -1 \end{bmatrix}.$$

1. 首先我们知道原矩阵第一行的第一个非零项必然在第一列之后 (实际上通过观察第二列的情况可知在第二列之后)，而原矩阵第二行与第三行的第一个非零项都在第一列里，这意味着目前第一行所包含的主1必然在目前第二行和第三行所包含的主1右边，与阶梯型要求的条件3不符。因此我们需要将第一行与第二行或者与第三行进行交换 (来保证阶梯型的条件3成立)。这里**第一行与第二行交换**，所得到的矩阵为 $B_1 =$

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & -10 & 6 & 12 & 28 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 7 & 12 \\ 2 & 4 & -5 & 6 & -5 & -1 \end{bmatrix}.$$

2. 现在我们将**第一行乘以1/2**使得第一行第一个非零项为1，从而得到第一行的主1: $B_2 =$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 3 & 6 & 14 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 7 & 12 \\ 2 & 4 & -5 & 6 & -5 & -1 \end{bmatrix}.$$

3. 现在我们注意到 B_2 里第三行的第一个非零项2仍在第一列里，这意味着 B_2 的第三行的主1与第一行的主1都在第一列里，不满足阶梯型的条件3。因此我们必须把第三行第一列上的项消掉，即，**将第一行乘以-2加到第三行上**，得到 $B_3 =$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 3 & 6 & 14 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 7 & 12 \\ 0 & 0 & 5 & 0 & -17 & -29 \end{bmatrix}.$$

4. 现在我们注意到 B_3 第二行的第一个非零项为-2位于第三列上。通过对第二行乘以-1/2我们得到第二行的主1: $B_4 =$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 3 & 6 & 14 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{7}{2} & -6 \\ 0 & 0 & 5 & 0 & -17 & -29 \end{bmatrix}.$$

5. 注意到 B_4 里第三行的第一个非零项为5，它与第二行的主1处于同一列上，不符合阶梯型条件3，因此我们仿照第三步，通过将第二行乘以-5加到第三行，将该项消掉，得到 $B_5 =$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 3 & 6 & 14 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{7}{2} & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}.$$

6. 现在只需对第三行乘以2去得到第三行的主1: $B_6 =$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 3 & 6 & 14 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{7}{2} & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

显然, 根据定义, 矩阵 B_6 是一个阶梯型。如果我们想将其继续转化为简化阶梯型, 则需要将第三列 (即第二行的主1所在的列) 和第五列 (即第三行的主1所在的列) 通过初等行变换分别转化为

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

与

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

最终得到的简化阶梯型为 $R =$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

在实际操作中, 大家可以根据自己的个人喜好, 经验, 以及矩阵的具体样子来决定如何进行初等行变换将其转化为阶梯型或简化阶梯型。比如可以遵循下面的几个核心步骤:

- 首先浏览矩阵的所有行, 找出所有不为0的行, 并将所有为0的行全部移动到矩阵的下方, 确保所有不为0的行都在所有为0的行的上方。
- 在每个不为0的行里都找出其包含的第一个不为0的项所在的列。假设第 i 行所包含的第一个不为0的项所在的列是其中最靠左的, 那么将第 i 行与第一行进行交换。
- 在交换过后得到的矩阵里, 第一行所包含的第一个不为0的项假设为常数 a , 将第一行乘以 $1/a$, 得到第一行里的主1。
- 假设现在所得到的矩阵里第一行的主1所在的列为第 j 列, 那么通过初等行变换将该列里所有其他的项 (即首行主1下方的所有项) 均消为0。注意这一步的意图是为了确保首行所包含的主1处于最左边。
- 现在可以暂时忘记第一行和第一列, 我们观察剩下的 $m-1$ 行和 $n-1$ 列 (假设原矩阵为 $m \times n$ -矩阵), 然后对其重复以上步骤。直到将其化为阶梯型为止。
- 将该阶梯型里所有行包含的主1上方和下方的非零项通过初等行变换全部消为0, 即可得到简化阶梯型。

现在我们将原矩阵 $B =$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 & 0 & 7 & 12 \\ 2 & 4 & -10 & 6 & 12 & 28 \\ 2 & 4 & -5 & 6 & -5 & -1 \end{bmatrix}$$

视为方程组

$$-2x_3 + 7x_5 = 12$$

$$2x_1 + 4x_2 - 10x_3 + 6x_4 + 12x_5 = 28$$

$$2x_1 + 4x_2 - 5x_3 + 6x_4 - 5x_5 = -1$$

的增广矩阵，那么该方程组的解与其阶梯型 $B_6 =$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 3 & 6 & 14 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{7}{2} & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

所对应的方程组

$$x_1 + 2x_2 - 5x_3 + 3x_4 + 6x_5 = 14$$

$$x_3 - \frac{7}{2}x_5 = -6$$

$$x_5 = 2$$

具有同样的解；类似的，与其简化阶梯型 $R =$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

所对应的方程组

$$x_1 + 2x_2 + 3x_4 = 7$$

$$x_3 = 1$$

$$x_5 = 2$$

具有同样的解。显然不论是方程组

$$x_1 + 2x_2 - 5x_3 + 3x_4 + 6x_5 = 14$$

$$x_3 - \frac{7}{2}x_5 = -6$$

$$x_5 = 2$$

还是方程组

$$x_1 + 2x_2 + 3x_4 = 7$$

$$x_3 = 1$$

$$x_5 = 2$$

都能容易的给出原方程组的解:

$$x_1 = 7 - 3r - 2s, x_2 = s, x_3 = 1, x_4 = r, x_5 = 2$$

这里 r, s 可以为任意常数。

我们将把一个线性方程组对应的增广矩阵通过一系列初等行变换转化为**阶梯型**的过程称之为**高斯消元法 (Gauss elimination)**, 把一个线性方程组对应的增广矩阵通过一系列初等行变换转化为**简化阶梯型**的过程称之为**高斯-若尔当消元法 (Gauss-Jordan elimination)**。

Definition 1.6. 假设 B 是一个线性方程组的增广矩阵, 其对应的阶梯型 \tilde{B} 或者简化阶梯型 R 里不为0的行里所包含的主1所对应的未知数被称为该方程组的主元 (*leading variable*), 主元之外的所有未知数被称为该方程组的自由元 (*free variable*)。

比如在上面的例子里, 由于简化阶梯型为 $R =$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix},$$

我们知道 x_1, x_3, x_5 为方程组的**主元**, x_2, x_4 为方程组的**自由元**。

由以上的计算容易看出, 若方程组有解, 那么该方程组的自由元所对应的解可以取任意值 (即自由取值, 这是自由元名字里“自由”一词的由来); 而当我们给自由元赋予特殊的值之后, 主元所对应的解则被唯一确定。比如上面的例子中, 我们已求出方程组

$$-2x_3 + 7x_5 = 12$$

$$2x_1 + 4x_2 - 10x_3 + 6x_4 + 12x_5 = 28$$

$$2x_1 + 4x_2 - 5x_3 + 6x_4 - 5x_5 = -1$$

的解为

$$x_1 = 7 - 3r - 2s, x_2 = s, x_3 = 1, x_4 = r, x_5 = 2$$

这里 r, s 可以为任意常数。若我们选择 $r = 1, s = 1$, 那么在对应的解里面, 主元 x_1 必然只能取值为 $x_1 = 7 - 3 - 2 = 2$, 此外 $x_3 = 1$ 和 $x_5 = 2$ 显然已经被唯一确定。

我们将

$$x_1 = 7 - 3r - 2s, x_2 = s, x_3 = 1, x_4 = r, x_5 = 2; \quad r, s \text{ 为任意常数}$$

这样的表示称为方程组的**通解 (general solution)**，将

$$x_1 = 2, x_2 = 1, x_3 = 1, x_4 = 1, x_5 = 2$$

(选择 $r = s = 1$ 后得到的解)这样的写法称为方程组的**特解**。显然特解是通过对通解里的自由元赋予具体数值后得到。

通过本节内的计算与观察，我们可以看出来一个线性方程组的增广矩阵经过初等行变换所得到的阶梯型或简化阶梯型的样子能够决定这个方程组是否有解，以及有解时是否有唯一解。总结如下：设某个(由 m 个 n 元一次方程组成的)方程组的增广矩阵 $B = (A, \mathbf{b})$ (A 为系数矩阵)，其对应的简化阶梯型为 $R = (U, \mathbf{s})$ (这里 \mathbf{s} 为矩阵 R 最右边的列)。

- 假如存在某个 $i \in \{1, \dots, m\}$ 使得矩阵 U 的第 i 行为0，而列向量 \mathbf{s} 的第 i 个坐标 $s_i \neq 0$ ，那么该方程组无解。反之该方程组至少有一个解。
- 如果矩阵 $U = I_n$ 为 $n \times n$ -单位矩阵，那么该方程组有且只有一组解，这个解就是向量 \mathbf{s} 。
- 若方程有解，且 $U \neq I_n$ ，那么该方程组有无穷多组解。

我们将在后续的学习中给出以上结论的严格证明。这里我们注意到以上结论已经回答了第1.1节最后提出的猜测。