

Programtervező informatikus szak I. évfolyam
Matematikai alapok gyakorlati jegy utóvizsga
2023. január 13.

Minden feladathoz kérjük: indoklás, levezetés, a számítások bemutatása.

Emlékeztető a követelményrendszerből:

Az elégséges (2-es) feltétele: mindhárom zh-témakörből legalább 7 pontot, ÉS összesen legalább 30 pontot kell elérni.

Első zh-témakör, összesen 25 pont

1. (8 pont) Oldjuk meg az alábbi egyenletet a valós számok halmazán:

$$\sqrt{2x+6} = \sqrt{x+4} + \sqrt{6-x}.$$

2. (9 pont) Oldjuk meg az alábbi egyenletet a valós számok halmazán:

$$9 - 5 \cos(2x) = \left(8 \sin \frac{\pi}{3}\right) \cdot \cos x + 2 \sin^2 x$$

3. (8 pont) Igazoljuk teljes indukcióval:

$$\forall n \in \mathbb{N}^+ : \quad \sum_{k=1}^n \frac{k}{2^k} = \frac{2^{n+1} - n - 2}{2^n}$$

Második zh-témakör, összesen 25 pont

4. (8 pont) Tekintsük a $z_1 = 7 + 11i$, $z_2 = 4 + i$ komplex számokat. Számítsuk ki az alábbi kifejezés értékét (az eredményt algebrai alakban kérjük):

$$\left(\frac{\overline{z_1}}{z_2}\right)^2 - \frac{(3-2i) \cdot \overline{z_1}}{z_2}$$

5. (8 pont) Legyen $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -2 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 5 & 7 \\ -2 & -6 \\ 7 & -2 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 0 & -10 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$.

Határozzuk meg a $(3A - B)^T \cdot C$ mátrix inverzét.

6. (9 pont) a) Hány dimenziós alteret generál \mathbb{R}^4 -ben az alábbi vektorrendszer?

$$v_1 = (3, 1, 0, -1), \quad v_2 = (-1, 2, 3, 1), \quad v_3 = (1, 5, 2, -3), \quad v_4 = (-1, 2, 2, 0)$$

b) Döntsük el, hogy az $u = (4, -2, 1, 1)$ vektor benne van-e ebben a generált alterben.

c) Mennyi a megadott v_1, v_2, v_3, v_4 vektorrendszer rangja?

Folytatás (Harmadik zh-témakör): a következő oldalon

Harmadik zh-témakör, összesen 25 pont

7. (9 pont) Határozzuk meg az alábbi mátrix sajátértékeit és sajátvektorait, majd vizsgáljuk meg a mátrixot diagonalizálhatóság szempontjából (diagonalizáló mátrix, diagonális alak):

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 2 & -2 & -2 \\ -3 & 3 & 3 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$$

8. (8 pont) Adott az alábbi lineárisan független vektorrendszer az \mathbb{R}^4 vektortérben:

$$b_1 = (1, -2, 0, 1), \quad b_2 = (1, -1, 2, 3), \quad b_3 = (1, 1, 0, 4).$$

Állítsunk elő ortogonális és ortonormált bázist a $W = \text{Span}(b_1, b_2, b_3)$ altérben.

9. (8 pont) Adott az alábbi $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvény:

$$f(x) = x^2 - 4x + 3 \quad (x \in (-\infty; 0))$$

Igazoljuk, hogy f invertálható, továbbá adjuk meg a $D_{f^{-1}}, R_{f^{-1}}$ halmazokat és $y \in D_{f^{-1}}$ esetén az $f^{-1}(y)$ függvényértéket.