

Programtervező Informatikus BSC szak
Analízis2 , 1. zárthelyi dolgozat, 2021.10.22.
Vázlatos megoldások, eredmények

1. Adott az $f(x) := \frac{x}{\sqrt{1+x}}$ ($x \in (-1; +\infty)$) függvény.

- (a) A definíció segítségével határozzuk meg az $f'(0)$ deriváltat, ha az létezik. **(3 pont)**
(b) Írjuk fel az érintőegyenest egyenletét az $a = 3$ abszcisszájú pontban, ha az létezik. **(4 pont)**
(c) Igazoljuk, hogy f invertálható. **(3 pont)**

Megoldás :

a) Világos, hogy $0 \in \text{Int}(-1; +\infty)$, ezért a definíció alapján :

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x}{\sqrt{1+x}} - \frac{0}{\sqrt{1+0}}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{1+x}} = 1 \in \mathbb{R} \implies \\ \implies \underline{\underline{f \in D\{0\} \wedge f'(0) = 1.}}$$

b) A műveleti szabályok és a deriválhatóság kapcsolatát leíró tételek alapján könnyen megmondható, hogy $f \in D(-1; +\infty)$, így $f \in D\{3\}$, ezért van érintő a szóbanforgó pontban, amelynek egyenlete :

$$y = f(3) + f'(3) \cdot (x - 3) \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Mivel $f(3) = \frac{3}{2}$ és $\forall x \in (-1; +\infty)$ esetén :

$$f'(x) = \left(\frac{x}{\sqrt{1+x}} \right)' = \frac{1 \cdot \sqrt{x+1} - x \cdot \frac{1}{2 \cdot \sqrt{x+1}} \cdot 1}{x+1} = \frac{(2x+2) - x}{2 \cdot (x+1) \cdot \sqrt{x+1}} = \frac{x+2}{2 \cdot (x+1) \cdot \sqrt{x+1}},$$

ezért :

$$f'(3) = \frac{x+2}{2 \cdot (x+1) \cdot \sqrt{x+1}} \Big|_{x=3} = \frac{5}{16}.$$

A keresett érintő egyenlete :

$$y = \frac{3}{2} + \frac{5}{16} \cdot (x - 3),$$

vagy :

$$\underline{\underline{y = \frac{5}{16} \cdot x + \frac{9}{16}}}.$$

c) Az előző pont alapján az f deriváltfüggvénye :

$$f'(x) = \frac{x+2}{2 \cdot (x+1) \cdot \sqrt{x+1}} > 0 \quad \forall x \in I := (-1; +\infty) \implies$$

az f szigorúan monoton nő az I intervallumon, tehát f invertálható.

2. Határozzuk meg az $a, b \in \mathbb{R}$ paraméterek értékét úgy, hogy alábbi függvény deriválható legyen és adjuk meg a deriváltfüggvényt.

$$f(x) = \begin{cases} a \cdot e^{2x} + b \cdot \cos x, & \text{ha } x \in (-\infty; 0); \\ x^4 + 5x^2 - 4x + 1, & \text{ha } x \in [0; +\infty). \end{cases} \quad \textbf{(10 pont)}$$

Megoldás :

- (a) Ha $x \in (-\infty; 0) \implies f \in D\{x\}$ és $f'(x) = (a \cdot e^{2x} + b \cdot \cos x)' = 2a \cdot e^{2x} - b \cdot \sin x$.
 (b) Ha $x \in (0; +\infty) \implies f \in D\{x\}$ és $f'(x) = (x^4 + 5x^2 - 4x + 1)' = 4x^3 + 10x - 4$.
 (c) Az $x = 0$ pontban f pontosan akkor deriválható, ha :

$$f \in C\{0\} \wedge f'_b(0) = f'_j(0).$$

- Az első feltételhez :

$$\lim_{x \rightarrow 0-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0-0} (a \cdot e^{2x} + b \cdot \cos x) = a + b;$$

$$\lim_{x \rightarrow 0+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0+0} (x^4 + 5x^2 - 4x + 1) = 1 = f(1).$$

Mindezek alapján :

$$f \in C\{0\} \iff a + b = 1.$$

- Az egyoldali deriváltak az alábbiak :

$$f'_b(0) = 2a \cdot e^{2x} - b \cdot \sin x \Big|_{x=0-0} = 2a;$$

$$f'_j(0) = 4x^3 + 10x - 4 \Big|_{x=0+0} = -4.$$

A deriválhatóságra tett második feltétel alapján :

$$2a = -4 \iff a = -2.$$

A két feltétel pontosan akkor teljesül, ha

$$\underline{a = -2 \wedge b = 3.}$$

Ekkor a derivált 0-ban :

$$f'(0) = -4.$$

Összefoglalva a deriválható f és annak f' deriváltfüggvénye az alábbiak :

$$f(x) = \begin{cases} -2 \cdot e^{2x} + 3 \cdot \cos x, & \text{ha } x \in (-\infty; 0); \\ x^4 + 5x^2 - 4x + 1, & \text{ha } x \in [0; +\infty). \end{cases}$$

és

$$\underline{f'(x) = \begin{cases} -4 \cdot e^{2x} - 3 \cdot \sin x, & \text{ha } x \in (-\infty; 0); \\ 4x^3 + 10x - 4, & \text{ha } x \in [0; +\infty). \end{cases}}$$

3. Hogyan válasszuk meg egy henger alakú zárt tartály méreteit (alapkör sugara és magassága), hogy a térfogata 8000 m^3 legyen és az előállításához szükséges anyagfelhasználás (homogén az anyag mindenhol) minimális legyen? (8 pont)

Megoldás : Jelölje $R > 0$ és $m > 0$ a henger alapkörének sugarát illetve magasságát. Ekkor a megadott tartály térfogata és teljes felszíne (palástfelszín, alapkör és fedőlap összterülete) az R és m függvényében :

$$V(R, m) = \pi \cdot R^2 m \wedge F(R, m) = 2\pi R m + 2\pi R^2 \quad (R, m > 0).$$

A feltétel szerint :

$$V(R, m) = \pi R^2 m = 8000 \implies m = \frac{8000}{\pi R^2}.$$

Helyettesítsük be a felszín képletébe az m -et és így kapjuk R -nek egyváltozós függvényét :

$$f(R) := 2\pi R \cdot \frac{8000}{\pi R^2} + 2\pi R^2 = \frac{16000}{R} + 2\pi R^2 \quad (R > 0).$$

Ekkor $f \in D$ és

$$f'(R) = -\frac{16000}{R^2} + 4\pi R \quad (R > 0).$$

Világos, hogy :

$$f'(R) = 0 \iff -\frac{16000}{R^2} + 4\pi R = 0 \iff R = 10 \cdot \sqrt[3]{\frac{4}{\pi}}.$$

$$f'(R) > 0 \iff -\frac{16000}{R^2} + 4\pi R > 0 \iff R > 10 \cdot \sqrt[3]{\frac{4}{\pi}}.$$

$$f'(R) < 0 \iff -\frac{16000}{R^2} + 4\pi R < 0 \iff 0 < R < 10 \cdot \sqrt[3]{\frac{4}{\pi}}.$$

A határértékek a "végpontokban" :

$$\lim_{R \rightarrow 0+0} \left(\frac{16000}{R} + 2\pi R^2 \right) = +\infty,$$

és

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \left(\frac{16000}{R} + 2\pi R^2 \right) = +\infty.$$

Mivel f szigorúan monoton csökken a $\left(0, 10\sqrt[3]{\frac{4}{\pi}}\right)$ intervallumon, szigorúan monoton nő a $\left(10\sqrt[3]{\frac{4}{\pi}}; +\infty\right)$ intervallumon és f folytonos, ezért abszolút minimumot kaptunk az

$$\underbrace{R = 10 \cdot \sqrt[3]{\frac{4}{\pi}}}$$

pontban. Abszolút maximum nincs. A henger magassága :

$$\underbrace{m = \frac{8000}{\pi R^2} = \frac{40}{\sqrt[3]{2\pi}}}.$$

A minimális felszín értéke :

$$\underbrace{f\left(10 \cdot \sqrt[3]{\frac{4}{\pi}}\right) = 1200 \cdot \sqrt[3]{2\pi}}.$$

4. Végezzünk teljes tárgyalást (monotonitás, szélsőértékek, konvexitás, inflexiós pontok, határértékek, aszimptoták) és ábrázoljuk a következő függvényt :

$$f(x) := \frac{x}{(x+3)^2} \quad (x \in \mathbb{R} \setminus \{-3\}). \quad (14 \text{ pont})$$

Megoldás :

- (a) **Tengelymetszési pontok** : $f(0) = 0$ és $f(x) = 0 \iff \frac{x}{(x+3)^2} = 0 \iff x = 0$, tehát f a $(0, 0)$ pontban metszi mindkét tengelyt.
 (b) **f' és előjele** : $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-3\}$ esetén $f \in D\{x\}$ és :

$$\underbrace{f'(x) = \left(\frac{x}{(x+3)^2} \right)' = \frac{1 \cdot (x+3)^2 - x \cdot 2 \cdot (x+3)}{(x+3)^4} = \frac{3-x}{(x+3)^3}} \quad (x \in \mathbb{R} \setminus \{-3\}).$$

Ekkor :

$$f'(x) = 0 \iff \frac{3-x}{(x+3)^3} = 0 \iff x = 3;$$

$$f'(x) > 0 \iff \frac{3-x}{(x+3)^3} > 0 \iff x \in (-3; 3);$$

$$f'(x) < 0 \iff \frac{3-x}{(x+3)^3} < 0 \iff x \in (-\infty; -3) \cup (3; +\infty).$$

Tételeink alapján : f szigorúan monoton fogy a $(-\infty; -3)$ illetve a $(3; +\infty)$ intervallumonkon és szigorúan monoton nő a $(-3; 3)$ intervallumon. Mivel a deriváltfüggvény előjelet vált az $x = 3$ helyen $(+ \rightarrow -)$ ezért itt *lokális maximum* van, melynek értéke :

$$\underline{\underline{f(3) = \frac{1}{12}}}.$$

(c) f'' és előjele : $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-3\}$ esetén $f \in D^2\{x\}$ és :

$$\underline{\underline{f''(x) = \left(\frac{3-x}{(x+3)^3}\right)' = \frac{-1 \cdot (x+3)^3 - (3-x) \cdot 3 \cdot (x+3)^2}{(x+3)^6} = \frac{2 \cdot (x-6)}{(x+3)^4} \quad (x \in \mathbb{R} \setminus \{-3\}).}}$$

Ekkor, mivel a nevező az értelmezési tartomány pontjaiban pozitív, ezért :

$$f''(x) = 0 \iff \frac{2 \cdot (x-6)}{(x+3)^4} = 0 \iff x = 6;$$

$$f''(x) > 0 \iff \frac{2 \cdot (x-6)}{(x+3)^4} > 0 \iff x \in (6; +\infty);$$

$$f''(x) < 0 \iff \frac{2 \cdot (x-6)}{(x+3)^4} < 0 \iff x \in (-\infty; 6) \setminus \{-3\}.$$

Tételeink alapján : f konkáv a $(-\infty; -3)$, illetve a $(-3; 6)$ intervallumonkon és konvex a $(6; +\infty)$ intervallumon. Mivel a második derivált előjelet vált az $x = 6$ helyen $(- \rightarrow +)$ ezért itt *inflexiós* pontja van. Az itteni érték :

$$\underline{\underline{f(6) = \frac{2}{27}}}.$$

(d) **Határértékek, aszimptoták :**


$$\lim_{x \rightarrow -3} f(x) = \lim_{x \rightarrow -3} \frac{x}{(x+3)^2} = \frac{-3}{(\pm 0)^2} = \frac{-3}{+0} = -\infty,$$

ami azt jelenti, hogy az $x = -3$ egyenes függőleges aszimptota.

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x}{(x+3)^2} = (L'H) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{2 \cdot (x+3)} = \frac{1}{\pm\infty} = \pm 0,$$

azaz az $y = 0$ egyenes vízszintes aszimptota $\pm\infty$ -ben.

(e) **Táblázat, grafikon :**



5. Írjuk fel az

$$f(x) := \operatorname{arctg}(\cos(x)) \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvény $a = 0$ ponthoz tartozó másodfokú Taylor-polinomját. (8 **pont**)

Megoldás : A keresett polinom az alábbi :

$$T_2(x) = f(0) + f'(0) \cdot x + \frac{f''(0)}{2!} \cdot x^2 \quad (x \in \mathbb{R}).$$

A szükséges deriváltak léteznek minden x valós helyen, így 0-ban is, ezért :

$$f(x) = \operatorname{arctg}(\cos(x)), \quad f(0) = \operatorname{arctg}(\cos(0)) = \operatorname{arctg}(1) = \frac{\pi}{4};$$

$$f'(x) = -\frac{\sin x}{1 + \cos^2 x}, \quad f'(0) = -\frac{\sin 0}{1 + \cos^2 0} = 0;$$

$$f''(x) = \left(-\frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} \right)' = -\frac{\cos x \cdot (1 + \cos^2 x) + 2 \sin^2 x \cdot \cos x}{(1 + \cos^2 x)^2}, \quad f''(0) = -\frac{1}{2}.$$

Mindezek alapján a 0 körüli másodfokú Taylor-polinom az alábbi parabola :

$$\underbrace{T_2(x) = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{4} \cdot x^2}_{\text{parabola}} \quad (x \in \mathbb{R}).$$