

Analízis II.

A és B szakirány

1. előadás

Differenciálszámítás 1.

1. A tantárgy honlapja:

<https://numanal.inf.elte.hu/szili.html/>

- Követelményrendszer.
- Előadás-, illetve gyakorlatanyagok.

2. Emlékeztető

- **Cél:** függvénytulajdonságok (monotonitás, szélsőérték, konvexitás) jellemzése.
- **Eddig:** – függvény határértéke, folytonossága,
– folytonos függvények tulajdonságai,
– hatványsorok,
– elemi függvények értelmezése.

3. A félév anyaga: valós-valós függvényekre

- differenciálszámítás,
- integrálszámítás.

Az óra anyaga

- 1 A derivált motivációja
- 2 A pontbeli derivált fogalma
- 3 A folytonosság és a derivált kapcsolata
- 4 Lineáris közelítés
- 5 Függvénygrafikon érintője
- 6 A deriváltfüggvény
- 7 Deriválási szabályok
- 8 Elemi függvények deriváltjai



Az óra anyaga

- 1 A derivált motivációja
- 2 A pontbeli derivált fogalma
- 3 A folytonosság és a derivált kapcsolata
- 4 Lineáris közelítés
- 5 Függvénygrafikon érintője
- 6 A deriváltfüggvény
- 7 Deriválási szabályok
- 8 Elemi függvények deriváltjai

1. A derivált motivációja

1. Függvénygrafikon „töréspontja”, „simasága”, „érintője”.

A fogalmak szemléletes jelentése világos.



A g grafikonjának az $(a, g(a))$ pont egy „töréspontja”. Az f grafikonja „sima”, nincs „töréspontja”.

A különbség pontos leírásához induljunk ki abból az *ötletből*, hogy húzzunk szelőt a grafikon $(a, f(a))$ pontjában:

$$f(x) = \frac{7}{20} \cdot (x - 1)^2 + \frac{7}{10} \quad (x \in \mathbb{R}), \quad a = \frac{3}{2}$$

A szelőknek van „határhelyzete”, ha $h \rightarrow 0$, mert

$$\exists \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \quad \text{határérték és az véges.}$$

Ekkor azt mondjuk, hogy a függvény **deriválható az a pontban**.

A görbe **érintőjének** azt az egyenest célszerű nevezni, amelyhez a húrok egyenesesei tartanak, ha $h \rightarrow 0$.

2. Pillanatnyi sebesség.

A másik motiváció egy fizikai probléma. Tegyük fel, hogy egy pont mozgását a $t \mapsto s(t)$ út-idő függvény írja le. A $[t_0, t]$ időintervallumban az átlagsebesség a megtett $s(t) - s(t_0)$ út és a megtételéhez szükséges $t - t_0$ idő hányadosa, azaz

$$\frac{s(t) - s(t_0)}{t - t_0}.$$

Ha

$$\exists \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{s(t) - s(t_0)}{t - t_0} \text{ határérték és az véges,}$$

akkor az átlagsebesség a fenti határértékhez lesz „közel”, ha „minden határon túl” rövidítjük a $[t_0, t]$ időintervallumot. A pillanatnyi sebességet a fenti határértékkel **definiáljuk**.

Az óra anyaga

- 1 A derivált motivációja
- 2 A pontbeli derivált fogalma
- 3 A folytonosság és a derivált kapcsolata
- 4 Lineáris közelítés
- 5 Függvénygrafikon érintője
- 6 A deriváltfüggvény
- 7 Deriválási szabályok
- 8 Elemi függvények deriváltjai

2. A pontbeli derivált fogalma

A pontbeli deriváltat a függvény értelmezési tartományának a **belső pontjaiban** fogjuk értelmezni.

Definíció.

Legyen $\emptyset \neq A \subset \mathbb{R}$. Az $a \in A$ pont az A **halmaz belső pontja**, ha

$$\exists r > 0, \text{ hogy } K_r(a) = (a - r, a + r) \subset A.$$

Jelölés: $\boxed{\text{int } A} := \{a \in A \mid a \text{ belső pontja } A\text{-nak}\}.$

Példák.

$\text{int } (0, 1) = (0, 1), \text{ int } [0, 1] = (0, 1), \text{ int } \mathbb{R} = \mathbb{R}, \text{ int } \mathbb{N} = \emptyset,$
 $\text{int } \mathbb{Q} = \emptyset,$

ha $A \subset \mathbb{R}$ véges halmaz, akkor $\text{int } A = \emptyset$.

Definíció.

Az $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény az $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ pontban **differenciálható** (vagy **deriválható**), ha

$$\exists \text{ és véges } a \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \text{ határérték.}$$

Ezt $f'(a)$ -val jelöljük, és az f függvény a **pontbeli deriváltjának** (vagy **differenciálhányadosának**) nevezzük, azaz

$$f'(a) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \in \mathbb{R}.$$

Ezt a tényt a következőképpen fogjuk jelölni: $\boxed{f \in D\{a\}}$.

Megjegyzések.

1^o Ekvivalens alak: $f \in D\{a\} \iff \boxed{\exists f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \in \mathbb{R}.}$

2^o Ha $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ és $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$, akkor

$$\Delta_a f(x) := \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \quad (x \in \mathcal{D}_f \setminus \{a\})$$

az f függvény a ponthoz tartozó **különbségihányados-függvénye**
vagy **differenciahányados-függvénye**.

$\Delta_a f(x)$ jelentése: f grafikonján az $(a, f(a))$, $(x, f(x))$ pontokat összekötő szelő meredeksége. Így

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \Delta_a f(x).$$

3^o A derivált definíciójában 0/0-típusú határértékről van szó. ■

Példa.

Tetszőleges $n \geq 1$ természetes szám esetén az $f(x) := x^n$ ($x \in \mathbb{R}$) függvény minden $x \in \mathbb{R}$ ($= \text{int } \mathcal{D}_f$) pontban deriválható, és a deriváltja nx^{n-1} , azaz

$$\boxed{(x^n)' = nx^{n-1} \quad (x \in \mathbb{R})}.$$

Bizonyítás. Ha $x \in \mathbb{R}$, akkor

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h} = \\ & \quad (\text{mivel } a^n - b^n = (a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + b^{n-1})) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h[(x+h)^{n-1} + (x+h)^{n-2}x + \dots + x^{n-1}]}{h} = nx^{n-1} \end{aligned}$$

a hatványfüggvény folytonossága alapján. ■

Az óra anyaga

- 1 A derivált motivációja
- 2 A pontbeli derivált fogalma
- 3 A folytonosság és a derivált kapcsolata
- 4 Lineáris közelítés
- 5 Függvénygrafikon érintője
- 6 A deriváltfüggvény
- 7 Deriválási szabályok
- 8 Elemi függvények deriváltjai

3. A folytonosság és a derivált kapcsolata

Tétel.

Tegyük fel, hogy $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ és $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$. Ekkor

$$1^\circ \quad f \in D\{a\} \implies f \in C\{a\},$$

2° Az állítás megfordítása nem igaz.

Bizonyítás.

1° $f \in D\{a\} \Rightarrow a \in \text{int } \mathcal{D}_f \Rightarrow a \in \mathcal{D}'_f \Rightarrow a \in \mathcal{D}_f \cap \mathcal{D}'_f$. Tehát

$$f \in C\{a\} \iff \exists \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a) \iff \lim_{x \rightarrow a} (f(x) - f(a)) = 0.$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} (f(x) - f(a)) &= \lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \cdot (x - a) \right) = \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \cdot \lim_{x \rightarrow a} (x - a) = f'(a) \cdot 0 = 0. \blacksquare \end{aligned}$$

2° Van olyan folytonos függvény, amelyik egy pontban folytonos, de ott nem deriválható. Például

$$\text{abs} \in C\{0\}, \quad \text{de} \quad \text{abs} \notin D\{0\},$$

mert az


$$\mathbb{R} \setminus \{0\} \ni x \mapsto \frac{\text{abs}(x) - \text{abs}(0)}{x - 0} = \frac{|x| - |0|}{x} = \begin{cases} 1, & \text{ha } x > 0 \\ -1, & \text{ha } x < 0 \end{cases}$$

függvénynek a 0 pontban nincs határértéke. ■

\mathbb{R} -en folytonos, de sehol sem deriválható függvények

K. Weierstrass (1861)

$$f(x) := \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\cos(15^n \pi x)}{2^n} \quad (x \in \mathbb{R})$$




T. Takagi (1903)

B.L. van der Waerden (1930)

$$f(x) := \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\langle 10^n x \rangle}{10^n} \quad (x \in \mathbb{R})$$

$$\langle \alpha \rangle := \min\{|\alpha - k| \mid k \in \mathbb{Z}\}$$



Az óra anyaga

- 1 A derivált motivációja
- 2 A pontbeli derivált fogalma
- 3 A folytonosság és a derivált kapcsolata
- 4 **Lineáris közelítés**
- 5 Függvénygrafikon érintője
- 6 A deriváltfüggvény
- 7 Deriválási szabályok
- 8 Elemi függvények deriváltjai

4. Lineáris közelítés

Tétel.

Legyen $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ és $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$. Ekkor $f \in D\{a\} \iff$

$$\left\{ \begin{array}{l} \exists A \in \mathbb{R} \text{ és } \exists \varepsilon : \mathcal{D}_f \rightarrow \mathbb{R}, \lim_a \varepsilon = 0 : \\ f(x) - f(a) = A \cdot (x - a) + \varepsilon(x)(x - a) \quad (x \in \mathcal{D}_f), \end{array} \right.$$

és $A = f'(a)$.

Bizonyítás.

$$\boxed{\implies} \quad f \in D\{a\} \implies \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a) \in \mathbb{R} \iff$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{f(x) - f(a)}{x - a} - f'(a) \right) = 0.$$

Ha

$$\varepsilon(x) := \frac{f(x) - f(a)}{x - a} - f'(a) \quad (x \in \mathcal{D}_f \setminus \{a\}),$$

akkor $\lim_a \varepsilon = 0$ és

$$f(x) - f(a) = f'(a) \cdot (x - a) + \varepsilon(x)(x - a) \quad (x \in \mathcal{D}_f),$$

ezért a feltétel az $A = f'(a)$ választással teljesül.

$\boxed{\Leftarrow}$ T.f.h. $\exists A \in \mathbb{R}$ és $\exists \varepsilon : \mathcal{D}_f \rightarrow \mathbb{R}$, $\lim_a \varepsilon = 0$, hogy


$$f(x) - f(a) = A \cdot (x - a) + \varepsilon(x)(x - a) \quad (x \in \mathcal{D}_f).$$

Ebből

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} = A + \varepsilon(x) \longrightarrow A, \quad \text{ha } x \longrightarrow a$$

adódik, ami azt jelenti, hogy $f \in D\{a\}$ és $f'(a) = A$. ■

Szemléletes jelentés:



Megjegyzések.

1^o A „kis ordó” jelölés. Ha $\lim_c F = \lim_c G = 0$ és $\lim_{x \rightarrow c} \frac{F(x)}{G(x)} = 0$, akkor $F(x)$ gyorsabban tart 0-hoz, mint $G(x)$, ha $x \rightarrow c$. A.m.h. a c -hez közeli pontokban $F(x)$ **kis ordó** $G(x)$ **nagyságrendű**, jelben:

$$F(x) = o(G(x)), \quad \text{ha } x \rightarrow c.$$

2^o Ha $f \in D\{a\} \implies$

$$f(a+h) - f(a) = \underbrace{f'(a) \cdot h}_{1. \text{ tag}} + \underbrace{\varepsilon(h) \cdot h}_{2. \text{ tag}} \quad (a+h \in \mathcal{D}_f).$$

Az 1. tag egy lineáris függvény, a második tag $\lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon(a+h) = 0$ miatt az elsőhöz képest „kicsi” (elhanyagolható). Az 1. tag a **főrész**, a 2. tag a **maradéktag**.

A kis ordó jelöléssel:

$$f(a + h) - f(a) = f'(a) \cdot h + o(h) \quad \text{ha } h \rightarrow 0.$$

Az f függvény a pontbeli deriválhatósága tehát azt jelenti, hogy a függvény megváltozása az a pont környezetében „jól” közelíthető lineáris függvénnyel. Ezt így is jelölhetjük:

$$f(a + h) - f(a) \approx f'(a) \cdot h \quad (\text{ha } h \approx a).$$

3° A differenciál fogalma. Ha $f \in D\{a\}$, akkor az $f'(a) \cdot h$ ($h \in \mathbb{R}$) lineáris függvényt az f függvény a ponthoz tartozó **differenciáljának** nevezzük, és így jelöljük:

$$\boxed{d_a f = df}, \text{ azaz } d_a f(h) = f'(a) \cdot h \ (h \in \mathbb{R}).$$

Ha $e(x) := x$ ($x \in \mathbb{R}$), akkor $\forall a \in \mathbb{R}$ pontban $e'(a) = 1$, így $d_a e(h) = 1 \cdot h$ ($h \in \mathbb{R}$). Tehát

$$f'(a) = \frac{d_a f}{d_a e}(a) = \frac{df}{de}.$$

Ezzel indokolható (és éppen innen ered) a „differenciálhányados” elnevezés, ill. az $f'(a)$ -ra gyakran használt jelölés: $\boxed{\frac{df}{dx}(a)}$. A nevezőben e helyett x -et szokás írni. ■

Az óra anyaga

- 1 A derivált motivációja
- 2 A pontbeli derivált fogalma
- 3 A folytonosság és a derivált kapcsolata
- 4 Lineáris közelítés
- 5 Függvénygrafikon érintője**
- 6 A deriváltfüggvény
- 7 Deriválási szabályok
- 8 Elemi függvények deriváltjai

5. Függvénygrafikon érintője

A középiskolában: pl. kör, parabola érintőjének a fogalma.

Most: Ha $f \in D\{a\} \implies (a, f(a))$ és az $(x, f(x))$ pontokon átmenő szelőknek van „határegyenese”, ha $x \rightarrow a$. Érintőn éppen ezt az egyenest célszerű érteni.

Definíció.


Az $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény grafikonjának az $(a, f(a))$ pontban **van érintője**, ha $f \in D\{a\}$. Az f függvény grafikonjának $(a, f(a))$ pontbeli **érintőjén** az

$$y = f'(a) \cdot (x - a) + f(a)$$

egyenletű egyenest értjük.

Megjegyzések.

1^o $f'(a)$ szemléletes jelentése: a grafikon $(a, f(a))$ pontbeli érintőjének a meredeksége



2^o $f'(a)$ **véges**, ezért az érintő **nem** párhuzamos az y -tengellyel.

3^o A parabola érintőjének a fenti definíciója *ekvivalens* a középiskolában geometriai úton megadott definícióval. ■

Az óra anyaga

- 1 A derivált motivációja
- 2 A pontbeli derivált fogalma
- 3 A folytonosság és a derivált kapcsolata
- 4 Lineáris közelítés
- 5 Függvénygrafikon érintője
- 6 A deriváltfüggvény**
- 7 Deriválási szabályok
- 8 Elemi függvények deriváltjai

6. A deriváltfüggvény

A derivált a leghatékonyabb segédeszköz egy függvény tulajdonságainak vizsgálatára. Ez lokálisan és globálisan is igaz. Az $f'(a)$ derivált létezése és értéke az f függvény a -beli **lokális** viselkedésére jellemző: $f'(a)$ értékéből az f függvény a pont körüli viselkedésére vonhatunk le következtetéseket. (L. a folytonosság és a derivált kapcsolata.)

Ha f pl. egy intervallum minden pontjában deriválható, akkor az $f'(x)$ értékekből az f függvény **globális** viselkedésére következtethetünk. Célszerű a deriválást olyan operációként felfogni, amely függvényekhez rendel függvényeket.

Definíció.

Ha $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ és $\{x \in \text{int } \mathcal{D}_f \mid f \in D\{x\}\} \neq \emptyset$, akkor az

$$\{x \in \text{int } \mathcal{D}_f \mid f \in D\{x\}\} \ni x \mapsto f'(x)$$

*függvényt az f **deriváltfüggvényének** (vagy **differentiálhányados-függvényének**) nevezzük, és az f' szimbólummal jelöljük.*

Az óra anyaga

- 1 A derivált motivációja
- 2 A pontbeli derivált fogalma
- 3 A folytonosság és a derivált kapcsolata
- 4 Lineáris közelítés
- 5 Függvénygrafikon érintője
- 6 A deriváltfüggvény
- 7 Deriválási szabályok**
- 8 Elemi függvények deriváltjai

7. Deriválási szabályok

Tétel: Az algebrai műveletek és a derivált kapcsolata.

T.f.h. $f, g \in D\{a\}$ valamilyen $a \in \text{int}(\mathcal{D}_f \cap \mathcal{D}_g)$ pontban. Ekkor

$$1^\circ \quad c \cdot f \in D\{a\} \quad \text{és} \quad (c \cdot f)'(a) = c \cdot f'(a) \quad (c \in \mathbb{R}),$$

$$2^\circ \quad f + g \in D\{a\} \quad \text{és} \quad (f + g)'(a) = f'(a) + g'(a),$$

$$3^\circ \quad f \cdot g \in D\{a\} \quad \text{és} \\ (f \cdot g)'(a) = f'(a) \cdot g(a) + f(a) \cdot g'(a),$$

4° ha még a $g(a) \neq 0$ feltétel is teljesül, akkor

$$\frac{f}{g} \in D\{a\} \quad \text{és} \\ \left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a) \cdot g(a) - f(a) \cdot g'(a)}{g^2(a)}.$$

Bizonyítás.

A közös ötlet: $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ és $\frac{g(x) - g(a)}{x - a}$ „kialakítása”.

3° A szorzatfüggvény deriválása. Világos, hogy $a \in \text{int } \mathcal{D}_{f \cdot g}$.

Az $f \cdot g$ függvény különbségihányados-függvénye az a pontban

$$\begin{aligned} \frac{(fg)(x) - (fg)(a)}{x - a} &= \frac{f(x) \cdot g(x) - f(a) \cdot g(a)}{x - a} \stackrel{!}{=} \\ &\stackrel{!}{=} \frac{f(x) \cdot g(x) - f(a) \cdot g(x) - f(a) \cdot g(a) + f(a) \cdot g(x)}{x - a} = \\ &= \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \cdot g(x) + f(a) \cdot \frac{g(x) - g(a)}{x - a} \quad (x \in \mathcal{D}_{f \cdot g} \setminus \{a\}). \end{aligned}$$

Mivel $g \in D\{a\}$, ezért $g \in C\{a\}$, tehát $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = g(a)$. Így

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} \frac{(fg)(x) - (fg)(a)}{x - a} &= \\ \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x) + f(a) \cdot \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) - g(a)}{x - a} &= \\ = f'(a) \cdot g(a) + f(a) \cdot g'(a). \end{aligned}$$

Ez azt jelenti, hogy $f \cdot g \in D\{a\}$ és

$$(f \cdot g)'(a) = f'(a) \cdot g(a) + f(a) \cdot g'(a). \blacksquare$$

4° A hányadosfüggvény deriválása.

Először azt igazoljuk, hogy $a \in \text{int } \mathcal{D}_{\frac{f}{g}}$.

Valóban: $g \in D\{a\} \implies g \in C\{a\}$. Tehát $g(a) \neq 0 \implies$

$\exists K(a) \subset \mathcal{D}_f : g(x) \neq 0 \quad (\forall x \in K(a)) \implies a \in \text{int } \mathcal{D}_{\frac{f}{g}}$.

Az $\frac{f}{g}$ hányadosfüggvény különbségihányados-függvénye a -ban

$$\begin{aligned} \frac{\left(\frac{f}{g}\right)(x) - \left(\frac{f}{g}\right)(a)}{x - a} &= \frac{\frac{f(x)}{g(x)} - \frac{f(a)}{g(a)}}{x - a} = \\ &= \frac{1}{g(a)g(x)} \cdot \frac{f(x) \cdot g(a) - f(a) \cdot g(x)}{x - a} = \\ &= \frac{1}{g(a)g(x)} \left(\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \cdot g(a) - f(a) \cdot \frac{g(x) - g(a)}{x - a} \right) \end{aligned}$$

Mivel $g \in C\{a\} \implies \lim_{x \rightarrow a} g(x) = g(a) \neq 0$, ezért

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow a} \frac{\left(\frac{f}{g}\right)(x) - \left(\frac{f}{g}\right)(a)}{x - a} = \\ &= \frac{1}{g(a) \lim_{x \rightarrow a} g(x)} \left(\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \cdot g(a) - f(a) \cdot \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) - g(a)}{x - a} \right) = \\ &= \frac{1}{g^2(a)} (f'(a)g(a) - f(a)g'(a)). \end{aligned}$$

Ez azt jelenti, hogy $\frac{f}{g} \in D\{a\}$ és

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g^2(a)}. \blacksquare$$

Tétel: Az összetett függvény deriválása.

T.f.h. $f, g \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $\mathcal{R}_g \subset \mathcal{D}_f$ és egy $a \in \text{int } \mathcal{D}_g$ pontban $g \in D\{a\}$, továbbá $f \in D\{g(a)\}$. Ekkor $f \circ g \in D\{a\}$, és

$$(f \circ g)'(a) = f'(g(a)) \cdot g'(a).$$

Bizonyítás.

Először azt igazoljuk, hogy $a \in \text{int } \mathcal{D}_{f \circ g}$.

Valóban: $\mathcal{R}_g \subset \mathcal{D}_f \implies \mathcal{D}_{f \circ g} = \mathcal{D}_g$. Mivel $g \in D\{a\}$, ezért $a \in \text{int } \mathcal{D}_g \implies a \in \text{int } \mathcal{D}_{f \circ g}$.

$$g \in D\{a\} \xrightarrow[\text{közelítés}]{\text{lineáris}} \exists \varepsilon : \mathcal{D}_g \rightarrow \mathbb{R}, \quad \lim_a \varepsilon = 0:$$

$$(*) \quad g(x) - g(a) = g'(a)(x - a) + \varepsilon(x)(x - a) \quad (x \in \mathcal{D}_g).$$

$$\text{Hasonlóan: } f \in D\{g(a)\} \xrightarrow[\text{közelítés}]{\text{lineáris}} \exists \eta : \mathcal{D}_f \rightarrow \mathbb{R}, \quad \lim_{g(a)} \eta = 0:$$

$$f(y) - f(g(a)) = f'(g(a))(y - g(a)) + \eta(y)(y - g(a)) \quad (y \in \mathcal{D}_f).$$

Ebbe $y = g(x)$ -et helyettesítve:

$$\begin{aligned} (f \circ g)(x) - (f \circ g)(a) &= f(g(x)) - f(g(a)) = \\ &= f'(g(a))(g(x) - g(a)) + \eta(g(x))(g(x) - g(a)) \stackrel{(*)}{=} \\ &\stackrel{(*)}{=} A \cdot (x - a) + \delta(x)(x - a) \quad (x \in \mathcal{D}_{f \circ g}), \end{aligned}$$

ahol

$$A := f'(g(a)) \cdot g'(a),$$

$$\delta(x) := f'(g(a)) \cdot \varepsilon(x) + \eta(g(x)) \cdot (g'(a) + \varepsilon(x)).$$

Mivel $x \rightarrow a$ esetén $g(x) \rightarrow g(a)$, ezért $\eta(g(x)) \rightarrow 0$, ha $x \rightarrow a$ (feltehető, hogy $\eta(g(a)) = 0$, így η folytonos $g(a)$ -ban). Ebből, továbbá a $\lim_{a} \varepsilon = 0$ -ból következik, hogy

$$\delta(x) \rightarrow 0, \text{ ha } x \rightarrow a.$$

Ez pedig a lineáris közelítésre vonatkozó tétel szerint éppen azt jelenti, hogy $f \circ g \in D\{a\}$ és

$$(f \circ g)'(a) = f'(g(a)) g'(a). \blacksquare$$

Tétel: Hatványsor összegfüggvényének a deriválása.

T.f.h. hogy a $\sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n(x-a)^n$ ($x \in \mathbb{R}$) hatványsor R konvergenciasugara pozitív, és legyen

$$f(x) := \sum_{n=0}^{+\infty} \alpha_n(x-a)^n \quad (x \in K_R(a)).$$

Ekkor minden $x \in K_R(a)$ pontban $f \in D\{x\}$ és

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} n\alpha_n(x-a)^{n-1} \quad (\forall x \in K_R(a)).$$

Bizonyítás. Nélkül. ■

Példák.

1^o Az $\exp x := \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}$ ($x \in \mathbb{R}$) függvény deriválható, és

$$\exp'(x) = (e^x)' = e^x \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Bizonyítás. Tetszőleges $x \in$ pontban

$$\begin{aligned} \exp'(x) &= \sum_{n=1}^{+\infty} n \cdot \frac{x^{n-1}}{n!} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} = (k := n-1) = \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^k}{k!} = \exp x. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Megjegyzés. Az \exp függvény deriváltja önmaga. ■

2^o A $\sin x := \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$ ($x \in \mathbb{R}$) függvény deriválható, és

$$\boxed{\sin'(x) = \cos x \quad (x \in \mathbb{R})}.$$

Bizonyítás. Tetszőleges $x \in$ pontban

$$\sin'(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n (2n+1) \frac{x^{2n}}{(2n+1)!} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} = \cos x. \quad \blacksquare$$

3° A $\cos x := \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$ ($x \in \mathbb{R}$) függvény deriválható, és

$$\boxed{\cos'(x) = -\sin x \quad (x \in \mathbb{R})}.$$


Bizonyítás. Tetszőleges $x \in$ pontban

$$\begin{aligned} \cos'(x) &= \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n (2n) \frac{x^{2n-1}}{(2n)!} = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} = (k := n-1) \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^{k+1} \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} = -\sin x. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Az inverz függvény deriválása.

Szemléletesen.

Tegyük fel, hogy az f függvény invertálható, és ábrázoljuk f és f^{-1} grafikonját egy olyan koordináta-rendszerben, amelynek tengelyein az egységek egyenlő hosszúak. Vegyük f grafikonjának egy (x, y) pontját, azaz legyen $y = f(x)$. Ekkor $f^{-1}(y) = x$, vagyis az (y, x) pont rajta van az f^{-1} függvény grafikonján. Ha egy pont két koordinátáját felcseréljük, akkor a pont tükörképét kapjuk meg a két tengely szögfelező egyenesére (vagyis az $y = x$ egyenletű egyenesre) vonatkozóan. Ez azt jelenti, hogy f és f^{-1} – geometriailag – egymás tükörképei a szóban forgó szögfelezőre vonatkozóan:



Az f grafikonjának egy $(a, f(a)) =: (a, b)$ pontját az $y = x$ egyenesre tükrözve kapjuk a (b, a) pontot. Mivel $a = f^{-1}(b)$, ezért a (b, a) pont rajta van az f^{-1} függvény grafikonján.

Az f grafikonjának $(a, f(a)) = (a, b)$ pontbeli érintőegyenesének tükörképe az f^{-1} függvény grafikonjának az $(f(a), a) = (b, a)$ pontbeli érintője. Ha az f -hez húzott érintő nem párhuzamos az x -tengellyel (vagyis $f'(a) \neq 0$), akkor a tükörképe nem párhuzamos az y -tengellyel. Ekkor a meredekségeik egymás reciprocai, vagyis

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}. \blacksquare$$

Tétel.

Legyen $I \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallum és $f: I \rightarrow \mathbb{R}$. Tegyük fel, hogy

- (a) f szigorúan monoton és folytonos I -n,*
- (b) egy $a \in I$ pontban $f \in D\{a\}$ és $f'(a) \neq 0$.*

Ekkor az f^{-1} inverz függvény deriválható a $b := f(a)$ pontban, és

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}.$$

Bizonyítás.

Először azt igazoljuk, hogy $b \in \text{int } \mathcal{D}_{f^{-1}} = \mathcal{R}_f$.

Valóban: (a) $\implies f$ invertálható, $\mathcal{R}_f = \mathcal{D}_{f^{-1}}$ nyílt intervallum és f^{-1} folytonos $\mathcal{D}_{f^{-1}}$ -en $\implies b = f(a) \in \text{int } \mathcal{D}_{f^{-1}}$.

Legyen $(y_n): \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{D}_{f^{-1}}$ olyan sorozat, amelyre $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = b$ és

$$x_n := f^{-1}(y_n) \quad (n \in \mathbb{N}) \quad (\text{így } f(x_n) = y_n).$$

Mivel $f^{-1} \in C\{b\} \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} f^{-1}(y_n) = f^{-1}(b) = a$.

Ekkor minden $n \in \mathbb{N}$ indexre

$$\frac{f^{-1}(y_n) - f^{-1}(b)}{y_n - b} = \frac{x_n - a}{f(x_n) - f(a)} = \frac{1}{\frac{f(x_n) - f(a)}{x_n - a}}.$$

A határértéket véve

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{f^{-1}(y_n) - f^{-1}(b)}{y_n - b} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\frac{f(x_n) - f(a)}{x_n - a}} \stackrel{\text{átviteli elv}}{=} \\ \stackrel{\text{átviteli elv}}{=} \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{\frac{f(x) - f(a)}{x - a}} = \frac{1}{f'(a)}.$$

A határértékre vonatkozó átviteli elv alapján

$$\exists (f^{-1})'(b) = \lim_{y \rightarrow b} \frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(b)}{y - b} = \frac{1}{f'(a)},$$

ezért $f^{-1} \in D\{b\}$ és $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}$. ■

Példák.

1^o A $g(x) := \sqrt{x}$ ($x \geq 0$) függvény deriválható minden $x \in (0, +\infty)$ pontban, és

$$g'(x) = (\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}} \quad (x > 0).$$

Bizonyítás. A g függvény az \mathbb{R}_0^+ halmazon szigorúan monoton növekedő $f(x) = x^2$ ($x \in \mathbb{R}$) függvény inverze:

$$g(x) = \sqrt{x} = f^{-1}(x) \quad (x \geq 0).$$

Mivel $f \in D$ és $f'(x) = 2x > 0$, ha $x > 0$, ezért minden $x > 0$ esetén $g \in D\{x\}$ és

$$g'(x) = (\sqrt{x})' = (f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))} = \frac{1}{2\sqrt{x}}. \blacksquare$$

2° Az $\ln := \exp^{-1}$ függvény minden $x \in \mathcal{D}_{\ln} = (0, +\infty)$ pontban deriválható, és

$$\ln' x = (\ln x)' = \frac{1}{x} \quad ((0, +\infty)).$$

Bizonyítás. Mivel $\exp \uparrow$, folytonos és deriválható $\mathcal{D}_{\exp} = \mathbb{R}$ -en, továbbá $\exp'(x) = \exp x \neq 0$ ($\forall x \in \mathbb{R}$), ezért minden $x \in \mathcal{D}_{\ln} = (0, +\infty)$ pontban $f \in D\{x\}$ és

$$\ln' x = (\ln x)' = \frac{1}{\exp'(\ln x)} = \frac{1}{\exp(\ln x)} = \frac{1}{x}. \blacksquare$$

Az óra anyaga

- 1 A derivált motivációja
- 2 A pontbeli derivált fogalma
- 3 A folytonosság és a derivált kapcsolata
- 4 Lineáris közelítés
- 5 Függvénygrafikon érintője
- 6 A deriváltfüggvény
- 7 Deriválási szabályok
- 8 Elemi függvények deriváltjai

8. Elemi függvények deriváltjai

Összefoglaló táblázat

Néhány további példa

- $x^\alpha := (e^{\ln x})^\alpha = e^{\alpha \cdot \ln x} \quad (x > 0, \alpha \in \mathbb{R}) \implies$

$$\underbrace{(x^\alpha)'} = \underbrace{(e^{\alpha \cdot \ln x})'} = e^{\alpha \cdot \ln x} \cdot \underbrace{\alpha \cdot \frac{1}{x}} = \underbrace{\alpha x^{\alpha-1}}.$$
- $(\exp_a)(x) := a^x := (e^{\ln a})^x = e^{x \cdot \ln a} \quad (x \in \mathbb{R}, a > 0) \implies$

$$\underbrace{(a^x)'} = \underbrace{(e^{x \cdot \ln a})'} = e^{x \cdot \ln a} \cdot \ln a = \underbrace{a^x \cdot \ln a}.$$
- $\log_a := (\exp_a)^{-1}, \text{ ha } 0 < a \neq 1 \implies \forall x > 0 \text{ esetén}$

$$\underbrace{(\log_a x)'} = \frac{1}{\exp'_a(\log_a x)} = \frac{1}{(\ln a) \cdot \exp_a(\log_a x)} = \frac{1}{\underbrace{x \ln a}}.$$

- $\operatorname{tg} := \frac{\sin}{\cos}$. Igazolni fogjuk, hogy $\cos x = 0 \iff x = \frac{\pi}{2} + k\pi \ (k \in \mathbb{Z}) \implies \mathcal{D}_{\operatorname{tg}} = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$

$$\begin{aligned} \underbrace{(\operatorname{tg} x)'} &= \left(\frac{\sin x}{\cos x} \right)' = \frac{\sin' x \cdot \cos x - \sin x \cdot \cos' x}{\cos^2 x} = \\ &= \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\underbrace{\cos^2 x}} \quad (x \in \mathcal{D}_{\operatorname{tg}}). \end{aligned}$$

- $\operatorname{ctg} := \frac{\cos}{\sin}$. Igazolni fogjuk, hogy $\sin x = 0 \iff x = k\pi \ (k \in \mathbb{Z}) \implies \mathcal{D}_{\operatorname{ctg}} = \mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$

$$\underbrace{(\operatorname{ctg} x)'} = -\frac{1}{\underbrace{\sin^2 x}} \quad (x \in \mathcal{D}_{\operatorname{ctg}}).$$