

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт прикладной математики и механики
Кафедра «Прикладная математика»

**ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ
«РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ЛИНЕЙНОГО
ПРОГРАММИРОВАНИЯ СИМПЛЕКС-МЕТОДОМ»
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ»**

Выполнили
студенты группы 3630102/70401

Зуев В. А.
Курова А. Н.
Мельникова А. Н.
Стоян А. С.

Руководитель
к. ф.-м. н., доц.

Родионова Елена Александровна

Санкт-Петербург
2020

1 Постановка задачи

1. Составить задачу линейного программирования следующего вида:
 - 4 переменные
 - 2 ограничения в виде равенств
 - 1 ограничение в виде неравенства со знаком \geq и одно со знаком \leq
 - 1 переменная имеет ограничение на знак.
2. Привести задачу к виду, необходимому для применения симплекс-метода.
3. Построить к данной задаче двойственную и также привести к виду, необходимому для применения симплекс-метода.
4. Решить обе задачи симплекс-методом с выбором начального приближения методом искусственного базиса.
5. Решить обе задачи методом перебора крайних точек.
6. Разработать схему восстановления прямой задачи по решению двойственной.

Алгоритмы, требуемые для решения задачи, реализовать в таком виде, чтобы их можно было использовать в качестве подпрограмм в следующих лабораторных работах.

2 Исследование применимости метода

3 Описание алгоритмов

Алгоритм симплекс-метода

1. Ввод: $x_0 [N]$
 $A [M, N]$
 $b [M]$
 $c [N]$
 N_k
 $B [N_0, M]$

где A, b, c - параметры задачи $c^T x \rightarrow \min, x \in S$,
 $S := \{x \geq 0 \mid Ax = b\}$
 $x_0 [N]$ - опорный вектор к множеству S
 N_0 - индексы базисных столбцов $x_0, N_0 \subset N$
 $B [N_0, M] : B [N_0, M] \cdot A [M, N_0] = E$

2. Введён $N_k^0 := \{i \in N_k \mid x_k[i] = 0\}$ (вначале $k=0, x_k = x_0, N_k = N_0$)
 $N_k^+ := \{i \in N_k \mid x_k[i] > 0\}$

$$bg := \left(\begin{array}{cccc} 1 & \dots & 1 & 1 \\ \vdots & & & \\ 1 & \underbrace{\left(bg_{i-1,j} + bg_{i,j-1} \right)}_{m - |N_k^+|} & & \end{array} \right) \Bigg\} |N_k^+|$$

- повернутый на 45° участок
 треугольника Паскаля. В каждой
 ячейке $bg_{ij} = C_i^j$, в левом нижнем
 углу $C^{m - |N_k^+|}_{|N_k^+|}$

3. В цикле для каждого $binom_idx$ от 0 до $C^{m - |N_k^+|}_{|N_k^+|}$:

3а. Ищем индексы $N_k \subset N, L_k \subset N : N = N_k \cup L_k ; N_k \supset N_k^+ ; N_k = m$;
 N_k отличается от N_{k-1} только одним индексом.

Для этого запускаем процедуру `subsetByIndex`, наложив её параметры

$$bg = bg, i = binom_idx, M = N \setminus N_k^+ = N_k^0$$

$$\text{Её результатом } \tilde{N}_k^0 \Rightarrow N_k := N_k^+ \cup \tilde{N}_k^0$$

$$L_k := N \setminus N_k$$

3б. Если определитель $\det [A [M, N_k]] = 0$, переходим к следующему 'binom_idx',
 т.к. текущие индексы не могут быть базисными индексами базисных столбцов 0.в.

3в. Если $binom_idx = 0$, нам известна $B [N_0, M]$. В ином случае ищем $B [N_k, M]$,
 отобразив на $U_{k-1} [N_{k-1}]$:

3.в.1. Положим $i_k :=$ "N-индекс в N_k , изменённый по сравнению с N_{k-1} "

3.6. II. Строим

$$F[N_k, N_{k-1}] := \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & -u_k[i_1]/u_k[i_k] & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & & 0 & \vdots & \vdots & & \vdots \\ & & \ddots & 1 & -u_k[j_{k-1}]/u_k[i_k] & 0 & & \vdots \\ & & & 0 & 1/u_k[i_k] & 0 & & \vdots \\ & & & 0 & -u_k[j_{k+1}]/u_k[i_k] & 1 & & \vdots \\ & & & \vdots & \vdots & 0 & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & -u_k[m]/u_k[i_k] & 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

3.8. III. $B[N_k, M] := F[N_k, N_{k-1}] \cdot B[N_{k-1}, M]$

3.2. Находим векторы

$$y_k[M] := B^T[N_k, M] \cdot c[N_k]$$

$$d_k[N] := c[N] - A^T[M, N] \cdot y_k[M]$$

3.9. Если $d_k[i] \geq 0 \quad \forall i \in L_k$, то x_k -решение (завершаем алгоритм).

3e. $j_k :=$ "первый индекс из L_k : $d_k[j_k] < 0$

$$u_k[N_k] := B[N_k, M] \cdot A[M, j_k]$$

3ж. Если $u_k[N_k]$ не содержит положительных компонент, останавливаем процесс: целевая функция $c^T[N] \cdot x[N]$ не ограничена снизу

3з. Если $N_k^+ = N_k$ (о.в. невырожденный) или $u_k[N_k \setminus N_k^+] \leq 0$:

3.3. I. $\theta_k := \min_{i \in N_k, u_k[i] > 0} \frac{x_k[i]}{u_k[i]}$

3.3. II. Дополним $u_k[N_k]$ до $u_k[N]$ так:

$$u_k[j_k] = -1$$

$$u_k[L_k \setminus j_k] := 0$$

$$x_{k+1}[N] := x_k[N] - \theta_k u_k[N]$$

3.3. III. Устанавливаем $k := k+1$ и переходим к шагу (2).

Вспомогательные процедуры

• Subset By Index:

1. Ввод: таблица бинарных коэффициентов

$$bg = \left[\begin{array}{c} 1 \dots 1 \\ \vdots \\ (bg_{ij}) \\ 1 \end{array} \right]_{k+1}^{n-k+1} \quad bg_{ij} = bg_{i,j} + bg_{i,j+1} \quad n \geq k$$

индекс $i \in \{0; C_n^k - 1\}$ - номер подмножества

упорядоченное мн-во (массив) эл-тов $M: |M| = n$

2. Обходим матрицу 'bg', начиная в левом нижнем углу. Объявим

$t := idx$

$i := n - k$

~~$j := k$~~

$res := \{\emptyset\}$

3. В цикле до тех пор, пока $j > 0$:

3.а. Если $t < bg[i, j-1]$:

3.а.1. добавляем $M_{[i+j-1]}$ в 'res'

3.а.2. $j := j - 1$ (переходим в клетку правее)

3.б. иначе:

3.б.1. $t := t - bg[i, j-1]$

$t := t - 1$

4. Возвращаем 'res'


• Пример работы:

~~$n = 5, k = 3, idx = 7$~~

$n = 5$

$k = 2$

$idx = 7$



Алгоритм выбора начального приближения

Вход: $\begin{cases} A[M, N] \\ b[M] \\ c[N] \end{cases}$ - параметры задачи $c^T[N] \cdot x[N] \rightarrow \min,$
 $x \in S := \{x[N] \geq 0 \mid A[M, N] \cdot x[N] = b[M]\}$

1. Строим $\bar{A} := (A[M, N] \mid E[M, M])$, где $E[M, M]$ - единичная матрица
 $\bar{c} := (\underbrace{0 \dots 0}_n \mid \underbrace{1 \dots 1}_m)$

2. Если $b[M]$ содержит отрицательные компоненты, умножаем соответствующие строки системы $(\bar{A} \mid \bar{b})$ на -1 .

3. Строим $\bar{x}_0 := \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ b[M] \end{pmatrix}^n$ - опорный вектор к $\bar{S} = \{\bar{x} \geq 0 \mid \bar{A}\bar{x} = \bar{b}\}$

$$\bar{b}_0 := E[M, M]$$

4.

4а. Решаем задачу $\min_{x \in \bar{S}} \bar{c}^T \cdot \bar{x}$ симплекс-методом.

Пусть решение - \bar{x}_* , а N_* - соответствующее множество индексов базисных столбцов \bar{A} .

$$x_* := \bar{x}_*[N], N_* := N_* \cap N$$

4б. Если $N_* = N_+ := \{i \mid x_*[i] > 0\}$, то x_* можно взять в качестве искомого начального приближения.

4в. Если $N_* \supset N_+$ ($x[N]$ - несовместный о.в.):

4в. I. Выделяем подмножество индексов $L := N \setminus N_+$

4в. II. Строим бинарную таблицу bd : в ~~левых~~^{правых} нижнем углу
табл $C_{|L|}^{|M|-|N_+|}$ (см. шаг (2) симплекс-метода).

4в. III. Повторяем шаг (3) алгоритма симплекс-метода, используя эту бинарную таблицу и индексы L в качестве множества индексов, которыми дополняем A_k .
Затем возвращаемся к (4б).

4 Результаты решения задачи

5 Оценка достоверности полученного результата