2.5 总结

张志聪

2025年8月10日

注释 1. 特殊 n 阶方阵的封闭性。

- (1) 对角矩阵。
 - 两个对角矩阵 A, B,又如下封闭性:
 - 加法封闭: A + B 也是对角矩阵;
 - 数乘封闭: kA 也是对角矩阵;
 - 乘法封闭: AB 也是对角矩阵。
 - 逆矩阵封闭: A 可逆,则 A^{-1} 也是对角矩阵(是上三角矩阵的特例)。
- (2) (反) 对称矩阵。

两个(反)对称矩阵 A, B, 又如下封闭性:

- 加法封闭: A + B 也是(反)对称矩阵;
- 数乘封闭: kA 也是(反)对称矩阵;
- 乘法有条件的封闭: 充分必要条件 "A, B 可交换, 即 AB = BA" (习题 16)。
- 逆矩阵封闭: A-1 也是(反)对称矩阵(习题 18-1)。
- (3) 上(下) 三角矩阵。

两个上(下)三角矩阵 A, B,又如下封闭性:

- 加法封闭: A + B 也是上(下)三角矩阵;

- 数乘封闭: kA 也是上(下)三角矩阵;
- 乘法封闭: AB 也是上(下)三角矩阵;
- 逆矩阵封闭: A 可逆, 则 A^{-1} 也是上(下)三角矩阵(习题 18-2)。

注释 2. Trace 具有一些优良的性质: 习题 23

注释 3. n 阶矩阵 A 通过初等变换化为 Y,已知 Y 存在逆矩阵 Y^{-1} ,那么 A^{-1} 与 Y^{-1} 的关系。

设 n 阶初等矩阵 P_1, P_2, \cdots, P_s ; Q_1, Q_2, \cdots, Q_t , 使

$$P_s \cdots P_2 P_1 A Q_1 Q_2 \cdots Q_t = Y$$

$$Q_t^{-1} \cdots Q_2^{-1} Q_1^{-1} A^{-1} P_1^{-1} P_2^{-1} \cdots P_s^{-1} = Y^{-1}$$

$$A^{-1} = Q_1 Q_2 \cdots Q_t Y^{-1} P_s \cdots P_2 P_1$$