

6.1

张志聪

2025 年 9 月 30 日

1

A 是 n 阶正定矩阵，所以 A 是对称矩阵。

• (1)

(i)

$$\begin{aligned}(k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2, \beta) &= (k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2)A\beta^T \\ &= k_1\alpha_1 A\beta^T + k_2\alpha_2 A\beta^T \\ &= k_1(\alpha_1, \beta) + k_2(\alpha_2, \beta)\end{aligned}$$

(ii)

$$\begin{aligned}(\beta, \alpha) &= [(\beta, \alpha)]^T \\ &= (\beta A\alpha^T)^T \\ &= \alpha A^T \beta^T \\ &= \alpha A \beta^T \\ &= (\alpha, \beta)\end{aligned}$$

注意，因为 (β, α) 是标量。

(iii) 因为 A 是正定矩阵，所以

$$(\alpha, \alpha) > 0 \quad (\forall \alpha \in \mathbb{R}^n, \alpha \neq 0)$$

且 (α, α) 当且仅当 $\alpha = 0$ 。

- (2)

因为 A

$$\begin{aligned} |(\alpha, \beta)| &\leq |\alpha| \cdot |\beta| \\ |\alpha A \beta^T| &\leq \sqrt{\alpha A \alpha^T} \cdot \sqrt{\beta A \beta^T} \end{aligned}$$

注意，不能写成对应坐标相乘在相加的形式，因为这里的 A 不一定是单位矩阵。

4

- 必要性

α, β 正交，于是

$$\begin{aligned} (\alpha + t\beta, \alpha + t\beta) &= (\alpha, \alpha) + 2t(\alpha, \beta) + t^2(\beta, \beta) \\ &= (\alpha, \alpha) + t^2(\beta, \beta) \\ &= |\alpha|^2 + t^2|\beta|^2 \\ &\geq |\alpha|^2 \end{aligned}$$

因为 $|\alpha| > 0$ ，所以

$$|(\alpha + t\beta, \alpha + t\beta)| \geq |\alpha|$$

- 充分性

反证法，假设 $(\alpha, \beta) \neq 0$ 。

由题设可知

$$\begin{aligned} |\alpha + t\beta| &\geq |\alpha| \\ (\alpha, \alpha) + 2t(\alpha, \beta) + t^2(\beta, \beta) &\geq (\alpha, \alpha) \\ (\beta, \beta)t^2 + 2(\alpha, \beta)t &\geq 0 \end{aligned}$$

右端是关于 t 的二次多项式，于是判别式为

$$\Delta = 4(\alpha, \beta)^2 > 0$$

于是有个实数根，它在两个实数根之间函数值为负，出现矛盾。

5

- (1)

我们有

$$\begin{aligned} |\alpha + \beta|^2 &= (\alpha + \beta, \alpha + \beta) \\ &= (\alpha, \alpha) + 2(\alpha, \beta) + (\beta, \beta) \\ &= |\alpha|^2 + 2(\alpha, \beta) + |\beta|^2 \end{aligned}$$

利用命题 1.1 的不等式，我们有

$$2|(\alpha, \beta)| \leq 2|\alpha||\beta|$$

于是

$$|\alpha + \beta|^2 \leq |\alpha|^2 + 2|\alpha||\beta| + |\beta|^2 = (|\alpha| + |\beta|)^2$$

这表明

$$|\alpha + \beta| \leq |\alpha| + |\beta|$$

- (2)

利用 (1)

$$\begin{aligned} |\alpha - \gamma| &= |\alpha + \beta - \beta - \gamma| \\ &= |\alpha - \beta + \beta - \gamma| \\ &\leq |\alpha - \beta| + |\beta - \gamma| \end{aligned}$$

这表明

$$d(\alpha, \gamma) \leq d(\alpha, \beta) + d(\beta, \gamma)$$

6

提示：利用命题 1.5 的证明思想，得到 $L(\alpha, \beta, \gamma)$ 的正交补。

7

- (1)

设

$$\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_n\alpha_n$$

于是

$$\begin{aligned}(\beta, \beta) &= (\beta, k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_n\alpha_n) \\&= k_1(\beta, \alpha_1) + k_2(\beta, \alpha_2) + \cdots + k_n(\beta, \alpha_n) \\&= 0\end{aligned}$$

所以, $\beta = 0$ 。

- (2)

我们有

$$\begin{aligned}(\beta_1, \alpha_i) &= (\beta_2, \alpha_i) \\(\beta_1, \alpha_i) - (\beta_2, \alpha_i) &= 0 \\(\beta_1 - \beta_2, \alpha_i) &= 0\end{aligned}$$

由 (1) 可知

$$\begin{aligned}\beta_1 - \beta_2 &= 0 \\ \beta_1 &= \beta_2\end{aligned}$$

15

- 必要性

由于 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性无关, 令 $M = L(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s)$, 于是 M 是 V 的线性子空间。 (α, β) 是 M 内一个对称双线性函数, 又因为 M 是有限维线性空间, 所以 (α, α) 是一个正定二次型函数, 即 (α, β) 在 M 内的任一组基下的矩阵是正定矩阵。所以 $|D| > 0$ 。

- 充分性

反证法, 假设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关, 即存在不全为 0 的 k_1, k_2, \dots, k_s , 使得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s = 0$$

令

$$x = \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ s \end{bmatrix}$$

考虑 D 的任意一个行向量 D_i , 我们有

$$\begin{aligned} D_i x &= (\alpha_i, \alpha_1)k_1 + (\alpha_i, \alpha_2)k_2 + \dots + (\alpha_i, \alpha_s)k_s \\ &= (\alpha_i, k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s) \\ &= (\alpha_i, 0) \\ &= 0 \end{aligned}$$

于是

$$Dx = 0$$

因为 $x \neq 0$, 这与 $\det(D) \neq 0$ 矛盾。

17

设

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

于是

$$\begin{aligned}
 A^T A &= \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} a_{11}^2 & a_{11}a_{12} & \cdots & a_{11}a_{1n} \\ a_{12}a_{11} & a_{12}^2 + a_{22}^2 & \cdots & a_{12}a_{1n} + a_{22}a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n}a_{11} & a_{1n}a_{21} + a_{2n}a_{22} & \cdots & a_{1n}^2 + a_{2n}^2 + \cdots + a_{nn}^2 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

考虑第一行，

$$\begin{aligned}
 a_{11} &= \pm 1 \\
 a_{1i} &= 0 (i = 2, 3, \cdots, n)
 \end{aligned}$$

逐行往下，命题得证。

18

$|A| \neq 0$ ，所以 A 是满秩的， A 的列向量可以看做欧式空间 \mathbb{R}^n 的一组基。

由命题 1.4 可知，正交矩阵 Q 可以看做欧式空间 \mathbb{R}^n 的一组标准正交基。而施密特正交化方法可以让 A 化为一组标准正交基。

为了讨论的方便，符号与教科书中保持一致 (P9)。即 A 的列向量组设为

$$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$$

Q 的列向量组设为

$$\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n$$

于是, 我们有

$$\begin{aligned}\alpha_1 &= |\epsilon'_1| \epsilon_1 \\ \alpha_2 &= \frac{(\alpha_2, \epsilon'_1)}{(\epsilon'_1, \epsilon'_1)} |\epsilon'_1| \epsilon_1 + |\epsilon'_2| \epsilon_2 \\ \alpha_3 &= \frac{(\alpha_3, \epsilon'_1)}{(\epsilon'_1, \epsilon'_1)} |\epsilon'_1| \epsilon_1 + \frac{(\alpha_3, \epsilon'_2)}{(\epsilon'_2, \epsilon'_2)} |\epsilon'_2| \epsilon_2 + |\epsilon'_3| \epsilon_3 \\ &\vdots \\ \alpha_n &= \frac{(\alpha_n, \epsilon'_1)}{(\epsilon'_1, \epsilon'_1)} |\epsilon'_1| \epsilon_1 + \frac{(\alpha_n, \epsilon'_2)}{(\epsilon'_2, \epsilon'_2)} |\epsilon'_2| \epsilon_2 + \dots + |\epsilon'_n| \epsilon_n\end{aligned}$$

令

$$T = \begin{bmatrix} |\epsilon'_1| & \frac{(\alpha_2, \epsilon'_1)}{(\epsilon'_1, \epsilon'_1)} |\epsilon'_1| & \frac{(\alpha_3, \epsilon'_1)}{(\epsilon'_1, \epsilon'_1)} |\epsilon'_1| & \frac{(\alpha_n, \epsilon'_1)}{(\epsilon'_1, \epsilon'_1)} |\epsilon'_1| \\ 0 & |\epsilon'_2| & \frac{(\alpha_3, \epsilon'_2)}{(\epsilon'_2, \epsilon'_2)} |\epsilon'_2| & \frac{(\alpha_n, \epsilon'_2)}{(\epsilon'_2, \epsilon'_2)} |\epsilon'_2| \\ 0 & 0 & |\epsilon'_3| & \frac{(\alpha_n, \epsilon'_3)}{(\epsilon'_3, \epsilon'_3)} |\epsilon'_3| \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & |\epsilon'_n| \end{bmatrix}$$

综上,

$$A = QT$$