# 2章总结

## 张志聪

## 2025年8月2日

### 注释 1. 特殊 n 阶方阵的封闭性。

- (1) 对角矩阵。
  - 两个对角矩阵 A, B,又如下封闭性:
    - 加法封闭: A+B 也是对角矩阵;
    - 数乘封闭: kA 也是对角矩阵;
    - 乘法封闭: AB 也是对角矩阵。
    - 逆矩阵封闭: A 可逆,则  $A^{-1}$  也是对角矩阵(是上三角矩阵的特例)。
- (2) (反) 对称矩阵。

两个(反)对称矩阵 A, B, 又如下封闭性:

- 加法封闭: A + B 也是(反)对称矩阵;
- 数乘封闭: kA 也是(反)对称矩阵;
- 乘法有条件的封闭: 充分必要条件 "A, B 可交换, 即 AB = BA" (习题 16)。
- 逆矩阵封闭: A-1 也是(反)对称矩阵(习题 18-1)。
- (3) 上(下) 三角矩阵。

两个上(下)三角矩阵 A, B,又如下封闭性:

- 加法封闭: A + B 也是上(下)三角矩阵;

- 数乘封闭: kA 也是上(下)三角矩阵;
- 乘法封闭: AB 也是上(下)三角矩阵;
- 逆矩阵封闭: A 可逆,则  $A^{-1}$  也是上(下)三角矩阵(习题 18-2)。

### 注释 2. 打洞技巧:

给定数域 K 上的 n 阶分块矩阵

$$M = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$$

其中  $A \in k$  阶可逆方阵, 通过初等变换得到

$$\begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & * \end{bmatrix}$$

求初等变换对应的初等矩阵。

先考虑数值矩阵的情况,

$$M = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

通过行变换,第二行加上第一行的  $-\frac{c}{a}$  倍,把 c 消为 0,

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{c}{a} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & d - \frac{bc}{a} \end{bmatrix}$$

通过列变换,第二列加上第一列的  $-\frac{b}{a}$  被,把 b 消为 0,

$$\begin{bmatrix} a & b \\ 0 & d - \frac{bc}{a} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{b}{a} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & d - \frac{bc}{a} \end{bmatrix}$$

即

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{c}{a} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{b}{a} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & d - \frac{bc}{a} \end{bmatrix}$$

相应的可得

$$\begin{bmatrix} E_k & 0 \\ -CA^{-1} & E_{n-k} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_k & -A^{-1}B \\ 0 & E_{n-k} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & D - CA^{-1}B \end{bmatrix}$$