

注释 17.4

张志聪

2026 年 2 月 3 日

说明 1. 多元函数的偏导数的四则运算:

设 $f, g : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, 且在点 $x(x_1, x_2, \dots, x_n) \in U$ 可微。则我们有

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial x_i}(f \pm g)(x) &= \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) \pm \frac{\partial g}{\partial x_i}(x) \\ \frac{\partial}{\partial x_i}(fg)(x) &= f(x) \frac{\partial g}{\partial x_i}(x) + g(x) \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) \\ \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{f}{g} \right)(x) &= \frac{g(x) \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) - f(x) \frac{\partial g}{\partial x_i}(x)}{[g(x)]^2}\end{aligned}$$

证明:

以乘法为例

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial x_1}(fg)(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(fg)(x_1 + h, \dots, x_n) - (fg)(x_1, \dots, x_n)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1 + h, \dots, x_n)g(x_1 + h, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_n)g(x_1, \dots, x_n)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1 + h, \dots, x_n)g(x_1 + h, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_n)g(x_1 + h, \dots, x_n)}{h} \\ &\quad + \frac{f(x_1, \dots, x_n)g(x_1 + h, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_n)g(x_1, \dots, x_n)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1 + h, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_n)}{h} g(x_1 + h, \dots, x_n) \\ &\quad + \frac{g(x_1 + h, \dots, x_n) - g(x_1, \dots, x_n)}{h} f(x_1, \dots, x_n) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1 + h, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_n)}{h} g(x_1 + h, \dots, x_n) \\ &\quad + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x_1 + h, \dots, x_n) - g(x_1, \dots, x_n)}{h} f(x_1, \dots, x_n)\end{aligned}$$

因为 f, g 在 x 处可微, 所以在 x 处连续, 于是可得

$$\begin{aligned} & \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1 + h, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_n)}{h} g(x_1 + h, \dots, x_n) \\ & + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x_1 + h, \dots, x_n) - g(x_1, \dots, x_n)}{h} f(x_1, \dots, x_n) \\ & = g(x) \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) + f(x) \frac{\partial g}{\partial x_i}(x) \end{aligned}$$

说明 2. $f_{xy}(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 连续, 则存在 (x_0, y_0) 的领域 U , 对任意 $(x, y) \in U$, f 有定义。

证明:

按照偏导数 f_{xy} 的定义:

$$f_{xy}(x_0, y_0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f_x(x_0, y_0 + \Delta y) - f_x(x_0, y_0)}{\Delta y}$$

可知偏导数 f_x 在 y_0 的某个领域内有定义。同理, 按照 f_x 的定义:

$$f_x(x_0, y_0 + \Delta y) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0 + \Delta y)}{\Delta x}$$

可知对每个充分小的 Δy , f 在 $(x_0, y_0 + \Delta y)$ 在 x_0 的某个领域内有定义;

综上, f 在 (x_0, y_0) 的某个领域内有定义;

说明 3. $f_{xy}(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的邻域上有定义, 且在 (x_0, y_0) 处连续, 则存在 (x_0, y_0) 的领域 U , 对任意 $(x, y) \in U$, $f_x(x, y)$ 存在。

证明:

由题设可知, 存在 (x_0, y_0) 的领域 U , 使得 f_{xy} 在 U 内每一个点都有定义;

对任意 $(x_1, y_1) \in U$, 由偏导数的定义, 我们有

$$f_{xy}(x_1, y_1) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f_x(x_1, y_1 + \Delta y) - f_x(x_1, y_1)}{\Delta y}$$

所以 $f_x(x_1, y_1)$ 存在, 命题成立。

说明 4. 命题

设 $z = f(x, y), x = \varphi(s, t), y = \psi(s, t)$, 若函数 f, φ, ψ 都具有连续的二阶偏导数, 则 z 对 s, t 同样存在二阶连续偏导数。

说明 5. 为什么

D 是矩形区域 $[a, b] \times [c, d]$, 那就不能保证对 D 上的任意两点 P, Q 都有 (8) 是成立。

证明: 因为如果 P, Q 都在同一条边上, 则 PQ 线段上的点都是边界点, 由书中的“注”可知 (8) 式不成立。

说明 6. 证明: 定理 17.8 (中值定理) 推论。

证明:

todo

说明 7. 定理 17.9 (泰勒定理) 证明中使用了如下命题:

$f(x, y)$ 在某领域内有 $n + 1$ 阶连续偏导数, $x = \phi(s, t), y = \psi(s, t)$ 也有 $n + 1$ 阶连续偏导数, 于是 $F(s, t) = f(\phi(s, t), \psi(s, t))$ 也在该领域内有 $n + 1$ 阶连续偏导数。

证明:

用归纳法进行证明, 由命题 17.5 可知, $F(s, t)$ 是可微的, 且 $F(s, t)$ 的一阶偏导数是连续函数;

归纳假设 $F(s, t)$ 的 n 阶偏导数是连续的,

说明 8. 证明: 定理 17.10 (极值必要条件)

证明: 以 $f_x(x_0, y_0) = 0$ 为例。

反证法, 假设 $f_x(x_0, y_0) \neq 0$, 不妨设 $f_x > 0$, 由偏导数的定义可知

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x} = f_x(x_0, y_0) > 0$$

由保号性可知，存在 $\delta > 0$ ， $0 < \Delta x < \delta$ 时，有

$$\frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x} > 0$$

$$f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0) > 0$$

$$f(x_0 + \Delta x, y_0) > f(x_0, y_0)$$

这与 $f(x_0, y_0)$ 是极值点矛盾。