

## 5.3 文中的为什么

2024 年 5 月 23 日

$$1. -LIM_{n \rightarrow \infty} a_n = LIM_{n \rightarrow \infty} (-a_n)$$

证明:

由实数负运算的定义可知,

$$\begin{aligned} -LIM_{n \rightarrow \infty} a_n &= (-1) \times LIM_{n \rightarrow \infty} a_n \\ &= LIM_{n \rightarrow \infty} -1 \times LIM_{n \rightarrow \infty} a_n \\ &= LIM_{n \rightarrow \infty} (-a_n) \end{aligned} \quad \text{【实数乘法定义】}$$

2. 序列  $0.1, 0.01, 0.001, \dots$  等价于零序列  $(0)_{n=1}^{\infty}$

证明:

其实序列  $0.1, 0.01, 0.001, \dots$  就是  $(\frac{1}{n})_{n=1}^{\infty}$ , 对任意有理数  $\epsilon > 0$ , 当  $N \geq \frac{1}{\epsilon}$  (有命题 4.4.1 保证  $N$  是存在的), 使得对所有  $n \geq N$  有,

$$|1/n - 0| = 1/n \leq \epsilon$$

所以序列  $0.1, 0.01, 0.001, \dots$  与零序列  $(0)_{n=1}^{\infty}$  对任意  $\epsilon$  是最终  $\epsilon$ - 接近的, 所以两者是等价的。

3. 如何推导?

证明:

这里要先证明, 有理数  $x, y$  具有以下性质  $|x| - |y| \leq |x - y|$ 。

$x = x - y + y$ , 然后由命题 4.3.3 (b) (绝对值的三角不等式) 可知,

$$\begin{aligned} |x| &\leq |x - y| + |y| \\ |x| - |y| &\leq |x - y| \end{aligned} \quad \text{【命题 4.2.9 (d)】}$$

于是性质  $|x| - |y| \leq |x - y|$  得证。

利用刚才的性质，可得，

$$\begin{aligned} |b_{n_0}| - |b_n| &\leq |b_{n_0} - b_n| \\ |b_{n_0}| - |b_n| &\leq \frac{1}{2}\epsilon \\ \epsilon &\leq |b_{n_0}| \leq \frac{1}{2}\epsilon + |b_n| \\ \epsilon &\leq \frac{1}{2}\epsilon + |b_n| \\ \frac{1}{2}\epsilon &\leq |b_n| \end{aligned}$$

4.  $xx^{-1} = x^{-1}x = 1$  为什么？

不妨设  $x = LIM_{n \rightarrow \infty} a_n$ ，那么由定义 5.3.16（实数的倒数）可知  $x^{-1} = LIM_{n \rightarrow \infty} a_n^{-1}$ ，所以，

$$\begin{aligned} x^{-1}x &= LIM_{n \rightarrow \infty} a_n^{-1} \times LIM_{n \rightarrow \infty} a_n \\ &= LIM_{n \rightarrow \infty} a_n^{-1} a_n \\ &= LIM_{n \rightarrow \infty} 1 \\ &= 1 \end{aligned}$$

同时，

$$\begin{aligned} xx^{-1} &= LIM_{n \rightarrow \infty} a_n \times LIM_{n \rightarrow \infty} a_n^{-1} \\ &= LIM_{n \rightarrow \infty} a_n a_n^{-1} \\ &= LIM_{n \rightarrow \infty} 1 \\ &= 1 \end{aligned}$$

所以  $xx^{-1} = x^{-1}x = 1$