

## 10.1 习题

张志聪

2024 年 12 月 9 日

### 10.1.1

(1)  $f$  在  $x_0$  处可微分, 由定义 10.1.1 可知, 极限

$$\lim_{x \rightarrow x_0; x \in X \setminus \{x_0\}} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

是存在的, 不妨设极限是  $L$ 。由定义 9.3.6 可知, 对任意  $\epsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 使得

$$\left| \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - L \right| \leq \epsilon$$

对任意  $x \in ((x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap X \setminus \{x_0\})$  均成立。

任意  $y \in ((x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap Y \setminus \{x_0\})$ , 因为  $Y \subset X$ , 所以  $y \in ((x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap X \setminus \{x_0\})$ , 所以

$$\left| \frac{f(y) - f(x_0)}{y - x_0} - L \right| \leq \epsilon$$

由定义 9.3.6 可知,

$$\lim_{y \rightarrow x_0; y \in Y \setminus \{x_0\}} \frac{f|_Y(y) - f|_Y(x_0)}{y - x_0}$$

的极限存在, 所以  $f|_Y$  在  $x_0$  处可微。

(2) 与 10.1.2 不矛盾的原因:

点 3 不是  $[1, 2] \cup \{3\}$  的极限点, 不满足习题 10.1.1 习题的前置条件。

## 10.1.2

- (a)  $\implies$  (b)

$f$  在  $X$  中的  $x_0$  处是可微的, 且导数为  $L$ , 由定义 10.1.1 可知, 极限

$$\lim_{x \rightarrow x_0; x \in X \setminus \{x_0\}} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = L$$

于是, 由定义 9.3.6 可知, 对任意  $\epsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 使得

$$\left| \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - L \right| \leq \epsilon$$

对  $|x - x_0| < \delta, x \in X \setminus \{x_0\}$  均成立。

对上式进行算术运算,

$$\begin{aligned} \left| \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - L \right| &\leq \epsilon \\ \left| \frac{f(x) - f(x_0) - L(x - x_0)}{x - x_0} \right| &\leq \epsilon \\ |f(x) - f(x_0) - L(x - x_0)| &\leq \epsilon |x - x_0| \\ |f(x) - (f(x_0) + L(x - x_0))| &\leq \epsilon |x - x_0| \end{aligned}$$

- (b)  $\implies$  (a)

直接进行算术运算, 略

## 10.1.3