

## 14.1 习题

张志聪

2025 年 3 月 8 日

### 14.1.1

修改下证明顺序。

(1) 如果极限  $\lim_{x \rightarrow x_0; x \in E} f(x)$  存在, 那么它一定等于  $f(x_0)$ 。

反证法, 假设  $\lim_{x \rightarrow x_0; x \in E} f(x) = L, L \neq f(x_0)$ 。因为极限  $\lim_{x \rightarrow x_0; x \in E} f(x) = L$  可知, 设  $0 < \epsilon < d_Y(f(x_0), L)$ , 存在  $\delta > 0$ , 使得只要  $x \in E$  满足  $d_X(x, x_0) < \delta$ , 就有  $d_Y(f(x), L) < \epsilon$ 。因为  $x_0 \in E, d_X(x_0, x_0) = 0 < \delta$ , 即  $x = x_0$  时  $d_Y(f(x), L) > \epsilon$ , 存在矛盾。

(2) 证明: 极限  $\lim_{x \rightarrow x_0; x \in E} f(x)$  存在, 当且仅当极限  $\lim_{x \rightarrow x_0; x \in E \setminus \{x_0\}} f(x)$  存在且等于  $f(x_0)$ 。

•  $\Rightarrow$

极限  $\lim_{x \rightarrow x_0; x \in E} f(x)$  存在, 按照定义 14.1.1 可知, 极限  $\lim_{x \rightarrow x_0; x \in E \setminus \{x_0\}} f(x)$  存在。接下来, 需要证明  $\lim_{x \rightarrow x_0; x \in E \setminus \{x_0\}} f(x) = f(x_0)$ 。

反证法, 假设  $\lim_{x \rightarrow x_0; x \in E \setminus \{x_0\}} f(x) = L, f(x_0) \neq L$ 。

由 (1) 可知,  $\lim_{x \rightarrow x_0; x \in E} f(x) = f(x_0)$ 。

那么, 设  $\epsilon = \frac{1}{2}d_Y(f(x_0), L)$ , 存在  $\delta' > 0$ , 使得只要  $x \in E$  满足  $d_X(x, x_0) < \delta'$ , 就有  $d_Y(f(x), f(x_0)) < \epsilon$ 。

存在  $\delta'' > 0$ , 使得只要  $x \in E$  满足  $0 < d_X(x, x_0) < \delta''$ , 就有  $d_Y(f(x), L) < \epsilon$

综上, 取  $\delta = \min(\delta', \delta'')$ , 使得只要  $x \in E$  满足  $0 < d_X(x, x_0) < \delta$ ,

就有

$$\begin{cases} d_Y(f(x), f(x_0)) < \epsilon \\ d_Y(f(x), L) < \epsilon \end{cases}$$

于是可得

$$d_Y(f(x_0), L) \leq d_Y(f(x), f(x_0)) + d_Y(f(x), L) < d_Y(f(x_0), L)$$

存在矛盾。

•  $\Leftarrow$

按照定义 14.1.1 可以直接证明，具体过程略。

## 14.1.2

• (a)  $\Leftrightarrow$  (b)

与定理 13.1.4 证明相似，不做赘述。

• (a)  $\implies$  (c)

因为  $V$  是开集且  $L \in V$ ，所以存在  $r > 0$  使得  $B_{(Y, d_Y)}(L, r) \subseteq V$ 。因为 (a) 成立，所以存在  $\delta > 0$  使得只要  $x \in E$  满足  $d_X(x, x_0) < \delta$ ，就有  $d_Y(f(x), L) < r$ 。

令  $U := B_{(X, d_X)}(x_0, \delta)$ ,  $U \subset X$ 。对任意  $x \in U \cap E$ ，都有  $x \in E$  且  $d_X(x, x_0) < \delta$ ，于是  $d_Y(f(x), L) < r$ ，即  $f(x) \in B_{(Y, d_Y)}(L, r) \subseteq V$ 。所以， $f(U \cap E) \subseteq V$ 。

• (c)  $\implies$  (a)

设  $(x^{(n)})_{n=1}^\infty$  是  $E$  中依度量  $d_X$  收敛于  $x_0$  的序列。任意  $\epsilon > 0$ ，令  $V := B_{(Y, d_Y)}(L, \epsilon)$ ，由 (c) 可知，存在一个包含  $x_0$  的开集  $U \subset X$ ，使得  $f(U \cap E) \subseteq V$ 。

因为  $U$  是开集，所以存在  $\delta > 0$  使得  $B_{(X, d_X)}(x_0, \delta) \subseteq U$ 。序列  $(x^{(n)})_{n=1}^\infty$  是  $E$  中依度量  $d_X$  收敛于  $x_0$  的序列，所以存在  $N \geq 1$  使得

$$d_X(x_0, x^{(n)}) < \delta$$

对所有的  $n \geq N$  均成立。

于是对  $n \geq N$ , 有  $x^{(n)} \in B_{(X, d_X)}(x_0, \delta) \subseteq U, x^{(n)} \in E$ , 此时,

$$f(x^{(n)}) \in V$$

即, 对任意  $n \geq N$  都有

$$d_Y(f(x^{(n)}), L) < \epsilon$$

由  $\epsilon$  的任意性可知,  $(f(x^{(n)}))_{n=1}^{\infty}$  收敛于  $L$ 。

• (a)  $\implies$  (d)

(a) 成立, 那么, 对任意  $\epsilon > 0$ , 都存在  $\delta > 0$  使得只要  $x \in E$  满足  $d_X(x, x_0) < \delta$ , 就有  $d_Y(f(x), L) < \epsilon$ 。因为  $x \in E \setminus \{x_0\}$  时  $g(x) = f(x)$ , 所以, 以上性质函数  $g$  也成立。

现在只需再额外考虑  $x = x_0$  是否满足定义要求即可。 $d_X(x_0, x_0) = 0 < \delta$ , 此时

$$d_Y(g(x), L) = d_Y(g(x_0), L) = d_Y(L, L) = 0 < \epsilon$$

于是可得

$$\lim_{x \rightarrow x_0; x \in E \cup \{x_0\}} g(x) = L = g(x_0)$$

所以,  $g$  在  $x_0$  处是连续的。

特别地,  $x \in E$ , 由习题 14.1.1 可知  $f(x_0) = L$ 。

• (d)  $\implies$  (a)

如果  $x_0 \notin E$ , 则  $E \setminus \{x_0\} = E$ , 由  $g$  在  $x_0$  处连续, 我们有

$$\lim_{x \rightarrow x_0; x \in E \setminus \{x_0\}} g(x) = \lim_{x \rightarrow x_0; x \in E} g(x) = \lim_{x \rightarrow x_0; x \in E} f(x) = g(x_0) = L$$

如果  $x_0 \in E$ , 由  $g$  在  $x_0$  处连续, 我们有

$$\lim_{x \rightarrow x_0; x \in E \setminus \{x_0\}} g(x) = \lim_{x \rightarrow x_0; x \in E \setminus \{x_0\}} f(x) = g(x_0) = f(x_0)$$

利用习题 14.1.1 可知,

$$\lim_{x \rightarrow x_0; x \in E} f(x) = f(x_0)$$