

## 19.3 习题

张志聪

2025 年 6 月 5 日

### 19.3.1

我们有

$$\left| \int_{\Omega} f \right| = \left| \int_{\Omega} f^+ - \int_{\Omega} f^- \right|$$

因为  $\int_{\Omega} f^+, \int_{\Omega} f^-$  都是非负的有限实数, 运用实数的三角不等式, 我们有

$$\left| \int_{\Omega} f^+ - \int_{\Omega} f^- \right| \leq \int_{\Omega} f^+ + \int_{\Omega} f^-$$

综上所述可得

$$\left| \int_{\Omega} f \right| \leq \int_{\Omega} f^+ + \int_{\Omega} f^-$$

利用引理 19.2.10, 我们有

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} |f| &= \int_{\Omega} f^+ + f^- \\ &= \int_{\Omega} f^+ + \int_{\Omega} f^- \end{aligned}$$

所以, 综上所述

$$\left| \int_{\Omega} f \right| \leq \int_{\Omega} f^+ + \int_{\Omega} f^- = \int_{\Omega} |f|$$

### 19.3.2

- (a)

$f$  是绝对可积函数, 即  $\int_{\Omega} |f| < \infty$  是有限的, 于是由命题 19.2.6 可知,

$$\begin{aligned}\int_{\Omega} |cf| &= \int_{\Omega} |c||f| \\ &= |c| \int_{\Omega} |f| < \infty\end{aligned}$$

所以,  $cf$  也是绝对可积函数。

–  $c = 0$

于是  $cf = 0$ , 易得

$$\int_{\Omega} cf = 0 = c \int_{\Omega} f$$

–  $c > 0$

于是由定义 19.3.2 和命题 19.2.6(b) 可知,

$$\begin{aligned}\int_{\Omega} cf &= \int_{\Omega} (cf)^+ - \int_{\Omega} (cf)^- \\ &= \int_{\Omega} cf^+ - \int_{\Omega} cf^- \\ &= c \int_{\Omega} f^+ - c \int_{\Omega} f^- \\ &= c \int_{\Omega} f\end{aligned}$$

–  $c < 0$

此时, 我们有

$$(cf)^+ = |c|f^-$$

$$(cf)^- = |c|f^+$$

于是由定义 19.3.2 和命题 19.2.6(b) 可知,

$$\begin{aligned}
 \int_{\Omega} cf &= \int_{\Omega} (cf)^+ - \int_{\Omega} (cf)^- \\
 &= \int_{\Omega} |c|f^- - \int_{\Omega} |c|f^+ \\
 &= |c| \int_{\Omega} f^- - |c| \int_{\Omega} f^+ \\
 &= |c| \left( \int_{\Omega} f^- - \int_{\Omega} f^+ \right) \\
 &= |c| \left( - \int_{\Omega} f \right) \\
 &= c \int_{\Omega} f
 \end{aligned}$$

综上所述可得

$$\int_{\Omega} cf = c \int_{\Omega} f$$

• (b)

我们有

$$\begin{aligned}
 \int_{\Omega} |f| &< \infty \\
 \int_{\Omega} |g| &< \infty
 \end{aligned}$$

对任意  $x \in \Omega$ , 我们有

$$|(f+g)(x)| = |f(x) + g(x)| \leq |f(x)| + |g(x)|$$

即

$$|f+g| \leq |f| + |g|$$

于是利用 19.2.6(c) 可得

$$\int_{\Omega} |f+g| \leq \int_{\Omega} |f| + \int_{\Omega} |g| < \infty$$

所以,  $f+g$  是绝对可积函数。

(2)

我们有

$$f + g = (f + g)^+ - (f + g)^- \quad (1)$$

$$f + g = (f^+ - f^-) + (g^+ - g^-) \quad (2)$$

由 (1)(2) 可得

$$(f + g)^+ + f^- + g^- = (f + g)^- + f^+ + g^+$$

因为等式两边都是非负可测函数，利用引理 19.2.10 可得

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} (f + g)^+ + f^- + g^- &= \int_{\Omega} (f + g)^- + f^+ + g^+ \\ \int_{\Omega} (f + g)^+ + \int_{\Omega} f^- + \int_{\Omega} g^- &= \int_{\Omega} (f + g)^- + \int_{\Omega} f^+ + \int_{\Omega} g^+ \\ \int_{\Omega} (f + g)^+ - \int_{\Omega} (f + g)^- &= \int_{\Omega} f^+ - \int_{\Omega} f^- + \int_{\Omega} g^+ - \int_{\Omega} g^- \\ \int_{\Omega} (f + g) &= \int_{\Omega} f + \int_{\Omega} g \end{aligned}$$

• (c)

因为  $f(x) \leq g(x)$ ，于是可得

$$f^+(x) \geq g^+(x)$$

$$f^-(x) \leq g^-(x)$$

所以

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} f^+ - \int_{\Omega} f^- &\leq \int_{\Omega} g^+ - \int_{\Omega} g^- \\ &\implies \end{aligned}$$

$$\int_{\Omega} f \leq \int_{\Omega} g$$

• (d)

由命题 19.2.6(d) 可知，

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} f^+ &= \int_{\Omega} g^+ \\ \int_{\Omega} f^- &= \int_{\Omega} g^- \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}\int_{\Omega} f^+ + \int_{\Omega} f^- &= \int_{\Omega} g^+ + \int_{\Omega} g^- \\ &\implies \\ \int_{\Omega} f &= \int_{\Omega} g\end{aligned}$$