

15.2 习题

张志聪

2025 年 4 月 1 日

15.2.1

- $0 \leq k \leq n$ 时。

对 k 采用归纳法。

归纳基始 $k = 0$, $c \frac{n!}{(n-0)!} (x-a)^{n-0} = c(x-a)^n = f(x)$, 这与 $f^{(0)}(x) = f(x)$ 一致。

归纳假设 $k = j$ 是命题成立。

$k = j + 1$ 时,

$$\begin{aligned} f^{(j+1)}(x) &= (f^{(j)}(x))' \\ &= \left(c \frac{n!}{(n-j)!} (x-a)^{n-j} \right)' \\ &= c \frac{n!}{(n-j)!} (n-j)(x-a)^{n-j-1} \\ &= c \frac{n!}{(n-(j+1))!} (n-j)(x-a)^{n-(j+1)} \end{aligned}$$

- $k > n$ 时。

由之前的讨论可知,

$$\begin{aligned} f^{(n)}(x) &= c \frac{n!}{(n-n)!} (x-a)^{n-n} \\ &= cn! \end{aligned}$$

于是可得 $k > n$ 时, $f^{(k)}(x) = 0$ 。

15.2.2

对任意 $a \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$, 定义级数如下

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{1-a}\right)^{n+1} (x-a)^n$$

接下来我们证明该级数一致收敛于某个函数, 并逐点收敛于 f , 由一致收敛与逐点收敛的函数相同, 证明该级数一致收敛于 f 。

先计算收敛半径:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} |c_n|^{\frac{1}{n}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left| \left(\frac{1}{1-a}\right)^{n+1} \right| \right)^{\frac{1}{n}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{1-a} \right| \left(\left| \frac{1}{1-a} \right| \right)^{\frac{1}{n}} \\ &= \left| \frac{1}{1-a} \right| \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left| \frac{1}{1-a} \right| \right)^{\frac{1}{n}} \\ &= \left| \frac{1}{1-a} \right| \times 1 \\ &= \left| \frac{1}{1-a} \right| \end{aligned}$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left| \frac{1}{1-a} \right| \right)^{\frac{1}{n}} = 1$ 利用了引理 6.5.2。

于是由命题 6.4.12(f) 可得,

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} |c_n|^{\frac{1}{n}} = \left| \frac{1}{1-a} \right|$$

所以

$$R = |1-a|$$

于是令 $r = \frac{1}{2}|1-a|$, 只需 $|x-a| < r$, 即 $x \in (a-r, a+r)$ 时, 由定理 15.1.6(c) 可知, 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{1-a}\right)^{n+1} (x-a)^n$ 在 $[a-r, a+r]$ 上一致收敛于某个函数 g , 因为 $(a-r, a+r) \subseteq [a-r, a+r]$, 所以级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{1-a}\right)^{n+1} (x-a)^n$ 在 $(a-r, a+r)$ 上也一致收敛于 g 。

对任意 $x \in (a-r, a+r)$, 于是可得

$$\left| \frac{x-a}{1-a} \right| < 1$$

于是利用引理 7.3.3 可得

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{1-a}\right)^{n+1} (x-a)^n &= \frac{1}{1-a} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x-a}{1-a}\right)^n \\ &= \frac{1}{1-a} \frac{1}{1-\frac{x-a}{1-a}} \\ &= \frac{1}{1-x}\end{aligned}$$

于是可得级数逐点收敛于 f 。

综上, 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{1-a}\right)^{n+1} (x-a)^n$ 在 $(a-1, a+1)$ 上也一致收敛于 f (注 14.2.8 中有阐述)。

由 a 的任意性可知, 命题成立。

15.2.3

注意: 命题中的 $r \leq R$ (R 为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n c_n (x-a)^{n-1}$ 的收敛半径)

对 k 进行归纳。

(1) 归纳基始 $k=1$, 由定理 15.1.6(d) 可知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n c_n (x-a)^{n-1}$ 在区间 $(a-r, a+r)$ 上一致收敛 f' , 即

$$\begin{aligned}f'(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} n c_n (x-a)^{n-1} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} c_{n+1} (n+1) (x-a)^n\end{aligned}$$

命题成立。

(2) 归纳假设 $k=j$ 时, 命题成立, 函数 f 在 $(a-r, a+r)$ 上都是 j 次可微的, 并且 j 次导函数由下式给出:

$$f^{(j)}(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_{n+j} (n+1)(n+2)\dots(n+j) (x-a)^n = \sum_{n=0}^{\infty} c_{n+j} \frac{(n+j)!}{n!} (x-a)^n$$

(3) $k = j + 1$ 时。

$$\begin{aligned}
\limsup_{n \rightarrow \infty} |c_{n+j} \frac{(n+j)!}{n!}|^{\frac{1}{n}} &= \limsup_{n \rightarrow \infty} |c_{n+j}|^{\frac{1}{n}} \left| \frac{(n+j)!}{n!} \right|^{\frac{1}{n}} \\
&= \limsup_{n \rightarrow \infty} |c_{n+j}|^{\frac{1}{n}} \limsup_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+j)!}{n!} \right|^{\frac{1}{n}} \\
&= \limsup_{n \rightarrow \infty} |c_{n+j}|^{\frac{1}{n}} \times 1 \\
&= \limsup_{n \rightarrow \infty} |c_{n+j}|^{\frac{1}{n}} = R
\end{aligned}$$

再次利用定理 15.1.6(d) 可知, 函数 $f^{(j)}$ 在 $(a-R, a+R)$ 上可微, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n c_{n+j} \frac{(n+j)!}{n!} (x-a)^{n-1}$ 在区间 $(a-r, a+r)$ 上一致收敛于 $(f^{(j)})' = f^{(j+1)}$ 。

又因为

$$\begin{aligned}
&\sum_{n=1}^{\infty} n c_{n+j} \frac{(n+j)!}{n!} (x-a)^{n-1} \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} n c_{n+1+j} \frac{(n+1+j)!}{n!} (x-a)^n
\end{aligned}$$

综上所述可得

$$f^{(j+1)} = \sum_{n=0}^{\infty} n c_{n+1+j} \frac{(n+1+j)!}{n!} (x-a)^n$$

命题成立, 归纳完成。

15.2.4

由命题 15.2.6 可知,

$$f^{(k)}(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_{n+k} \frac{(n+k)!}{n!} (x-a)^n$$

当 $x = a$ 时, 如果 $n > 0$, 则 $(x - a)^n = 0^n = 0$, 于是级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_{n+k} \frac{(n+k)!}{n!} (x - a)^n$ 只剩第一项, 即

$$\begin{aligned} f^{(k)}(a) &= \sum_{n=0}^{\infty} c_{n+k} \frac{(n+k)!}{n!} 0^n \\ &= c_{0+k} \frac{(0+k)!}{0!} 0^0 \\ &= c_k \frac{k!}{1} \times 1 \\ &= c_k k! \end{aligned}$$

于是可得, 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - a)^n$ 的系数为

$$c_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$$

综上所述可得

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x - a)^n$$

15.2.5

(1) 证明恒等式。

$$\begin{aligned} (x - a)^n &= ((x - b) + (b - a))^n \\ &= \sum_{m=0}^n \frac{n!}{m!(n-m)!} (b - a)^{n-m} (x - b)^m \end{aligned}$$

注意: 第二个等式使用了二项式公式, 即习题 7.1.4。

(2) 解释这个恒等式为什么与泰勒公式以及习题 15.2.1 是一致的。(即彼此之间不存在矛盾)

令 $f(x) = (x - a)^n$, 并设 f 是在 b 处实解析的函数 (习题 15.2.6 保证了这个假设是成立的), 由泰勒公式可知,

$$f(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{f^{(m)}(b)}{m!} (x - b)^m$$

由习题 15.2.1 可知,

$$f^{(m)}(b) = \frac{n!}{(n-m)!} (b-a)^{n-m}$$

综上可得,

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{f^{(m)}(b)}{m!} (x-b)^m \\ &= \sum_{m=0}^n \frac{n!}{m!(n-m)!} (b-a)^{n-m} (x-b)^m \end{aligned}$$

15.2.6