

4.3 习题

2024 年 5 月 4 日

说明. 本节的证明过程中,用到了一些命题,在书中没有提到,这里提前列出,并证明它。

A. 正有理数 \geq 零 \geq 负有理数

证明:

不妨设 x, y 是任意有理数,并且 x 是正有理数, y 是负有理数,所以存在 a, b, c, d 正整数,使得 $x = a/b, y = (-c)/d$, 现在只需证明 $x \geq 0 \geq y$ 。

$$\begin{aligned}x - 0 &= a/b - 0 \\&= a/b - 0/1 \\&= a1 - b * 0/b \\&= a/b \\&= x\end{aligned}$$

由于 x 是正的, 所以 $x \geq 0$ 。

$$\begin{aligned}0 - y &= 0 - (-c)/d \\&= 0 - (-c)/d \\&= c/d\end{aligned}$$

有 c/d 是正有理数，所以 $0 \geq y$ 。

综上，命题成立。

A 推论 1. 正有理数 $>$ 零 $>$ 负有理数

证明：由于正有理数不等于零，且由命题 A，可知正整数大于零；由于负有理数不等于零，且由命题 A，可知负整数小于零。

A 推论 2. 有理数 $x > 0$ ，那么 x 是正有理数；有理数 $x < 0$ ，那么 x 是负有理数。

证明：

由于 $x > 0$ ，所以 $x - 0$ 是正有理数，不妨设该正有理数是 k ，即：

$$x - 0 = k$$

$$x = k$$

由于 k 是正有理数，所以 x 也是正有理数；

同理 $x < 0$ 时， x 是负有理数。

B. 两个正有理数相加，是正有理数

证明：不妨设 x, y 是任意正有理数，所以存在 a, b, c, d 正整数，使得 $x = a/b, y = c/d$ 。

$$\begin{aligned}x + y &= a/b + c/d \\ &= (ad + bc)/bd\end{aligned}$$

由于分子是正整数（命题 2.2.8），分母是正整数（命题 2.3.3），所以 $x + y$ 是正有理数。

4.3.1

(a)（绝对值的非退化性） 我们有 $|x| \geq 0$ 。另外， $|x| = 0$ 当且仅当 x 为零。

证明：

x 是有理数，由引理 4.2.7（有理数的三歧性）可知， x 有三种情况：

(1) x 是正有理数，此时， $|x| = x$ ，而正有理数 $|x| - 0 = x - 0 = x$ ，由

定义 4.2.8 (有理数的排序) 可知 $|x| > 0$;

(2) x 是负有理数, 此时, $|x| = -x$, $|x| - 0 = -x - 0 = -x$, 而 $-x$ 是正有理数, 由定义 4.2.8 (有理数的排序) 可知 $|x| > 0$;

(3) x 等于 0, 此时 $|x| = 0$, 由定义 4.2.8 (有理数的排序) 可知 $|x| \geq 0$;

综上, $|x| \geq 0$ 。另外, $|x| = 0$ 当且仅当 x 为零。

(b) (绝对值的三角不等式) 我们有 $|x + y| \leq |x| + |y|$ 。

证明:

可以通过有理数的三歧性证明, 这里情况较多, 只证明 x 是正有理数, y 是负有理数的情况【偷个懒, 哈哈】。

设 x 是正有理数, y 是负有理数, 不妨设 $x = a/b, y = (-c)/d$, 其中 a, b, c, d 都是正整数。

$$\begin{aligned}|x| + |y| &= a/b + c/d \\ &= (ad + bc)/bd\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x + y &= a/b + (-c)/d \\ &= (ad - bc)/bd\end{aligned}$$

若 $x + y$ 是负有理数, 则:

$$\begin{aligned}|x + y| &= -(x + y) \\ &= [-(ad - bc)]/bd \\ &= (bc - ad)/bd\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}|x| + |y| - (|x + y|) &= (ad + bc)/bd - (bc - ad)/bd \\ &= (ad + bc)/bd + (ad - bc)/bd \\ &= [(ad + bc)bd + (ad - bc)bd]/bdbd \\ &= (adbc + adbc)/bdbd\end{aligned}$$

由于分子是正整数（命题 2.2.8），分母是正整数（命题 2.3.3），可知 $(adb + adb)/bdb$ 是正的，所以 $|x| + |y| > |x + y|$ 。

(c) 不等式 $-y \leq x \leq y$ 成立, 当且仅当 $y \geq |x|$ 。特别地, $-|x| \leq x \leq |x|$ 。

证明:

充分性: 假设前提 $-y \leq x \leq y$ 成立, 该前提隐含 y 不是负有理数 (见说明)。由有理数的三歧性, x 的取值有 3 种情况: (1) x 等于 0, 此时 $|x| = 0$, 而 y 是正有理数, 所以 $y \geq 0$ 。

(2) x 等于正有理数, 此时 $|x| = x$, 由前提可知 $y \geq x$ 。

(3) x 等于负有理数, 此时 $|x| = -x$, 不妨设 a, b, c, d 是正有理数, $x = (-a)/b, y = c/d$, 由于 $-y \leq x$, 所有 $-y - x$ 是负有理数, 即:

$$\begin{aligned} -y - x &= (-c)/d - (-a)/b \\ &= (-c)b + a/b \\ &= a/b - c/d \\ &= (ad - bc)/bd \end{aligned}$$

由上且 $-y - x$ 是负有理数, 可知 $(ad - bc) = -(bc - ad)$ 是负整数, 所以 $bc - ad$ 是正整数。

$$\begin{aligned} y - (-x) &= c/d - \{ -[(-a)/b] \} \\ &= c/d - a/b \\ &= (bc - ad)/bd \end{aligned}$$

由 $bc - ad$ 是正整数和 bd 是正整数, 可知 $y - (-x)$ 是正有理数, 所以 $y \geq -x$ 。

综合 (1) (2) (3) 可知 $y \geq |x|$ 。

必要性: 假设 $y \geq |x|$, 由 (a) 可知 $|x| \geq 0$, 又序是可传递的 (命题 4.2.9), 所以 $y \geq 0$ 。由有理数的三歧性, x 的取值有 3 种情况: (1) x 等于 0, 此时 $|x| = 0$, 由前提 $y \geq |x|$ 可知 $y \geq 0$, 由此可知 y 是零或正有理数, 所以 $-y$ 是零或负有理数, 进而 $-y \leq 0$ 。

(2) x 是正有理数, 此时 $|x| = x$, 由前提 $y \geq |x|$ 可知 $y \geq x$, 此时 y 是正有理数, $x - (-y) = x + y$, 两个正有理数相加是正有理数, 所以 $-y \leq x$ 。

(3) x 是负有理数, 此时 $|x| = -x$, 不妨设 $x = (-a)/b, y = c/d$, 其中 a, b, c, d 是正整数。由前提 $y \geq |x|$, 可知 $y \geq -x$, 所以:

$$\begin{aligned} y - (-x) &= c/d - \{-[(-a)/b]\} \\ &= c/d - a/b \\ &= (bc - ad)/bd \end{aligned}$$

由于 $y \geq -x$, 所以 $(bc - ad)/bd$ 是正的。

$$\begin{aligned} y - x &= c/d - (-a)/b \\ &= c/d + a/b \\ &= (ad + bc)/bd \end{aligned}$$

由于 a, b, c, d 都是正整数, 由此可知 $(ad + bc)/bd$ 是正的, 所以 $y > x$ 。

$$\begin{aligned} x - (-y) &= x + y \\ &= (-a)/b + c/d \\ &= (bc - ad)/bd \end{aligned}$$

由于 $(bc - ad)/bd$ 是正的, 所以 $x \geq -y$ 。

综上, (1) (2) (3) 可知 $-y \leq x \leq y$ 。

特别地, 把 y 替换为 $|x|$, 并且 $|x| \geq x$, 由必要性可知 $-|x| \leq x \leq |x|$ 。

说明. 因为 y 是负有理数, 存在正整数 a, b 使得 $y = (-a)/b$, 现在证明 $-y > y$ 。

证明:

由

$$\begin{aligned}(-y) - y &= a/b - [(-a)/b] \\ &= a/b + a/b \\ &= (ab + ab)/bb\end{aligned}$$

由于分子是正整数（命题 2.2.8），分母是正整数（命题 2.3.3），可知 $(ab + ab)/bb$ 是正的，所以 $-y > y$ 。

(d) (绝对值的可乘性) $|xy| = |x||y|$ 。特别地， $|-x| = |x|$

证明：

由有理数的三歧性，证明过程可以按三种情况说明：

(1) x, y 有一个是 0 或都是 0，此时， $|xy| = 0, |x||y| = 0$ ，所以 $|xy| = |x||y|$ 。

(2) x, y 同号。如果 x, y 都是正有理数，存在正整数 a, b, c, d 使得 $x = a/b, y = c/d$ ，此时：

$$\begin{aligned}|xy| &= |(a/b) * (c/d)| \\ &= |(ac)/(bd)| \\ &= ac/bd\end{aligned}$$

又

$$\begin{aligned}|x||y| &= |a/b||c/d| \\ &= (a/b) * (c/d) \\ &= ac/bd\end{aligned}$$

所以 $|xy| = |x||y|$

如果 x, y 都是负有理数，证明类似。

(3) x, y 是异号。如果 x 是正有理数， y 是负有理数，存在正整数 a, b, c, d

使得 $x = a/b, y = (-c)/d$,

$$\begin{aligned}|xy| &= |(a/b) * [(-c)/d]| \\ &= |(-ac)/(bd)| \\ &= ad/bd\end{aligned}$$

又

$$\begin{aligned}|x||y| &= |a/b| |(-c)/d| \\ &= (a/b) * (c/d) \\ &= ac/bd\end{aligned}$$

所以 $|xy| = |x||y|$ 。如果 x 是负整数, y 是正有理数, 证明过程类似。

综上, (1) (2) (3) 可知 $|xy| = |x||y|$ 。

特别地, $-x = (-1)x$, 所以

$$\begin{aligned}|-x| &= |(-1)||x| \\ &= 1|x| \\ &= |x|\end{aligned}$$

命题 4.2.4

。

(e) (距离的非退化性) $d(x, y) \geq 0$ 。另外, $d(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$ 。

证明:

$d(x, y) = |x - y|$, 由于 $x - y$ 结果是有理数, 由 (a) 可知 $|x - y| \geq 0$,

并且 $|x - y| = 0$ 当且仅当 $x - y$ 等于零当且仅当 $x = y$

(f) (距离的对称性) $d(x, y) = d(y, x)$ 。

证明:

不妨设 $z = x - y$, 由于 $d(x, y) = |z|, d(y, x) = |-z|$, 由 (d) 可知

$|-z| = |z|$, 所以 $d(x, y) = d(y, x)$

(g) (距离的三角不等式) $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ 。

证明:

$d(x, z) = |x - z|, d(x, y) = |x - y|, d(y, z) = |y - z|$, 由于 $x - z = (x - y) + (y - z)$, 由命题 (b) 可知 $|x - z| \leq |x - y| + |y - z|$, 所以 $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ 。

4.3.2

(a) 如果 $x = y$, 那么对任意的 $\varepsilon > 0$, x 都是 ε -接近于 y 的。反过来, 如果对于任意的 $\varepsilon > 0$, x 都是 ε -接近于 y 的, 那么 $x = y$ 。

证明:

如果 $x = y$, 则:

$$x - y = y - y$$

$$\text{有理数加法是定义明确的 } x - y = 0$$

由此可知 $d(x, y) = 0$, 所以任意 $\varepsilon > 0$ 总有 $\varepsilon > d(x, y)$ 。

反过来, 用反证法证明。不妨设 $z = x - y$, 由有理数的三歧性可知, z 的取值有 3 种情况:

(1) z 是正有理数, 此时 $d(x, y) = |x - y| = |z| = z$, 此时取 $\varepsilon = (1/2) * z$, 那么 $d(x, y) > \varepsilon$, 与前提矛盾, 所以 z 不能是正有理数。

(2) z 是负有理数, 此时 $d(x, y) = |x - y| = |z| = -z$, 此时也取 $\varepsilon = (1/2) * z$, 那么 $d(x, y) > \varepsilon$, 与前提矛盾, 所以 z 不能是负有理数。

由 (1) (2) 可知 z 只能是零, 所以 $z = x - y = 0 \Rightarrow x = y$ 。

(b) 设 $\varepsilon > 0$, 如果 x 是 ε -接近于 y 的, 那么 y 也是 ε -接近于 x 的。

证明:

由于 x 是 ε -接近于 y 的, 所以 $d(x, y) \leq \varepsilon$ 。由命题 4.3.3 (f) 可知 $d(x, y) = d(y, x)$, 所以 $d(y, x) \leq \varepsilon$, 所以 y 也是 ε -接近于 x 的。

(c) 设 $\varepsilon, \delta > 0$, 如果 x 是 ε -接近于 y 的, 并且 y 是 δ -接近于 z 的, 那么 x 和 z 是 $(\varepsilon + \delta)$ -接近的。

证明:

由 4.3.3 (g) 可知 $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$, 所以 $d(x, z) \leq \varepsilon + \delta$, 那么 x 和 z 是 $(\varepsilon + \delta)$ -接近的

(d) 设 $\varepsilon, \delta > 0$, 如果 x 和 y 是 ε -接近的, 并且 z 和 w 是 δ -接近的, 那么 $x + z$ 和 $y + w$ 是 $(\varepsilon + \delta)$ -接近的, 并且 $x - z$ 和 $y - w$ 也是 $(\varepsilon + \delta)$ -

接近的。

证明：

记 $a := y - x$, 那么 $y = x + a$ 且 $|a| \leq \varepsilon$ 。类似地, 定义 $b := w - z$, 那么 $w = z + b$ 且 $|b| \leq \delta$ 。

因为 $y = x + a, w = z + b$, 所以 $d(x + z, y + w) = d(x + z, x + z + a + b) = |a + b|$, 由 4.3.3 (b) 可知 $|a + b| \leq |a| + |b|$, 即 $d(x + z, y + w) \leq \varepsilon + \delta$, 那么 $x + z$ 和 $y + w$ 是 $(\varepsilon + \delta)$ -接近的;

因为 $y = x + a, w = z + b$, 所以 $d(x - z, y - w) = d(x - z, x - z + a - b) = |a - b| = |a + (-b)|$, 由 4.3.3 (b) (d) 可知 $|a + (-b)| \leq |a| + |b|$, 即 $d(x - z, y - w) \leq \varepsilon + \delta$, 那么 $x - z$ 和 $y - w$ 也是 $(\varepsilon + \delta)$ -接近的

(e) 设 $\varepsilon > 0$, 如果 x 和 y 是 ε -接近的, 那么对任意的 $\varepsilon' > \varepsilon$, x 和 y 也是 ε' -接近的。

证明：

由题设可知 $d(x, y) \leq \varepsilon$, 又 $\varepsilon < \varepsilon'$, 由命题 4.2.9 (c) (序是可传递的) 可知 $d(x, y) \leq \varepsilon'$, 那么 x 和 y 也是 ε' -接近的。

(f) 设 $\varepsilon > 0$, 如果 y 和 z 都是 ε -接近于 x 的, 并且 w 位于 y 和 z 之间 (即 $y \leq w \leq z$ 或 $z \leq w \leq y$), 那么 w 也是 ε -接近于 x 的。

证明：

情况 1: $w = x$ 、 $w = y$ 和 $w = z$ 时, 显然 w 是 ε -接近于 x 的。

情况 2: $w \neq x, w \neq y, w \neq z$ 时, 当 $y < w < x$ 时, 可知:

$$d(y, x) = d(y, w) + d(w, x)$$

由于命题 4.3.3 (e) 可知 $d(y, w) \geq 0$, 所以 $d(w, x) \leq \varepsilon$, 否则与题设矛盾。当 $x < w < z$ 、 $z < w < x$ 和 $x < w < y$ 证明类似。

综上, 命题成立。【感觉证明有点麻烦, 没想到好的思路】

(g) 设 $\varepsilon > 0$, 如果 x 和 y 是 ε -接近的, 并且 z 不为零, 那么 xz 和 yz 是 $\varepsilon|z|$ -接近的。

证明：

记 $a := y - x$, 那么 $y = x + a$ 且 $|a| \leq \varepsilon$ 。

因为 $y = x + a$, 所以,

$$yz = (x + a)z = xz + az$$

于是,

$$|yz - xz| = |xz + az - xz| = |az| = |a||z|$$

又因为 $|a| \leq \varepsilon$, 所以,

$$|yz - xz| \leq \varepsilon|z|$$

从而 xz 和 yz 是 $\varepsilon|z|$ - 接近的。

4.3.3

(a) 我们有 $x^n x^m = x^{n+m}$, $(x^n)^m = x^{nm}$, $(xy)^n = x^n y^n$ 。

证明:

(1) $x^n x^m = x^{n+m}$

对 m 进行归纳, 当 $m = 0$ 时,

$$\begin{aligned} x^n x^0 &= x^n * 1 \\ &= x^n \end{aligned}$$

又因为,

$$\begin{aligned} x^{n+m} &= x^{n+0} \\ &= x^n \end{aligned}$$

所以当 $m = 0$ 是命题成立。

归纳假设 $m = k$ 时, $x^n x^k = x^{n+k}$ 。

现在只需 $m = k + 1$ 时, 命题成立。由定义 4.3.9 可知,

$$x^n x^{k+1} = x^n (x^k \times x^1)$$

又由命题 4.2.4 (有理数的代数定律) 可知,

$$\begin{aligned} x^n x^{k+1} &= x^n (x^k \times x^1) \\ &= (x^n x^k) \times x^1 \\ &= x^{n+k} \times x^1 \\ &= x^{n+k+1} \end{aligned}$$

综上，命题成立。

(2)