

1 3.6 为什么

注 3.6.3

①单射

对任意 $x_1 \in X, x_2 \in X, x_1 \neq x_2, f(x_1) = 2x_1, f(x_2) = 2x_2$, 乘法是交换的 (引理 2.3.2) 如果 $f(x_1) = f(x_2)$ 则 $2x_1 = 2x_2$, 由乘法的消去律 (推论 2.3.7) 可知, $x_1 = x_2$, 与题设矛盾, 所以 f 是单射的。

②满射

对任意 $y \in Y$, 由于 Y 是偶数集, 所以 Y 总的元素都需要符合偶数的定义, 即: 对任意的 Y 中元素 y , 当且仅当 $y=2n$, n 是自然数。由此可得 f 是满射。

注 3.6.6

需要找到 $X = \{i \in N : i < n\} \rightarrow Y = \{i \in N : 1 \leq i \leq n\}$ 的双射函数
f. 我们定义 $f : X \rightarrow Y, \{f(x) : x \in X, f(x) = x++\}$

现在证明 f 值域是 Y , f 是双射函数。

(1) f 的值域是 Y

若 $n=0$, 则 X 与 Y 都是空集, 无需说明。

若 $n>0$ 时, 对任意 $i \in X$, 有 $i < n$, 由自然数序的定义 (定义 2.2.11) 可知 $i++ \leq n$ (其实通过定义无法直接获得该结论, 习题 2.2.3 中有证明), 若 i 的最小值是 0, 有 $f(0) = 1, 1 \leq 1$, 即: $1 \leq f(i) \leq n$, 所以 f 的值域为 Y 。

(2) f 是双射函数

①单射

对任意 $i_1 \in X, x_2 \in X, f(i_1) = i_1++, f(x_2) = x_2++$

补充