3.6 习题

2024年3月13日

3.6.1

证明.

①X和X有相等的基数。

构造一个从 X 到 X 的函数 f, 使得 f(x)=x ($\{x \in X\}$)。函数 f 是双射函数,是显而易见的,这里不做证明了。

(2)如果 X 和 Y 有相等的基数, 那么 Y 和 X 有相等的基数。

有 X 和 Y 有相等的基数,可知存在一个双射: $f: X \to Y$ 。那么存在 f 的逆 $f^{-1}: Y \to X$,由逆的定义可知 f^{-1} 是双射函数。

③如果 X 和 Y 有相等的基数且 Y 和 Z 有相等的基数,那么 X 和 Z 有相等的基数。

由 X和 Y有相等的基数,可知存在一个双射: $f: X \to Y$ 。由 Y和 Z有相等的基数,可知存在一个双射: $g: Y \to Z$ 。那么 g 和 f 的复合函数为 $g \circ f: X \to Z$ 。

由习题 3.3.7 可知 $g \circ f$ 是双射函数。由此可知存在一个双射: $g \circ f$: $X \to Z$, 所以 X 和 Z 有相等的基数。

3.6.2

证明.

①充分性: -个集合 X 的基数为 0, 则 X 是空集。

那么存在从 X 到 $\{i \in N: 1 \leq i \leq 0\}$ 的双射: $f: X \to \{i \in N: 1 \leq i \leq 0\}$ 。而 $\{i \in N: 1 \leq i \leq 0\}$ 是 Ø,即 $f: X \to \emptyset$ 。如果 X 不是空集,那 么则存在一个 $x \in X$ 使得 $f(x) \in \emptyset$,这显然是不成立的,所以 X 是空集

②必要性: X 是空集,则 X 的基数为 0。

若 X 是空集,由习题 3.3.3 知 $f: \varnothing \to \varnothing$ 为双射,而 $\{i \in N: 1 \leq i \leq 0\}$ 。 即存在双射函数 $f: \varnothing \to \{i \in N: 1 \leq i \leq 0\}$,由定义 3.6.5 可知集合 X 基数为 0.

3.6.3

证明.

对 n 进行归纳:

n=0 时, f 是空函数, 命题空成立。

归纳假设 n=k 时, 命题成立。

下面我们证明该命题对于 k++ 也为真。设集合 $N_k=\{i\in\mathbb{N}:1\leq i\leq k\},N_{k++}=\{i\in\mathbb{N}:1\leq i\leq k++\}$ 。函数 $f_{k++}:N_{k++}\to N$ 是一个函数,我们可以由 f_{k++} 定义出一个函数 $f_k:N_k\to N$,对任意 $i\in N_k,f_k(i)=f_{k++}(i)$ 。由归纳假设可知,存在一个自然数 M 使得 $f_k(i)\leq M,i\in N_k$,即 $f_{k++}(i)\leq M,i\in N_k$,此时我们可以取 $f_{k++}(k++),M$ 中的较大值为 M',由此可知该 M' 使得 $f_{k++}(i)\leq M',i\in N_{k++}$ 。归纳法完成。

3.6.4

(a) 设 X 是一个有限集,设 x 是一个对象并且 x 不是 X 中的元素。那 么 $X \cup \{x\}$ 是有限的,且 $\#(X \cup \{x\}) = \#(X) + 1$

证明.

X 是有限集,不妨设 X 的基数是自然数 n。因此存在从 X 到 $\{i \in N : 1 \le i \le n\}$ 的双射函数 f。定义出一个函数 $g: X \cup \{x\} \to \{i \in N : 1 \le i \le n+1\}$,使得 g(x) = n+1,g(i) = f(i), $i \in X$ 。 g 是双射函数,由此可知 $X \cup \{x\}$ 的基数是 n+1,所以 $X \cup \{x\}$ 是有限的,且 $\#(X \cup \{x\}) = \#(X) + 1$

(b) 设 X 和 Y 都是有限集,那么 $X \cup Y$ 是有限的,且 $\#(X \cup Y) \le \#(X) + \#(Y)$ 。另外,如果 X 和 Y 是不相交的(即 $X \cap Y = \varnothing$),那么 $\#(X \cup Y) = \#(X) + \#(Y)$

证明.

X 和 Y 都是有限集. 不妨设 X 和 Y 的基数分别为 n 和 m。

(c) 设 X 是一个有限集, Y 是 X 的一个子集。那么 Y 是有限的,且 $\#(Y) \le \#(X)$ 。另外,如果 $Y \ne X$ (即 Y 是 X 的一个真子集),那么我们

有 #(Y) < #(X)。