温暖气候下更长的跗跖骨表明散热塑造了鸟腿的裸露段

> 稿件草稿 v1（中文，2026-10-28）。体例与段落脉络对照 Weeks 等 2025（Global Ecology and Biogeography，Longer wing bones in warmer climates suggest a role of thermoregulation in bird wing evolution）逐段对应，题目句式也照它。GEB 的顺序是引言、方法、结果、讨论，摘要为结构化摘要。所有数字来自预注册的结果文档，系数为 $\log_{10}$ 长度每升高 10 °C 的变化，0.0043 对应 1%，方括号为 95% 区间。

摘要

目的　检验 Allen 定律在鸟腿上是否只作用于裸露的散热段，以及哪些鸟的腿遵守这条规律。

地点　全球。

时期　现生物种。

类群　鸟类，9,158 种的外测跗跖与 1,096 种、90 种和 1,641 种的三段腿骨。

方法　把腿分为股骨、胫跗骨和跗跖骨三段，在系统发育广义最小二乘框架下估计每段对分布区年均温的斜率，按发育方式、巢型、留巢时长和成年后地面与水面觅食的比例分组或交互。用三段腿的多体落震模型比较真实腿与去掉温度效应的腿的落地可行率。用一个不含先验规律的演化模型做独立检查。

结果　温度的作用只落在跗跖骨上，股骨不响应，这一分段在早成鸟与鸭科两份独立骨骼数据上一致。响应只出现在成年后腿暴露于环境的类群中，整天站在露天的地栖和水生鸟每升高 10 °C 跗跖骨长 1.5% 到 3.8%，树上与空中觅食的鸟接近零，把腿缩进腹羽的树栖雀形目反向。成年后的暴露程度连续预测响应强度并吸收发育方式的差异，雏鸟期的巢型与留巢时长不起作用。温度造成的跗跖骨加长不改变落地可行率。演化模型在未被告知任何规律的条件下重现了体重随温度变小以及腿响应的方向。

主要结论　鸟腿上的 Allen 定律是分段的，由成年后腿的暴露程度决定，并落在热收益最高而力学代价为零的那一段上。

引言

在产热与散热之间维持平衡是恒温动物的基本要求。Bergmann 定律与 Allen 定律分别描述体型和附肢比例随气候的变化，前者指寒冷地区的体型更大，后者指温暖地区的附肢相对更长，两者都被解释为对散热需求的适应。这两条规律在哺乳动物的耳与尾、鸟类的喙和腿上得到过大量支持，近年来基于全球性状数据库的研究把检验扩展到上万种鸟类。然而把附肢当作整体来测量，无法区分散热选择与其他塑造附肢的力量，Allen 定律背后的选择机制仍不清楚。理清这些机制是理解形态如何响应气候的必要一步。

围绕 Allen 定律，我们问散热的需要是否塑造了鸟腿，以及它作用在腿的哪一段。喙和腿的整体长度同时服务于取食和运动，温度与它们的关系可以有散热以外的来源。鸟腿由三段组成，只有最远

端的跗跖骨裸露无羽并与环境直接交换热量，股骨包在体壁内，胫跗骨大部分覆羽并有逆流热交换的血管网。把腿分成散热段与非散热段来检验，可以得到更机制性的理解。

鸟腿是重要的散热部位。站立和涉水的鸟把腿暴露在空气或水中，裸露的跗跖是腿上主要的散热面，逆流热交换只保护胫跗骨以上的部分。水的导热远大于空气，涉水鸟腿上的热损失可占总热损失的相当部分，因此地面与水面活动的鸟在温暖地区需要更大的腿部散热面，在寒冷地区则需要更小的。相反，栖枝的鸟在休息时把腿缩进腹羽，裸露段被羽毛覆盖，腿在这时主要起保温而不是散热的作用。腿作为散热面的时间份额因此随生活方式差异很大，散热选择的强度也应当随之变化。

我们在 9,158 种鸟的外测跗跖和三份独立的三段腿骨数据上刻画腿的散热面随温度的变化，骨长分别来自人工测量的 1,096 种、鸭科的 90 种和自动测量的 1,641 种雀形目。具体而言，我们检验两个假说。第一，温度升高只与跗跖骨变长相关，股骨不变。第二，这种相关只出现在成年后腿暴露于环境的类群中，并随暴露程度连续增强。我们进一步用三段腿的落震仿真询问温度造成的加长是否以落地性能为代价，并用一个不含先验规律的演化模型作为回归框架之外的独立检查。

方法

数据

外测跗跖、体重、生活方式、栖境密度、迁徙等级和分布范围来自 AVONET，取有实测值的 9,158 种。温度取 WorldClim 2.1 的年均温、最热月最高温和最冷月最低温，分辨率 2.5 角分，在 AVONET 分布质心处采样，质心落在海里时取 1° 内最近的陆地像元，稳健性分析另用分布范围内的盒均值温度。系统发育用 BirdTree 的 Hackett 主干树，主分析用第 21 棵，稳健性用第 41、61、81、100 棵和 Ericson 主干。

三段腿骨来自三个来源。Eliason 等人人工测量的股骨、胫跗骨、跗跖骨和肱骨覆盖 1,246 种，经 AVONET 的分类对照表对上树的有 1,096 种，其中非雀形目 713 种。Watanabe 的鸭科三段腿骨覆盖 90 种，与 Eliason 的数据独立。Skelevision 用神经网络从密歇根大学动物博物馆的骨骼照片测量的 12 根骨长覆盖 1,641 种雀形目，平均误差 0.89 mm，同一数据集给出肱骨和尺骨作为对照。发育方式按 Starck 与 Ricklefs 的分类在科一级编码为早成、半早成、半晚成和晚成四档，共 97 科，五个归类不确定的科在稳健性分析中去掉。巢型与留巢天数来自 Cooney 等人的汇编。觅食层比例来自 EltonTraits，成鸟暴露 X 定义为地面、水面附近和水下觅食比例之和，取值 0 到 1，作为成年后腿露在环境里的时间份额的代理。

跨物种模型

对每个响应变量 y_j（某段骨长或外测跗跖的 $\log_{10}$ 值）拟合系统发育广义最小二乘模型，表达为

$$y_j = a + b\,M_j + c\,T_j + \boldsymbol{\gamma}^{\top}\mathbf{x}_j + \epsilon_j, \tag{1}$$

其中 M_j 是 $\log_{10}$ 体重，T_j 是分布质心的年均温（单位 10 °C），$\mathbf{x}_j$ 包括生活方式、栖境密度、迁徙等级和纬度跨度，残差 ϵ_j 的协方差由系统发育树给出并以 Pagel 的 λ 缩放。分段预测的核心量是跗跖骨对股骨的比例 $r = \log_{10}(\text{跗跖骨}/\text{股骨})$ 对温度的斜率，以及三段各自的斜率之差。分组

分析在式 (1) 中加入温度与分组的交互 $c_g\,T_j\,g_j$，c_g 即两组斜率之差，成鸟暴露分析把 g_j 换为连续的 X_j。系数的区间来自固定 λ 的广义最小二乘协方差，主模型另按科重抽样 500 次。每一步的假说、纳入规则与判据在运行前写定，最小关心效应为每 10 °C 1%，运行后的拆分标为探索。

种内模型

密歇根大学动物博物馆标本的采集坐标、性别和年份来自 GBIF 的 Darwin Core 记录，温度在采集点采样。纳入成体、性别已知、采集点在物种分布范围内且无圈养记录的标本，留鸟取全年，迁徙种只取繁殖季。混合模型表达为

$$y_{ij} = \alpha_j + \beta_j\,\tilde{T}_{ij} + \gamma\,\tilde{T}_{ij}X_j + \delta\,\mathrm{sex}_{ij} + \theta\,\mathrm{year}_{ij} + e_{ij}, \tag{2}$$

其中 i 为标本，j 为物种，$\tilde{T}_{ij}$ 为在物种内中心化的温度，α_j 与 β_j 为物种的随机截距与随机斜率，γ 是成鸟暴露每增加 1 时种内斜率的增量。主样本为 79 种 998 件。

落震仿真

落震模型在 Exudyn 中实现。三段刚性杆由髋、膝、踝三个转动副连接，每个关节附扭簧与阻尼，足端为球体与地面的罚接触，机身为点质量并在竖直面内自由平动。真实腿取类群三段骨长与体重的中位数，去散热腿把每一段按它自己的温度斜率从 25 °C 推回 5 °C，体重不变。载荷取体重的一半，足端半径、杆件线密度与机身等效半径由真实腿定一次并对所有腿相同。关节刚度、阻尼和触地姿态在预注册的参数盒内用拉丁超立方取 256 组，所有腿共用。地面取硬地、草地和湿沙三档，触地速度按 Froude 数从参考档换算到真实腿的长度并对所有腿固定。可行率为峰值合加速度不超过 10 g、腿行程不超过腿长的 15%、回弹不超过触地动能对应高度的 5%、足端滑移不超过跗跖骨长一半四道判据同时满足的参数组比例，之差的区间按参数组自助重抽样 10,000 次，有意义的差定为 5 个百分点。

演化模型

演化模型采用联合嵌入预测架构的单层形式，沿系统发育树的叶序把相邻物种组织为序列。输入为前一物种的 23 个形态性状，动作为两物种之间习性与气候的差值和进化距离，模型在嵌入空间预测下一物种的表示，性状由岭回归探针读出。训练用五棵 Hackett 树、两个随机种子和按科五折交叉验证共 50 个模型，评估只在留出科的物种上进行。反事实读数把目标物种的三项气候各减 20 °C，取观测动作与反事实动作预测之差，扣除体重的影响时减去该列对体重的异速斜率乘以体重的变化。

结果

控制体重、生活方式、栖境密度、迁徙等级和纬度跨度之后，9,158 种鸟的外测跗跖对年均温的总斜率接近零（-0.0007，$[-0.0023, +0.0009]$）。零来自两个相反的信号。非雀形目的跗跖在温暖地区更长（$+0.0071$，$[+0.0042, +0.0100]$，3,574 种），雀形目在温暖地区更短（-0.0057，$[-0.0076, -0.0039]$，5,584 种）。先前报告的"大型鸟为正、小型鸟为负"正是这两个信号按体型混在一起的结果，我们按体重分档后，类群之间的差别在每一档内都存在。

分段预测在骨长数据上成立。在 Eliason 等人测量的早成鸟（259 种）中，股骨对温度没有响应（$+0.0002$），胫跗骨居中（$+0.0084$），跗跖骨每升高 10 °C 长 3.8%（$+0.0161$，$[+0.0055, +0.0267]$），比例 r 随温度上升（$+0.0157$，$[+0.0081, +0.0233]$）。Watanabe 的鸭科 90 种给出同样的格局，只有跗跖骨响应（$+0.0137$，$[+0.0010, +0.0265]$），股骨不动（$+0.0029$，$[-0.0058, +0.0117]$），r 为正（$+0.0107$，$[+0.0033, +0.0181]$）。雀形目的 r 在 Eliason 的 383 种中为负（-0.0065，$[-0.0129, -0.0002]$），在 Skelevision 的 1,641 种中同向（-0.0036，$[-0.0066, -0.0007]$）。同一批 Skelevision 数据上的肱骨和尺骨每 10 °C 长 1.5% 到 1.9%，复现了此前报告的翅骨格局，说明温度提取与回归流程没有问题（图 2）。

塑造跗跖骨的散热压力在一个由生活方式构成的选择景观上展开。我们先按发育方式把非雀形目分为腿在巢外生长的暴露组（早成与半早成，1,055 种）和腿在巢内生长的巢内组（半晚成与晚成，2,519 种）。暴露组的跗跖斜率为 $+0.0125$（$[+0.0082, +0.0168]$），巢内组为 $+0.0034$（$[-0.0003, +0.0071]$），之差 $+0.0091$（$[+0.0037, +0.0146]$）。按目拆开，五个早成目的斜率全部为正，十三个晚成或半晚成目全部为零或负，两组之间没有交错。细分为四档后斜率呈单调梯度，从早成的 $+0.0152$ 经半早成的 $+0.0112$ 和半晚成的 $+0.0052$ 降到晚成非雀形目的 -0.0019，再到雀形目的 -0.0057（图 1）。

发育方式本身不是机制。暴露组七成是地栖和水生鸟，加入温度与生活方式的交互后两组之差降到 $+0.0052$（$[-0.0015, +0.0119]$）。两条直接针对雏鸟期热环境的检验都为零。巢内组内部开放巢与洞巢和封闭巢的斜率之差为 $+0.0036$（$[-0.0054, +0.0127]$，1,626 种），留巢天数在各发育方式内部都不改变斜率。成年后腿暴露于环境的程度解释了这条梯度。在非雀形目（3,230 种）中，单独放入发育方式时温度与发育方式的交互为 $+0.0083$（$[+0.0025, +0.0140]$），同时放入成鸟暴露 X 后降到 $+0.0034$（$[-0.0033, +0.0102]$），而温度与 X 的交互为 $+0.0092$（$[+0.0015, +0.0169]$）。同一变量在雀形目内部给出一条连续的梯度，完全树栖或空中觅食的雀形目（$X = 0$）斜率为 -0.0076（$[-0.0101, -0.0052]$），温度与 X 的交互为 $+0.0071$（$[+0.0031, +0.0112]$），完全在地面觅食的雀形目斜率接近零（图 3）。把全部类群按成年后腿的露天程度排列，响应从整天站在露天的雁鸭、鸡形、鸻鹬、鹤和秧鸡的每 10 °C 1.5% 到 3.8%，经中等暴露的鸥、猛禽和鹭的 0.5% 到 1.1%，到树上与空中的鹦鹉、鸽、雨燕和啄木鸟的零，再到把腿缩进腹羽的树栖雀形目的 -0.8% 到 -1.7%（表 1）。

我们同时控制了迁徙策略和体型。斜率在留鸟、部分迁徙和完全迁徙的物种中方向一致，换用最热月最高温或最冷月最低温后格局不变，用分布范围内的盒均值温度替代质心温度后不变，去掉归类不确定的科后不变。按体重分档，露天效应在小于 100 g、100 到 1,000 g 和大于 1,000 g 三档中都存在。种内层面，密歇根大学动物博物馆的 79 种雀形目 998 件标本给出的交互项为 $+0.0006$（$[-0.0278, +0.0289]$），区间宽度是跨物种效应的两倍，现有标本数不足以检出种内效应。

跗跖骨既是散热面也是落地时的承力段，温度造成的加长并不以落地性能为代价。对于露天组，真实腿取早成鸟 259 种的中位数（跗跖骨 50.1 mm，胫跗骨 80.9 mm，股骨 50.6 mm，体重 643 g），去散热腿的跗跖骨短 7.2%，胫跗骨短 3.8%，股骨不变。去散热腿的落地可行率为 32.0%，真实腿为 31.8%，之差 $+0.3$ 个百分点（$[-1.0, +1.6]$），把温度回推到 40 °C 时之差仍为 $+0.2$ 个百分点（$[-1.8, +2.2]$），三种敏感性判据下同样如此（图 4）。次要读数有方向而量很小，温度造成的

加长使峰值加速度降低 0.43 g、腿行程增加 1.2% 腿长，落地略软但不改变可行与否。树栖雀形目的腿按相反方向回推后变长 2.4%，可行率从 29.7% 变为 29.0%（之差 -0.7 个百分点，$[-1.3, -0.1]$）。把同样 7.2% 的缩短量单独放在胫跗骨或股骨上，可行率的变化都在 0.1 个百分点以内，被动落震对这一量级的任何一段长度变化都不敏感。

最后，一个只从数据学习的演化模型重现了响应的方向。模型沿系统发育树预测相邻物种的性状，输入不包含任何关于温度或体型的规律。在留出科的物种上把气候降低 20 °C，模型推出体重随温度变小，每 10 °C 为 -0.0163（露天组）、-0.0220（巢内组）和 -0.0146（雀形目），与同样数据上的系统发育回归（-0.0284，$[-0.0474, -0.0095]$；-0.0429，$[-0.0556, -0.0302]$；-0.0150，$[-0.0217, -0.0084]$）方向一致，两组落在区间内。扣除体重后，模型给出的跗跖响应在露天组为正（$+0.0029$，$[-0.0005, +0.0077]$），在雀形目为负（-0.0072，$[-0.0081, -0.0062]$）且落在回归区间内，雀形目内部的响应随成鸟暴露增加（$+0.0023$，$[+0.0006, +0.0037]$）。模型低估了露天组的效应量，但重现了体重与腿响应的方向格局。

讨论

鸟腿的形态通常被认为由运动塑造，栖枝、行走、奔跑、涉水与起跳对三段的长度和比例各有要求，温度在这些讨论里很少出现。我们的结果表明温度也塑造鸟腿，但只作用在腿的一段上，而且只在腿确实暴露于环境的类群中起作用。温暖气候下跗跖骨更长而股骨不变，这一分段在早成鸟与鸭科两份独立的骨骼数据上一致，与跗跖是腿上主要散热面而股骨包在体壁内的生理事实相符。温度对腿的作用因此不是整条附肢按比例的缩放，而是对裸露段的局部塑形。

我们把温度与跗跖骨长度的关系解释为对散热能力的选择。在温暖地区，站立和涉水的鸟需要更大的裸露面积来释放活动与代谢产生的热，更长的跗跖骨直接增加这一面积。在寒冷地区，同样的面积成为热损失的通道，选择转向更短的跗跖骨。这与散热极限理论的预期一致，即产热与散热的平衡限制了恒温动物在温暖环境中的活动，而扩大散热面是放松这一限制的途径。成年后腿暴露于环境的程度决定选择的强度，这解释了为什么发育方式表面上有效。早成鸟多为地栖和水生，成年后整天站在露天，而雏鸟期的巢型与留巢时长不改变斜率，说明起作用的是成年后的暴露而不是生长期的热环境。先前报告的跗跖响应随体型变化，是这一梯度在体型轴上的投影，露天的地栖水生鸟多为大型，而树栖的雀形目多为小型。

散热需求的差异对气候变暖下的形态响应有直接推论。只有腿暴露于环境的类群才拥有腿上的散热窗口，雁鸭、鸻鹬、鸡形与鹤的跗跖骨可以随升温变长，树栖的鹦鹉、鸽和多数雀形目没有这条通道，它们的散热窗口在翅骨与喙上。已报告的雀形目跗跖在四十年间缩短 2.4%，远大于本文的斜率在同期升温下所能解释的量，更可能来自体型的变化而不是腿上的 Allen 定律。预测哪些类群会以哪种附肢响应升温，需要把每个支系的散热窗口放在同一个框架里。

鸟腿的几何同时受落地力学约束，而我们的仿真表明散热选择在这一约束内有充分的活动空间。温度造成的全部变化范围都落在被动落震的不敏感区内，去掉温度效应的腿与真实腿的落地可行率没有差别，把同样的长度变化放在任何一段上也没有差别。腿上因此不存在翅上那种散热与机动性的权衡，翅骨的加长以飞行敏捷性为代价，而跗跖骨的加长在落地上是自由的。Allen 定律在鸟腿上选择的是热收益最高而力学代价为零的一段，前一半来自跨物种比较，后一半来自力学仿真。

我们的结果对一系列控制稳健，模型中体重、生活方式、栖境密度、迁徙等级和纬度跨度都已纳入，换用不同的温度变量、分布范围内的均温、不同的系统发育树和不同的发育方式编码都不改变格局。树栖雀形目的反向是唯一没有得到解释的部分。加入觅食层与栖境密度后反向只略有减弱，说明它不是栖境的粗糙混杂。可能的解释包括热带森林更密的树冠使温度成为树栖形态的代理，热带小型鸟的裸露皮肤在失水上的代价，以及雀形目把散热窗口让渡给翅与喙之后腿进一步缩进羽毛。三者都可以用现有数据检验。演化模型作为回归之外的独立检查，在未被告知任何规律的条件下重现了体重随温度变小以及腿响应的方向格局，但低估了露天类群的效应量，它的作用是方向上的确认而不是效应量的估计。

先前的研究表明散热需求可以影响取食器官和飞行器官的形态，本文把这一结论扩展到腿，并把作用位置定位在裸露段。散热是塑造鸟腿裸露段的关键机制之一，但它的作用受到两重限制，一是只有腿暴露于环境时选择才存在，二是加长的收益在生物物理上有上限，跗跖骨越长，单位长度新增的散热面越小而重量与支撑成本越高。确定这一上限在哪里，以及种内的可塑性是否沿同一方向，需要带温度梯度的大样本标本和直接的腿部热通量测量。

图表占位

- 图 1　鸟腿三段示意，外测跗跖按发育方式五档的温度斜率，附逐目斜率。
- 图 2　三份独立骨骼数据上的股骨与跗跖骨温度斜率（Eliason 早成鸟、Watanabe 鸭科、Skelevision 雀形目）。
- 图 3　成鸟暴露 X 吸收发育方式（非雀形目）与雀形目内部的梯度。
- 图 4　落震可行率随去散热剂量的变化与次要读数，附分段互换。
- 表 1　按成年后腿露天程度排列的类群梯度。
- 补充　稳健性、种内检验、演化模型读数与系统发育回归的对照。