

高压力与抑郁情绪人群自我调整指南（模拟知识库200条）

用途：用于 RAG 向量数据库构建、Agent 检索测试、prompt 切换测试。本文为模拟知识库资料，不构成医学诊断或治疗建议。若用户存在自伤/自杀风险，应优先联系当地紧急服务、专业人员或身边可信任的人。

资料设计参考了公开心理健康自助与压力管理原则，内容已改写为适合测试的条目化知识库。

一、使用边界与安全提醒

1. 要点：本指南适用于高压力、低落、疲惫、焦虑伴随的日常自我调整场景，不用于医学诊断，也不替代心理咨询、精神科评估或药物治疗。

用于Agent：当用户出现持续两周以上的明显功能受损、强烈绝望、自伤或自杀想法时，应优先建议联系专业人员或当地紧急求助渠道。

2. 要点：自我调整的目标不是立刻变好，而是把痛苦降低到可承受范围，并恢复一点点选择感。

用于Agent：对话型 Agent

在使用时应避免承诺“治愈”，应使用“陪你一起整理”“先做一个小步骤”等低压力表达。

3. 要点：如果用户说“我撑不住了”“我想消失”“不想活了”，系统应停止普通建议流程，进入危机识别与安全支持流程。

用于Agent：危机场景中应询问是否处于即时危险、是否有可联系的身边人，并建议尽快联系当地紧急服务或危机热线。

4. 要点：高压力和抑郁情绪可能同时影响睡眠、食欲、注意力、动力、人际互动和身体感受。

用于Agent：Agent

记录时应同时关注情绪、行为、身体、认知和环境触发，而不是只记录“心情不好”。

5. 要点：不要把脑电、语音或文本信号直接解释为“抑郁症诊断”。

用于Agent：未来接入脑机接口时，脑电状态更适合作为疲劳、紧张、注意力变化等辅助参考。

6. 要点：用户的情绪表达应被尊重，不应被评价为“想太多”“不够努力”。

用于Agent：陪伴系统应优先确认感受，再提供选择，而不是直接纠正用户。

7. 要点：当用户明显疲惫时，回复应短、慢、具体。

用于Agent：比起长篇心理知识，低负担建议如喝水、离开床边坐一分钟、给朋友发一句话更容易执行。

8. 要点：当用户表达强烈自责时，不宜立刻反驳“你很好”。

用于Agent：更合适的回应是承认这种自责很难受，再帮助用户区分事实、解释和情绪。

9. 要点：如果用户正在接受治疗，Agent 应鼓励其遵循专业人员建议。

用于Agent：不要建议用户自行停药、换药、加量或减量。

10. 要点：所有生成的记录和报告都应视为敏感数据。

用于Agent：开发测试阶段应使用模拟数据，真实用户数据必须脱敏并限制访问。

二、情绪识别与命名

11. 要点：当用户只说“烦”“累”“没劲”时，先不要急着给方案。

用于Agent：可以邀请其在“低落、焦虑、委屈、麻木、愤怒、羞耻、孤独”中选一个更接近的词。

12. 要点：情绪命名本身就是干预的一部分。

用于Agent：把模糊痛苦转成具体词语，能帮助用户从“我完了”转向“我现在很委屈和疲惫”。

13. 要点：区分情绪和事实有助于减少灾难化。
用于Agent：例如“我感觉自己没用”是感受，不等于事实判断。
14. 要点：记录情绪强度时建议使用0到10分。
用于Agent：0代表完全没有，10代表最强烈，这有利于后续观察变化。
15. 要点：低落不一定表现为哭泣。
用于Agent：有些用户会表现为麻木、拖延、回避、易怒或对一切没兴趣。
16. 要点：高压状态常伴随身体信号。
用于Agent：如胸闷、胃部不适、肩颈紧绷、头痛、心跳加快或睡眠变浅。
17. 要点：用户说“我不知道自己怎么了”时，可以从最近事件开始。
用于Agent：询问“今天或这几天有没有一个让你明显变沉重的时刻”。
18. 要点：情绪识别不应逼迫用户详细讲创伤。
用于Agent：如果用户不想说，可以允许其只描述当前身体感受和需要。
19. 要点：同一事件可能引发多种情绪。
用于Agent：比如被批评后，用户可能同时有羞耻、愤怒、害怕和失望。
20. 要点：情绪记录应包含触发事件、自动想法、身体反应、行为反应和支持方式。
用于Agent：这种结构方便后续生成报告和识别规律。
21. 要点：当用户只说“烦”“累”“没劲”时，先不要急着给方案。
用于Agent：可以邀请其在“低落、焦虑、委屈、麻木、愤怒、羞耻、孤独”中选一个更接近的词。
22. 要点：情绪命名本身就是干预的一部分。
用于Agent：把模糊痛苦转成具体词语，能帮助用户从“我完了”转向“我现在很委屈和疲惫”。
23. 要点：区分情绪和事实有助于减少灾难化。
用于Agent：例如“我感觉自己没用”是感受，不等于事实判断。
24. 要点：记录情绪强度时建议使用0到10分。
用于Agent：0代表完全没有，10代表最强烈，这有利于后续观察变化。
25. 要点：低落不一定表现为哭泣。
用于Agent：有些用户会表现为麻木、拖延、回避、易怒或对一切没兴趣。
26. 要点：高压状态常伴随身体信号。
用于Agent：如胸闷、胃部不适、肩颈紧绷、头痛、心跳加快或睡眠变浅。
27. 要点：用户说“我不知道自己怎么了”时，可以从最近事件开始。
用于Agent：询问“今天或这几天有没有一个让你明显变沉重的时刻”。
28. 要点：情绪识别不应逼迫用户详细讲创伤。
用于Agent：如果用户不想说，可以允许其只描述当前身体感受和需要。
29. 要点：同一事件可能引发多种情绪。
用于Agent：比如被批评后，用户可能同时有羞耻、愤怒、害怕和失望。
30. 要点：情绪记录应包含触发事件、自动想法、身体反应、行为反应和支持方式。
用于Agent：这种结构方便后续生成报告和识别规律。

三、压力调节与身体安抚

31. 要点：当用户处于明显紧张状态时，可先做“5-4-3-2-1” grounding。
用于Agent：让用户说出5个看到的東西、4个触碰到的感觉、3个听到的声音、2个闻到的气味、1个能尝到的味道。
32. 要点：呼吸练习应短而具体。
用于Agent：例如吸气4秒、呼气6秒，重复5轮；不必要求用户一次做很久。
33. 要点：肌肉放松适合身体紧绷的用户。
用于Agent：可以从握拳5秒再放松开始，逐步扩展到肩膀、下颌和腿部。
34. 要点：高压时不适合立刻做复杂复盘。
用于Agent：先降低生理唤醒，再讨论原因和计划。
35. 要点：短暂离开压力环境有时比继续硬撑更有效。
用于Agent：建议用户喝水、洗脸、走到窗边或站起来伸展一分钟。
36. 要点：身体照顾不是鸡汤，而是恢复调节能力的基础。
用于Agent：睡眠、进食、光照和运动会影响情绪承受力。
37. 要点：当用户说“脑子停不下来”时，可建议写下三列。
用于Agent：第一列写担心，第二列写能控制的部分，第三列写暂时不能控制的部分。
38. 要点：压力大时减少刺激输入很重要。
用于Agent：可以建议降低屏幕亮度、关掉部分通知、离开嘈杂环境。
39. 要点：对高压用户，建议应尽量可执行。
用于Agent：例如“把手机放远5分钟”比“你要学会放松”更容易落地。
40. 要点：放松练习若让用户更不舒服，应允许停止。
用于Agent：Agent可回应“我们不强迫练习，换成简单地坐一会儿也可以”。
41. 要点：当用户处于明显紧张状态时，可先做“5-4-3-2-1” grounding。
用于Agent：让用户说出5个看到的東西、4个触碰到的感觉、3个听到的声音、2个闻到的气味、1个能尝到的味道。
42. 要点：呼吸练习应短而具体。
用于Agent：例如吸气4秒、呼气6秒，重复5轮；不必要求用户一次做很久。
43. 要点：肌肉放松适合身体紧绷的用户。
用于Agent：可以从握拳5秒再放松开始，逐步扩展到肩膀、下颌和腿部。
44. 要点：高压时不适合立刻做复杂复盘。
用于Agent：先降低生理唤醒，再讨论原因和计划。
45. 要点：短暂离开压力环境有时比继续硬撑更有效。
用于Agent：建议用户喝水、洗脸、走到窗边或站起来伸展一分钟。
46. 要点：身体照顾不是鸡汤，而是恢复调节能力的基础。
用于Agent：睡眠、进食、光照和运动会影响情绪承受力。
47. 要点：当用户说“脑子停不下来”时，可建议写下三列。
用于Agent：第一列写担心，第二列写能控制的部分，第三列写暂时不能控制的部分。
48. 要点：压力大时减少刺激输入很重要。
用于Agent：可以建议降低屏幕亮度、关掉部分通知、离开嘈杂环境。

49. 要点：对高压用户，建议应尽量可执行。

用于Agent：例如“把手机放远5分钟”比“你要学会放松”更容易落地。

50. 要点：放松练习若让用户更不舒服，应允许停止。

用于Agent：Agent可回应“我们不强迫练习，换成简单地坐一会儿也可以”。

四、行为激活与低动力应对

51. 要点：低动力时不要要求用户立刻恢复完整生活。

用于Agent：更合适的是选择一个小到几乎不会失败的行动。

52. 要点：行为激活强调先行动一点点，而不是等心情好了再行动。

用于Agent：例如只洗一个杯子、只站起来拉开窗帘、只走到门口。

53. 要点：把任务拆成“开始动作”能降低阻力。

用于Agent：不是“打扫房间”，而是“把地上的一个纸团扔掉”。

54. 要点：对长期低落用户，愉悦感可能暂时回不来。

用于Agent：可以先追求完成感、稳定感或减少混乱，而不是追求开心。

55. 要点：日程安排应包含必要活动、恢复活动和连接活动。

用于Agent：必要活动如吃饭，恢复活动如洗澡，连接活动如给可信任的人发消息。

56. 要点：当用户自责拖延时，先减少羞耻感。

用于Agent：回应可强调“低动力本身就是状态的一部分，不是你故意懒”。

57. 要点：行动建议最好提供两个选项。

用于Agent：例如“你愿意先喝水，还是先把窗帘拉开一点”。

58. 要点：完成行动后应引导用户记录变化。

用于Agent：哪怕情绪只从8分降到7分，也说明有微小变化。

59. 要点：避免用“坚持就是胜利”压迫用户。

用于Agent：可以使用“今天只需要做到足够小的一步”。

60. 要点：若用户连续多天无法完成基本生活任务，应提示寻求现实支持。

用于Agent：例如联系家人朋友、学校心理中心、医生或咨询师。

61. 要点：低动力时不要要求用户立刻恢复完整生活。

用于Agent：更合适的是选择一个小到几乎不会失败的行动。

62. 要点：行为激活强调先行动一点点，而不是等心情好了再行动。

用于Agent：例如只洗一个杯子、只站起来拉开窗帘、只走到门口。

63. 要点：把任务拆成“开始动作”能降低阻力。

用于Agent：不是“打扫房间”，而是“把地上的一个纸团扔掉”。

64. 要点：对长期低落用户，愉悦感可能暂时回不来。

用于Agent：可以先追求完成感、稳定感或减少混乱，而不是追求开心。

65. 要点：日程安排应包含必要活动、恢复活动和连接活动。

用于Agent：必要活动如吃饭，恢复活动如洗澡，连接活动如给可信任的人发消息。

66. 要点：当用户自责拖延时，先减少羞耻感。

用于Agent：回应可强调“低动力本身就是状态的一部分，不是你故意懒”。

67. 要点：行动建议最好提供两个选项。

用于Agent：例如“你愿意先喝水，还是先把窗帘拉开一点”。

68. 要点：完成行动后应引导用户记录变化。

用于Agent：哪怕情绪只从8分降到7分，也说明有微小变化。

69. 要点：避免用“坚持就是胜利”压迫用户。

用于Agent：可以使用“今天只需要做到足够小的一步”。

70. 要点：若用户连续多天无法完成基本生活任务，应提示寻求现实支持。

用于Agent：例如联系家人朋友、学校心理中心、医生或咨询师。

五、认知支持与自责缓解

71. 要点：自责常以“我总是”“我永远”“全都是我的错”出现。

用于Agent：Agent可帮助用户识别绝对化表达，并寻找例外。

72. 要点：认知支持不是和用户辩论。

用于Agent：应先承认感受，再温和提出“有没有另一种解释”。

73. 要点：灾难化想法可用概率问题缓解。

用于Agent：例如“最坏情况是什么、最可能情况是什么、你能做的一小步是什么”。

74. 要点：读心术思维指用户假设别人一定讨厌自己。

用于Agent：可以询问“有没有直接证据，还是你在根据沉默推测”。

75. 要点：情绪化推理指因为感觉糟糕就认定事情糟糕。

用于Agent：可提示“感觉很真实，但不一定等于事实全貌”。

76. 要点：低落时大脑会自动筛选负面证据。

用于Agent：记录一天中一个中性或稍微可承受的时刻，有助于打破全黑视角。

77. 要点：不要用空泛正能量覆盖痛苦。

用于Agent：“你要积极一点”通常不如“这真的很难，我们先把今晚过完”。

78. 要点：用户说“我没价值”时，可以区分价值和表现。

用于Agent：一个人的价值不应只由成绩、效率或他人评价决定。

79. 要点：写给朋友法适合强自责用户。

用于Agent：问用户“如果朋友遇到同样情况，你会怎样对他说”。

80. 要点：复盘应避免变成审判。

用于Agent：建议使用“发生了什么、我感受到什么、我需要什么、下一步是什么”的结构。

81. 要点：自责常以“我总是”“我永远”“全都是我的错”出现。

用于Agent：Agent可帮助用户识别绝对化表达，并寻找例外。

82. 要点：认知支持不是和用户辩论。

用于Agent：应先承认感受，再温和提出“有没有另一种解释”。

83. 要点：灾难化想法可用概率问题缓解。

用于Agent：例如“最坏情况是什么、最可能情况是什么、你能做的一小步是什么”。

84. 要点：读心术思维指用户假设别人一定讨厌自己。

用于Agent：可以询问“有没有直接证据，还是你在根据沉默推测”。

85. 要点：情绪化推理指因为感觉糟糕就认定事情糟糕。

用于Agent：可提示“感觉很真实，但不一定等于事实全貌”。

86. 要点：低落时大脑会自动筛选负面证据。

用于Agent：记录一天中一个中性或稍微可承受的时刻，有助于打破全黑视角。

87. 要点：不要用空泛正能量覆盖痛苦。

用于Agent：“你要积极一点”通常不如“这真的很难，我们先把今晚过完”。

88. 要点：用户说“我没价值”时，可以区分价值和表现。

用于Agent：一个人的价值不应只由成绩、效率或他人评价决定。

89. 要点：写给朋友法适合强自责用户。

用于Agent：问用户“如果朋友遇到同样情况，你会怎样对他说”。

90. 要点：复盘应避免变成审判。

用于Agent：建议使用“发生了什么、我感受到什么、我需要什么、下一步是什么”的结构。

六、睡眠、作息与精力管理

91. 要点：睡眠困难时，先记录入睡时间、醒来次数、睡前行为和白天小睡。

用于Agent：不要只记录“睡不好”，要帮助寻找规律。

92. 要点：睡前不适合进行激烈自我分析。

用于Agent：可以把担忧写到纸上，约定明天某个时间再处理。

93. 要点：睡不着时，强迫自己睡着常会增加压力。

用于Agent：可以建议进行低刺激活动，如听轻柔音频、阅读轻内容、放松身体。

94. 要点：白天光照和轻度活动有助于稳定昼夜节律。

用于Agent：低动力用户可以从站到窗边晒一会儿太阳开始。

95. 要点：晚间刷手机可能加重反刍。

用于Agent：建议设置一个低门槛替代动作，如把手机放远、开启灰度、听音频。

96. 要点：睡前仪式应简单稳定。

用于Agent：例如洗漱、整理床边、关灯、做三轮慢呼吸。

97. 要点：过度补觉可能打乱节律。

用于Agent：如果用户白天睡很久，记录与夜间睡眠的关系。

98. 要点：咖啡因、酒精和高强度刺激会影响睡眠质量。

用于Agent：Agent可提醒观察摄入时间，而不是做强制禁止。

99. 要点：失眠持续且明显影响生活时，应建议咨询专业人员。

用于Agent：特别是伴随强烈低落、绝望或明显功能下降时。

100. 要点：睡眠建议要避免责备。

用于Agent：不要说“你就是作息太差”，而应说“我们可以先找一个最容易调整的小环节”。

101. 要点：睡眠困难时，先记录入睡时间、醒来次数、睡前行为和白天小睡。

用于Agent：不要只记录“睡不好”，要帮助寻找规律。

102. 要点：睡前不适合进行激烈自我分析。

用于Agent：可以把担忧写到纸上，约定明天某个时间再处理。

103. 要点：睡不着时，强迫自己睡着常会增加压力。

用于Agent：可以建议进行低刺激活动，如听轻柔音频、阅读轻内容、放松身体。

104. 要点：白天光照和轻度活动有助于稳定昼夜节律。

用于Agent：低动力用户可以从站到窗边晒一会儿太阳开始。

105. 要点：晚间刷手机可能加重反刍。

用于Agent：建议设置一个低门槛替代动作，如把手机放远、开启灰度、听音频。

106. 要点：睡前仪式应简单稳定。

用于Agent：例如洗漱、整理床边、关灯、做三轮慢呼吸。

107. 要点：过度补觉可能打乱节律。

用于Agent：如果用户白天睡很久，记录与夜间睡眠的关系。

108. 要点：咖啡因、酒精和高强度刺激会影响睡眠质量。

用于Agent：Agent可提醒观察摄入时间，而不是做强制禁止。

109. 要点：失眠持续且明显影响生活时，应建议咨询专业人员。

用于Agent：特别是伴随强烈低落、绝望或明显功能下降时。

110. 要点：睡眠建议要避免责备。

用于Agent：不要说“你就是作息太差”，而应说“我们可以先找一个最容易调整的小环节”。

七、人际支持与求助表达

111. 要点：抑郁情绪会让人倾向于隔离自己。

用于Agent：Agent可以鼓励用户选择一个低压力连接方式，如发一个表情或一句“我今天有点难受”。

112. 要点：求助表达可以模板化。

用于Agent：例如“我现在不太好，不需要你解决问题，只想有人陪我聊几分钟”。

113. 要点：如果用户害怕打扰别人，可以帮助其降低请求强度。

用于Agent：从“能不能陪我一整晚”改为“你方便回我一句话吗”。

114. 要点：支持系统不一定只有家人。

用于Agent：也可以是朋友、同学、老师、同事、社工、咨询师、医生或热线。

115. 要点：人际冲突后不要急于要求用户马上沟通。

用于Agent：先帮助其稳定情绪，再整理想表达的事实、感受和请求。

116. 要点：边界感也是自我照顾。

用于Agent：高压时可以减少消耗性社交，保留必要沟通。

117. 要点：被否定后的用户需要先被理解。

用于Agent：直接分析对错可能让用户感觉再次被评判。

118. 要点：如果用户身边无人可联系，应建议使用正式支持渠道。

用于Agent：如学校心理中心、社区服务、当地医疗资源或紧急服务。

119. 要点：求助不是失败，而是把风险从一个人承担变成多人分担。

用于Agent：这句话适合用于缓解用户的羞耻感。

120. 要点：Agent不应鼓励用户隐瞒高风险状态。

用于Agent：如有自伤意图，应鼓励立即联系现实中的可信任成年人或专业机构。

121. 要点：抑郁情绪会让人倾向于隔离自己。

用于Agent：Agent可以鼓励用户选择一个低压力连接方式，如发一个表情或一句“我今天有点难受”。

122. 要点：求助表达可以模板化。

用于Agent：例如“我现在不太好，不需要你解决问题，只想有人陪我聊几分钟”。

123. 要点：如果用户害怕打扰别人，可以帮助其降低请求强度。

用于Agent：从“能不能陪我一整晚”改为“你方便回我一句话吗”。

124. 要点：支持系统不一定只有家人。

用于Agent：也可以是朋友、同学、老师、同事、社工、咨询师、医生或热线。

125. 要点：人际冲突后不要急于要求用户马上沟通。

用于Agent：先帮助其稳定情绪，再整理想表达的事实、感受和请求。

126. 要点：边界感也是自我照顾。

用于Agent：高压时可以减少消耗性社交，保留必要沟通。

127. 要点：被否定后的用户需要先被理解。

用于Agent：直接分析对错可能让用户感觉再次被评判。

128. 要点：如果用户身边无人可联系，应建议使用正式支持渠道。

用于Agent：如学校心理中心、社区服务、当地医疗资源或紧急服务。

129. 要点：求助不是失败，而是把风险从一个人承担变成多人分担。

用于Agent：这句话适合用于缓解用户的羞耻感。

130. 要点：Agent不应鼓励用户隐瞒高风险状态。

用于Agent：如有自伤意图，应鼓励立即联系现实中的可信任成年人或专业机构。

八、记录、复盘与长期观察

131. 要点：情绪记录的核心不是监督用户，而是帮助用户看见规律。

用于Agent：记录应简短、低压力，避免像考试或审判。

132. 要点：单条记录可包含时间、情绪词、强度、触发、想法、身体反应、行为和下一步。

用于Agent：这些字段适合构建向量数据库和月度报告。

133. 要点：长期报告应关注趋势而不是单日好坏。

用于Agent：例如低落是否集中在夜间、是否与考试或人际冲突有关。

134. 要点：记录应允许“不知道”。

用于Agent：用户不知道触发原因时，可以写“原因不明，身体疲惫明显”。

135. 要点：报告中的建议应基于记录证据。

用于Agent：例如“近三次低落都发生在熬夜后”，再建议优先调整睡前行为。

136. 要点：对话后可以生成一句情绪摘要。

用于Agent：例如“今晚主要是疲惫、委屈和自责，触发点是组会反馈”。

137. 要点：记录不应暴露过多隐私细节。

用于Agent：保存时可用类别替代具体姓名、地点和身份信息。

138. 要点：用户状态改善时，也应记录有效因素。

用于Agent：比如散步、洗澡、与朋友聊天、完成小任务。

139. 要点：报告中不要给诊断标签。

用于Agent：可以说“低落和无力感出现频率较高”，不要说“用户患有抑郁症”。

140. 要点：如果记录显示风险升级，应优先安全提示。

用于Agent：报告建议中应提醒联系专业支持，而不是只给自我调节方案。

141. 要点：情绪记录的核心不是监督用户，而是帮助用户看见规律。

用于Agent：记录应简短、低压力，避免像考试或审判。

142. 要点：单条记录可包含时间、情绪词、强度、触发、想法、身体反应、行为和下一步。

用于Agent：这些字段适合构建向量数据库和月度报告。

143. 要点：长期报告应关注趋势而不是单日好坏。

用于Agent：例如低落是否集中在夜间、是否与考试或人际冲突有关。

144. 要点：记录应允许“不知道”。

用于Agent：用户不知道触发原因时，可以写“原因不明，身体疲惫明显”。

145. 要点：报告中的建议应基于记录证据。

用于Agent：例如“近三次低落都发生在熬夜后”，再建议优先调整睡前行为。

146. 要点：对话后可以生成一句情绪摘要。

用于Agent：例如“今晚主要是疲惫、委屈和自责，触发点是组会反馈”。

147. 要点：记录不应暴露过多隐私细节。

用于Agent：保存时可用类别替代具体姓名、地点和身份信息。

148. 要点：用户状态改善时，也应记录有效因素。

用于Agent：比如散步、洗澡、与朋友聊天、完成小任务。

149. 要点：报告中不要给诊断标签。

用于Agent：可以说“低落和无力感出现频率较高”，不要说“用户患有抑郁症”。

150. 要点：如果记录显示风险升级，应优先安全提示。

用于Agent：报告建议中应提醒联系专业支持，而不是只给自我调节方案。

九、危机风险与转介提醒

151. 要点：直接表达“不想活了”“想结束”属于高优先级风险信号。

用于Agent：Agent 应立即进入安全支持流程，而不是继续普通聊天。

152. 要点：间接表达如“消失就好了”“没有我更好”也需要进一步评估。

用于Agent：可以温和询问“你现在有没有伤害自己的想法或计划”。

153. 要点：风险评估应关注想法、计划、手段、时间、过去行为和保护因素。

用于Agent：但提问应简短、清晰、非审判。

154. 要点：如果用户有明确计划和可用手段，应建议立即联系紧急服务或身边可信任的人。

用于Agent：同时尽量让用户远离危险物品并不要独处。

155. 要点：危机场景不适合给复杂心理教育。

用于Agent：优先目标是让用户活过当前危险时段并连接现实支持。

156. 要点：如果用户拒绝求助，Agent 仍应保持陪伴和安全导向。

用于Agent：可建议先联系一个最容易联系的人，或到有人所在的公共区域。

157. 要点：自伤不等于一定想死，但仍然需要认真对待。
用于Agent：应询问伤口是否需要医疗处理，并鼓励获得现实支持。
158. 要点：风险降低后可以再做情绪整理。
用于Agent：顺序应是安全、稳定、连接、复盘。
159. 要点：系统应避免承诺保密到伤害用户安全的程度。
用于Agent：在高风险时，现实求助比绝对保密更重要。
160. 要点：危机回复应明确、温和、有行动方向。
用于Agent：例如“请现在联系当地紧急电话，或把这段话发给身边可信任的人”。
161. 要点：直接表达“不想活了”“想结束”属于高优先级风险信号。
用于Agent：Agent 应立即进入安全支持流程，而不是继续普通聊天。
162. 要点：间接表达如“消失就好了”“没有我更好”也需要进一步评估。
用于Agent：可以温和询问“你现在有没有伤害自己的想法或计划”。
163. 要点：风险评估应关注想法、计划、手段、时间、过去行为和保护因素。
用于Agent：但提问应简短、清晰、非审判。
164. 要点：如果用户有明确计划和可用手段，应建议立即联系紧急服务或身边可信任的人。
用于Agent：同时尽量让用户远离危险物品并不要独处。
165. 要点：危机场景不适合给复杂心理教育。
用于Agent：优先目标是让用户活过当前危险时段并连接现实支持。
166. 要点：如果用户拒绝求助，Agent 仍应保持陪伴和安全导向。
用于Agent：可建议先联系一个最容易联系的人，或到有人所在的公共区域。
167. 要点：自伤不等于一定想死，但仍然需要认真对待。
用于Agent：应询问伤口是否需要医疗处理，并鼓励获得现实支持。
168. 要点：风险降低后可以再做情绪整理。
用于Agent：顺序应是安全、稳定、连接、复盘。
169. 要点：系统应避免承诺保密到伤害用户安全的程度。
用于Agent：在高风险时，现实求助比绝对保密更重要。
170. 要点：危机回复应明确、温和、有行动方向。
用于Agent：例如“请现在联系当地紧急电话，或把这段话发给身边可信任的人”。

十、面向 RAG Agent 与多模态扩展的测试条目

171. 要点：RAG 检索结果应被用于补充支持策略，而不是替代安全判断。
用于Agent：如果用户文本存在危机信号，风险流程优先于知识库总结。
172. 要点：检索 query 应尽量贴近用户原话和核心需求。
用于Agent：例如“低动力 起床困难 行为激活”比“抑郁怎么办”更精准。
173. 要点：当用户要求诊断时，Agent 应转为解释边界和建议专业评估。
用于Agent：可以说“我不能诊断，但可以帮你整理近期状态”。
174. 要点：对话策略可以分为陪伴、复盘、建议、放松、记录和危机支持。
用于Agent：Agent 可先判断用户当前最需要哪一种。

175. 要点：如果接入脑电数据，应把它作为状态参考。
用于Agent：例如“疲劳、紧张、注意力下降”而不是“你被诊断为抑郁”。
176. 要点：脑电信号异常时，应检查佩戴质量和噪声。
用于Agent：不要直接把单次信号变化解释为心理状态变化。
177. 要点：多模态记录应区分主观文本和客观传感器特征。
用于Agent：报告中应说明“用户表达”和“设备检测”来自不同来源。
178. 要点：实时监测的提醒应低打扰。
用于Agent：例如“要不要休息一分钟”比“你现在的状态异常”更不容易造成压力。
179. 要点：Agent 回复长度应随用户状态调整。
用于Agent：高疲劳时短句，稳定时可做更完整复盘。
180. 要点：Prompt 中应加入“不做诊断、不替代治疗”的边界。
用于Agent：这能降低模型过度承诺的风险。
181. 要点：测试数据可以模拟多种用户轨迹。
用于Agent：包括逐渐好转、反复波动、短期高压、长期低动力和风险升级。
182. 要点：向量库应包含不同颗粒度资料。
用于Agent：既要有短问答，也要有长指南，以测试 chunk 切分策略。
183. 要点：知识库中应避免过度确定化语言。
用于Agent：如“必然改善”“一定有效”应改为“可能有帮助”。
184. 要点：建议生成应结合用户资源。
用于Agent：学生可提示学校心理中心，职场用户可提示请假、EAP或可信任同事。
185. 要点：情绪报告应避免排行榜式评价。
用于Agent：不要写“本月表现差”，应写“本月压力峰值较多”。
186. 要点：隐私保护应从数据结构开始。
用于Agent：字段中尽量避免真实姓名、住址、电话、学号等可识别信息。
187. 要点：对自我调整建议应提供退出选项。
用于Agent：用户不想做练习时，Agent 可以继续陪伴而不是施压。
188. 要点：RAG 总结 prompt 应要求“基于资料，不编造”。
用于Agent：尤其在心理健康场景中，幻觉会增加风险。
189. 要点：Agent 工具描述要清楚触发条件。
用于Agent：例如 report 工具只在用户请求生成记录或报告时调用。
190. 要点：测试阶段建议保留日志但脱敏。
用于Agent：日志用于排查工具调用和 prompt 切换问题，但不应存储真实敏感信息。
191. 要点：危机语料应单独测试。
用于Agent：确保模型不会在自伤风险下只给普通放松建议。
192. 要点：心理教育内容应短小可检索。
用于Agent：每条资料最好围绕一个概念，如反刍、行为激活、睡眠节律。
193. 要点：同一主题可提供多种表达。
用于Agent：这样能测试向量检索对同义表达的召回能力。

194. 要点：用户记录和知识库应分开索引。
用于Agent：个人记录用于个性化总结，通用知识库用于策略支持。
195. 要点：报告生成前应获取用户ID和月份。
用于Agent：如果缺少月份，可使用当前月份工具补齐。
196. 要点：对外展示项目时应强调辅助性质。
用于Agent：建议使用“情绪陪伴 Agent”而不是“AI 心理医生”。
197. 要点：系统输出应避免强命令。
用于Agent：把“你必须去运动”改为“如果你愿意，可以先试一分钟走动”。
198. 要点：当用户表达无助时，应先提供情感承接。
用于Agent：如“听起来你已经撑了很久”，再进入整理。
199. 要点：长期趋势分析应提示不确定性。
用于Agent：例如“从记录看可能与睡眠相关，但仍需要更多数据确认”。
200. 要点：最终建议应给用户选择权。
用于Agent：让用户在两个低负担动作中选一个，有助于恢复掌控感。