

曲面积分的导数

定理: 设 Σ 是一个曲面, \mathbf{f} 是一个向量场, 则

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \int_{\Sigma_t} \mathbf{f}(t, \mathbf{x}) \cdot d\mathbf{S} &= \int_{\Sigma_t} \left(\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{f} - (\mathbf{f} \cdot \nabla) \mathbf{v} + (\nabla \cdot \mathbf{v}) \mathbf{f} \right) d\mathbf{S} \\ &= \int_{\Sigma_t} \left(\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial t} + \nabla \times (\mathbf{f} \times \mathbf{v}) + (\nabla \cdot \mathbf{f}) \mathbf{v} \right) d\mathbf{S}. \end{aligned}$$

证明: 在 $t = t_0$ 处求导, 对重积分的导数的证明中已得

$$\left. \frac{\partial y_i}{\partial x_j} \right|_{t=t_0} = \delta_{ij}, \quad \left. \frac{\partial^2 y_i}{\partial x_j \partial t} \right|_{t=t_0} = \frac{\partial v_i}{\partial x_j}.$$

因此,

$$\begin{aligned} \int_{\Sigma_t} \mathbf{f}(t, \mathbf{x}) \cdot d\mathbf{S} &= \frac{1}{2} \int_{\Sigma_t} \epsilon_{ijk} f_i(t, \mathbf{x}) dx_j \wedge dx_k \\ &= \frac{1}{2} \int_{\Sigma_{t_0}} \epsilon_{ijk} f_i(t, \mathbf{y}(t, \mathbf{x})) \frac{\partial y_j(t, \mathbf{x})}{\partial x_a} \frac{\partial y_k(t, \mathbf{x})}{\partial x_b} dx_a \wedge dx_b, \\ \left. \frac{d}{dt} \int_{\Sigma_t} \mathbf{f}(t, \mathbf{x}) \cdot d\mathbf{S} \right|_{t=t_0} &= \frac{1}{2} \int_{\Sigma_{t_0}} \epsilon_{ijk} \left(\left(\frac{\partial f_i}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) f_i \right) \delta_{ja} \delta_{kb} + f_i \frac{\partial v_j}{\partial x_a} \delta_{kb} + f_i \delta_{ja} \frac{\partial v_k}{\partial x_b} \right) dx_a \wedge dx_b. \end{aligned}$$

由于

$$\begin{aligned} &\frac{1}{2} \epsilon_{abc} \epsilon_{ijk} \left(\left(\frac{\partial f_i}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) f_i \right) \delta_{ja} \delta_{kb} + f_i \frac{\partial v_j}{\partial x_a} \delta_{kb} + f_i \delta_{ja} \frac{\partial v_k}{\partial x_b} \right) \\ &= \frac{1}{2} \epsilon_{abc} \epsilon_{ijk} \left(\frac{\partial f_i}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) f_i \right) \delta_{ja} \delta_{kb} + \frac{1}{2} \epsilon_{abc} \epsilon_{ijk} f_i \frac{\partial v_j}{\partial x_a} \delta_{kb} + \frac{1}{2} \epsilon_{abc} \epsilon_{ijk} f_i \delta_{ja} \frac{\partial v_k}{\partial x_b} \\ &= \frac{1}{2} \epsilon_{abc} \epsilon_{iab} \left(\frac{\partial f_i}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) f_i \right) + \frac{1}{2} \epsilon_{abc} \epsilon_{ijb} f_i \frac{\partial v_j}{\partial x_a} + \frac{1}{2} \epsilon_{abc} \epsilon_{iak} f_i \frac{\partial v_k}{\partial x_b} \\ &= \frac{\partial f_c}{\partial t} + v_k \frac{\partial f_c}{\partial x_k} - f_k \frac{\partial v_c}{\partial x_k} + f_c \frac{\partial v_k}{\partial x_k}, \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} \left. \frac{d}{dt} \int_{\Sigma_t} \mathbf{f}(t, \mathbf{x}) \cdot d\mathbf{S} \right|_{t=t_0} &= \int_{\Sigma} \left(\frac{\partial f_c}{\partial t} + v_k \frac{\partial f_c}{\partial x_k} - f_k \frac{\partial v_c}{\partial x_k} + f_c \frac{\partial v_k}{\partial x_k} \right) n_c dS \\ &= \int_{\Sigma} \left(\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{f} - (\mathbf{f} \cdot \nabla) \mathbf{v} + (\nabla \cdot \mathbf{v}) \mathbf{f} \right) \cdot d\mathbf{S}. \end{aligned}$$