

PREPARACION PARA EL ESTUDIO DE CAPSULA ENDOSCOPICA (pacientes ambulatorios)

Para la realización del estudio deberá concurrir a: Vicente Zapata 63 (ciudad)
Tel: 44059000 interno 1045.

Fecha del estudio: ____/____/____

DIA PREVIO AL ESTUDIO (SOLO DIETA LIQUIDA)

- Desde el desayuno, puede tomar todo el líquido que desee (caldo de verduras colado, manzana rallada, gelatina, jugos normales o dietéticos, café, té, mate cocido (SIN leche), con azúcar o edulcorante.
- Debe ingerir **ALIMENTOS LIQUIDOS SOLAMENTE**.
- Debe suspender toda medicación oral a las 20 hs.

8:00 horas del día previo al estudio

- Comenzar con la toma de Factor AG pediátrico (gotas). Disolver 40 gotas en medio vaso de agua. Repetir lo mismo cada 8 horas, o sea a las 16: 00 horas y medianoche. (en total 3 tomas)

DIA DEL ESTUDIO

- NO desayunar ni tomar medicamentos habituales.

7:00 horas

- Disolver 80 gotas de Factor AG pediátrico en un vaso de agua y beberlo.
- Preparar el bidón de 4lts de Barex (es para que la capsula navegue por el intestino delgado, no para evacuación) y tomar solo dos litros de este preparado dos horas previas de la citación del turno.

Esta preparación está diseñada para lograr que el intestino delgado contenga un líquido que permita una clara visión de la capsula. No es solo un laxante.

POR FAVOR NO OLVIDE

- ⇒ Concurrir con ropa holgada de dos piezas.
- ⇒ Rasurar desde el ombligo hasta la pelvis y torax si la misma presenta abundante cuero cabelludo.
- ⇒ No aplique en el vientre lociones, talcos o cremas.
- ⇒ El buen resultado de su estudio está condicionado al estricto cumplimiento de las indicaciones.

LUEGO DE LA INGESTA DE LA CAPSULA

- *NO tomar ni leche, ni jugos SOLO AGUA durante las primeras 4 hs, luego se pueden ingerir líquidos como sopas y tomar medicación si el paciente estuviese con la misma.*
- *NO debe realizar ejercicio.*
- *SI puede llevar su vida normal sin levantar peso ni ejercitarse.*
- *NO debe usar almohadillas térmicas. Mantenerse alejado de resonadores y equipos de rayos.*
- *SI puede usar teléfonos celulares, computadoras y radios.*
- *La duración del examen es de 8 hs aproximadamente. Si durante el procedimiento presenta dolor abdominal, náuseas o vómitos, póngase en contacto con el médico.*