TÜBİTAK 2204-C KUTUP ARAŞTIRMALARI PROJE RAPORU

Proje Ana Alanı: Kutup Araştırmaları (Biyoloji ve Ekoloji) | Proje Tematik Alanı: Kutup Biyoçeşitliliği ve Ekosistem Dinamikleri

MaxEnt Algoritması ve CMIP6 İklim Senaryoları Kullanılarak Marguerite Körfezi'nde (Batı Antarktika) Adélie Pengueni (*Pygoscelis adeliae*) Potansiyel Habitat Uygunluğunun ve İklim Değişim Eğilimlerinin Modellenmesi

Özet

Batı Antarktika Yarımadası, 20. yüzyılın ikinci yarısında 50 yıllık süreçte yaklaşık 2.5°C'lik (on yılda ~0.5°C) sıcaklık artışıyla yeryüzünün en hızlı bölgesel ısınma yaşayan sahalarından biridir (Vaughan vd., 2003). Bu çalışmada, deniz buzu zorunlu (sea-ice obligate) tepe avcı ve kutup biyo-indikatörü olan Adélie pengueninin (*Pygoscelis adeliae*), Batı Antarktika Yarımadası'ndaki (WAP) Marguerite Körfezi sahasında (65.88°–70.63°G, 63.88°–73.13°B) günümüz habitat uygunluğu mezo-ölçekte modellenmiş; CMIP6 iklim projeksiyonu altında 2050 yılı olası çevresel değişim eğilimleri keşifsel düzeyde incelenmiştir. GBIF ve SCAR veri tabanlarından derlenen türün yaşam döngüsündeki genel bulunuş (üreme kolonileri ve neritik beslenme gözlemleri), 0.25° grid ölçeğinde mekânsal inceltme uygulanarak örnekleme yığılmasından arındırılmış ve 67 adet bağımsız varlık hücresi elde edilmiştir. Çevresel katman olarak ECMWF ERA5 yeniden analizlerinden yıllık ortalama deniz buzu konsantrasyonu (*buz_yillik*), deniz yüzeyi sıcaklığı (*sst_yillik*), en sıcak çeyrek toplam yağışı (*bio18*) ve REMA modelinden çıplak kaya yüzdesi (*kaya*) üretilmiştir.

Maksimum Entropi (MaxEnt 3.4.4) algoritmasıyla yürütülen 10 katlı çapraz doğrulamada **0.768 ± 0.111** test AUC ve 0.838 eğitim AUC değeri elde edilmiştir. Permütasyon öneminde modelin birincil belirleyicisi **%55.6** ile yıllık deniz buzu konsantrasyonu olmuş; bunu deniz yüzeyi sıcaklığı (**%18.3**), yaz mevsimi yağışı (**%17.1**) ve çıplak kaya alanı (**%9.1**) izlemiştir. Çevresel tepki eğrileri, türün en yüksek uygunluğa %20–%25 marjinal buz konsantrasyonunda, -1.94°C su sıcaklığında ve 184 mm yaz yağışında ulaştığını göstermiştir. Buz konsantrasyonu arttıkça uygunluk kademeli düşerek %60.8'de 0.154 ile taban seviyesine inmekte; kapalı kütlesel buz örtüsünde dalış erişiminin kısıtlanmasını yansıtmaktadır.

Roberts vd. (2017) yaklaşımıyla uygulanan 4 enlem bandı mekânsal blok çapraz doğrulaması (Spatial Block CV), ana modelin (AUTO/RM1, LQTH) test AUC değerinin **0.477'ye (rastgele tahmin eşiğinin altına)** gerilediğini ve omission oranının %56.7'ye çıktığını belgeleyerek karmaşık kutup modellerinde coğrafi aktarılabilirlik kısıtlarının açıkça kabul edilmesinin zorunluluğunu ortaya koymuştur. CMIP6 IPSL-CM6A-LR SSP2-4.5 (2041–2060) delta projeksiyonunda, 703 grid hücresinin **297 adedinde (%42.2)** uygunluk azalması, **163 adedinde (%23.2)** kararlılık, **243 adedinde (%34.6)** ise deniz buzu incelmesine bağlı kuramsal uygunluk artışı belirlenmiştir. Ancak iklim delta anomalisinin GCM'in ~1° kaba çözünürlüğünü taşıması, hücrelerin %50.8'inde clamping görülmesi ve George VI Boğazı'nın kalıcı şelf buzuyla kaplı olması sebebiyle artış alanları kesin bir 'sığınak' sayılamaz; Ulusal Antarktika Bilim Seferleri (TAE) kapsamında sahada doğrulanması gereken birer **bölgesel hipotezdir**.

Anahtar Kelimeler: Adélie Pengueni (*Pygoscelis adeliae*), MaxEnt Ekolojik Niş Modeli, Marguerite Körfezi, CMIP6 SSP2-4.5, Mekânsal Blok Çapraz Doğrulama, İklim Değişimi, Ekstrapolasyon Belirsizliği.

Amaç

Bu projenin temel amacı; küresel iklim değişikliğine bağlı olarak oşinografik ve atmosferik süreçlerin hızla dönüştüğü Batı Antarktika Yarımadası'ndaki (WAP) Marguerite Körfezi'nde, deniz buzu dinamiklerine duyarlı tepe indikatör tür olan Adélie pengueninin (*Pygoscelis adeliae*) günümüz (2000–2025) potansiyel habitat uygunluğunu Maksimum Entropi (MaxEnt 3.4.4) algoritmasıyla mezo-ölçekte modellemek; CMIP6 IPSL-CM6A-LR SSP2-4.5 (2041–2060) projeksiyonu altında türün çevresel uygunluk gradyanındaki olası değişim eğilimlerini keşifsel düzeyde incelemek; model aktarılabilirliğini mekânsal blok çapraz doğrulama yöntemiyle sınamak ve elde edilen kuramsal değişimlerin sahadaki ekolojik fizibilitesini değerlendirmektir.

Bu genel amaç doğrultusunda şu hedefler belirlenmiştir:

- 1. GBIF ve SCAR veri tabanlarından Marguerite Körfezi'ne ait 2000–2025 dönemini kapsayan Adélie pengueni genel bulunuş (üreme kolonisi ve neritik beslenme) koordinatlarını derlemek; 0.25° grid ölçeğinde mekânsal inceltme uygulayarak 67 adet bağımsız varlık hücresi belirlemek.
- 2. ECMWF ERA5 yeniden analizlerinden ve REMA sayısal yükseklik modelinden penguenlerin üreme ve beslenme ekolojisini kontrol eden 4 temel çevresel katmanı (*buz_yillik*, *kaya*, *bio18*, *sst_yillik*) üretmek; değişkenler arası çoklu eşdoğrusallığı (VIF ve Pearson korelasyonu) denetlemek.
- 3. MaxEnt 3.4.4 algoritmasıyla günümüz habitat uygunluk modelini kurmak; standart rastgele 10 katlı çapraz doğrulama (10-fold CV) ve Roberts vd. (2017) yöntemine dayalı 4 enlem bandı mekânsal blok çapraz doğrulama (Spatial Block CV) uygulayarak model başarımını ve coğrafi aktarılabilirlik sınırlarını karşılaştırmak.
- 4. CMIP6 IPSL-CM6A-LR SSP2-4.5 (2041–2060) iklim projeksiyonunu delta aşağı ölçekleme yöntemiyle ERA5 referansına entegre ederek 2050 yılı potansiyel habitat değişim haritalarını üretmek; novel climate ve clamping alanlarını haritalandırarak ekstrapolasyon belirsizliklerini ortaya koymak.
- 5. Model sonuçlarını ve mekânsal kısıtları, Türkiye'nin düzenlediği Ulusal Antarktika Bilim Seferleri (TAE) kapsamında yürütülecek izleme ve koruma stratejileri için sahada doğrulanabilir bir araştırma çerçevesine dönüştürmek.

Giriş

Antarktika kıtası ve onu çevreleyen Güney Okyanusu, küresel termohalin sirkülasyonu düzenleyen ve gezegenin ısı bütçesini dengeleyen hayati bir ekosistemdir (IPCC, 2021). Güney Okyanusu'nun en dinamik denizel sahalarından biri olan Batı Antarktika Yarımadası (WAP), 20. yüzyılın ikinci yarısında 50 yıllık süreçte yaklaşık 2.5°C'lik (on yılda ~0.5°C) sıcaklık artışıyla yeryüzünün en hızlı bölgesel ısınma yaşayan sahalarından biridir (Vaughan vd., 2003; Turner vd., 2014). Her ne kadar 21. yüzyılın başlarında doğal atmosferik dolaşım modlarındaki (SAM ve IPO) salınımlara bağlı olarak bölgesel sıcaklıklarda geçici duraklama ve yavaşlamalar gözlense de (Turner vd., 2016), uzun dönemli eğilimler deniz buzu mevsimsel örtüsünün kısalması, kıyı buz sahanlıklarının geri çekilmesi ve Antarktika krili (*Euphausia superba*) biyokütlesindeki dalgalanmalar yönündedir (Stammerjohn vd., 2008, 2012; Atkinson vd., 2004; Rignot vd., 2019).

Denizel besin ağının üst basamaklarında yer alan kutup penguenleri (*Pygoscelis* cinsi), fiziksel çevre koşullarındaki değişimlere karşı duyarlı indikatör türlerdir (Ainley, 2002; Fraser & Hofmann, 2003). Bu cins içerisinde Adélie pengueni (*Pygoscelis adeliae*), yaşam döngüsü deniz buzuna endeksli bir penguen türüdür (Ainley, 2002). Adélie penguenleri; kış aylarında açık denizdeki paket buz (pack-ice) üzerinde dinlenmekte ve tüy dökmekte, ilkbahar ve yaz aylarında ise kıyı şeridindeki kardan arınmış çıplak kayalık zeminlerde koloni kurarak çakıl taşlarından inşa ettikleri yuvalarda kuluçkaya yatmaktadır (Ainley, 2002; Southwell vd., 2015; Lyver vd., 2014). Türün temel besinini oluşturan Antarktika krili, larva ve jüvenil evrelerinde kış deniz buzunun alt yüzeyindeki mikroalgleri otlayarak hayatta kaldığından, deniz buzu dinamikleri penguenlerin besin teminini doğrudan etkilemektedir (Fraser & Hofmann, 2003; Atkinson vd., 2004; Trivelpiece vd., 2011).

İklimsel süreçlerin Batı Antarktika Yarımadası'ndaki etkileri deniz buzu dinamikleriyle sınırlı değildir. Isınan atmosferin nem taşıma kapasitesinin artması neticesinde, kutup ortamında aşırı yağış anomalileri, ıslak kar ve sıvı yağmur olayları gözlenmektedir (IPCC, 2021; Massom vd., 2006). Kuluçkadan yeni çıkan Adélie yavruları su geçirmez yetişkin tüylerine sahip olmayıp yalnızca ısı yalıtımı sağlayan hav tüyleri ile kaplıdır. Aşırı sıvı yağış veya eriyik çamur altında kalan yavruların tüyleri ıslandığında yalıtım özelliğini yitirmekte; dondurucu rüzgar altında hipotermiye girerek ölüm riskiyle karşılaşmaktadır (Chapman vd., 2011).

Türlerin coğrafi dağılım sınırlarını ve iklim değişikliği karşısındaki duyarlılıklarını anlamak amacıyla Tür Dağılım Modelleri (SDM) yaygın olarak kullanılmaktadır (Elith vd., 2011; Phillips vd., 2006; Fielding & Bell, 1997). Yalnızca varlık (presence-only) verileriyle çalışabilen Maksimum Entropi (MaxEnt) algoritması ekoloji literatüründe sıkça tercih edilmektedir (Phillips vd., 2006).

Uluslararası literatür incelendiğinde; **Wang, Hu ve Yang (Mart 2026, PMID: 42209243 - *Ying Yong Sheng Tai Xue Bao*)**, günümüz (2010–2020) ve gelecekteki (2090–2100 SSP5-8.5) iklim senaryoları altında MaxEnt kullanarak üç *Pygoscelis* penguen türünün tüm Antarktika ölçeğinde potansiyel habitatlarını modellemiş; deniz yüzeyi sıcaklığı ve buz örtüsünün kritik belirleyiciler olduğunu ve yüksek emisyon koşullarında türlerin uygun habitat alanlarında kıta genelinde belirgin daralmalar yaşanacağını bildirmişlerdir (Wang vd., 2026). Benzer şekilde, **Cimino, Lynch, Saba ve Oliver (2016 - *Scientific Reports*)**, CMIP5 modelleri ve varlık-yokluk kayıtlarıyla yaptıkları çalışmada, 2060 yılına kadar mevcut Adélie pengueni kolonilerinin yaklaşık üçte birinin (mevcut popülasyonun ~%20'si) iklim ısınması nedeniyle gerileme sürecine girebileceğini öngörmüşlerdir.

Kıtasal veya yarımada ölçeğindeki bu makro araştırmalar (Wang vd., 2026; Cimino vd., 2016), 100–200 km'lik kaba iklim hücreleri nedeniyle yerel çıplak kaya ve topografik dinamikleri temsil edememektedir. Bu çalışma, Marguerite Körfezi'ne odaklanarak günümüz koşullarını 0.25° grid (~288 km²) ölçeğinde mezo-ölçekli bir yerel çözünürlükle modellemektedir. Ancak 2050 iklim projeksiyonunda kullanılan delta anomalileri, küresel iklim modelinin (GCM) yerel ~1° (~100 km) kaba çözünürlüğünü yansıtmaktadır. Dolayısıyla mezo-ölçek avantajı temel olarak günümüz çevresel ve topografik katmanlarımız için geçerlidir; gelecek projeksiyonları mezo-topografya ile kaba iklim anomalisinin bir sentezini temsil etmektedir.

Yöntem

1.1. Araştırma Sahası ve Biyocoğrafik Sınırlar

Çalışma alanı, Batı Antarktika Yarımadası'nın güneybatı kesiminde yer alan ve Bellingshausen Denizi ile bağlantılı olan **Marguerite Körfezi** ve çevre adalarıdır. Modelleme ızgarası; **65.875°G – 70.625°G enlemleri** ile **63.875°B – 73.125°B boylamları** arasında tanımlanmıştır (xllcorner: -73.125°, yllcorner: -70.625°, cellsize: 0.25°, 37 sütun × 19 satır, toplam 703 grid hücresi). Bu bölge; kuzeyde Adelaide Adası, doğuda Fallières Kıyısı, güneyde George VI Boğazı ve batıda Alexander Adası ile çevrili fiyort ve ada sistemidir (Ducklow vd., 2007; Stammerjohn vd., 2012).

Kutup enlemlerinde meridyenlerin birbirine yaklaşması (enlem daralması - meridian convergence) nedeniyle, 68°G enleminde $\cos(68^\circ) \approx 0.3746$'dır. Bu coğrafi durum neticesinde 0.25° boylam genişliği yalnızca yaklaşık 10.4 km'ye, 0.25° enlem yüksekliği ise 27.8 km'ye karşılık gelmektedir. WGS84 elipsoidi üzerinde bir grid hücresinin yüzölçümü ortalama ~288.3 km² olup, 703 grid hücresinin kapsadığı toplam model kalibrasyon alanı **202.681 km²**'dir. Boylamsal komşu iki hücre merkezi arasındaki mesafe yalnızca ~10.4 km olduğundan, modelin mekânsal inceltme sonrası hücreler arası komşuluk mesafeleri kutup jeodeziği ile tam uyumludur.

1.2. Biyolojik Varlık (Presence) Verilerinin Temini ve Mekânsal İnceltme

Adélie penguenine (*Pygoscelis adeliae*) ait coğrafi koordinat verileri, açık kaynak uluslararası biyo-çeşitlilik veri tabanları olan GBIF (Global Biodiversity Information Facility - gbif.org) ve SCAR (Scientific Committee on Antarctic Research) Antarktika Biyo-çeşitlilik Portalı üzerinden derlenmiştir. 2000–2025 yılları arasındaki kayıtlar taranmıştır. Bu veri seti, türün yaşam döngüsündeki **genel bulunuşunu (overall occurrence)** temsil etmekte olup hem kıyı şeridindeki üreme kolonisi yerleşimlerini hem de şelf sahası üzerindeki neritik beslenme/hareket gözlemlerini içermektedir. Ham veri setine ekolojik modelleme standartlarına uygun olarak şu filtreleme protokolü uygulanmıştır:

- Koordinat doğruluğu belirsiz (belirsizlik > 5 km) veya hatalı girilmiş kayıtlar ayıklanmıştır.
- Fosilleşmiş veya tarihsel kolonilere ait eski kayıtlar çalışma kapsamı dışına çıkarılmıştır.
- Araştırma istasyonları (örn. Rothera İstasyonu) çevresinde yoğunlaşan insan kaynaklı örnekleme yanlılığını (sampling bias) ve mekânsal yığılmayı önlemek amacıyla, çalışma için belirlenen 0.25° × 0.25° analiz gridi içinde hücre başına yalnızca tek bir varlık noktası bırakılacak şekilde **mekânsal inceltme (spatial thinning)** uygulanmıştır.
- Çalışma alanı sınırları dışındaki açık okyanus derinliklerine hatalı koordinatlanmış kayıtlar elenmiştir.

Bu filtreleme neticesinde, Marguerite Körfezi sınırları dahilinde model eğitim ve doğrulamasında kullanılmak üzere **67 adet bağımsız varlık (presence) grid hücresi** elde edilmiştir. Çalışma alanındaki toplam 703 grid hücresinin geri kalan 636 hücresi modelin arka plan (background) çevresel matrisini oluşturmuştur.

1.3. Çevresel ve Oşinografik Katmanların Üretimi

Adélie pengueninin üreme ve beslenme ekolojisini kontrol eden biyoklimatik ve çevresel değişkenler, ECMWF ERA5 atmosferik ve denizel yeniden analiz veri setlerinden derlenmiştir. ERA5 verileri 2000–2025 dönemini kapsayan 26 yıllık uzun dönemli aylık ortalamaların sentezlenmesiyle üretilmiştir. Denizel katmanlar olarak; penguenlerin kışlama platformunu ve açık su çatlaklarında avlanmasını temsil eden yıllık ortalama deniz buzu konsantrasyonu (*buz_yillik*, % oran) ve Güney Okyanusu su kütlesi termal rejimini temsil eden deniz yüzeyi sıcaklığı (*sst_yillik*, °C) hesaplanmıştır. Burada SST, endotermik bir kuş olan penguen için doğrudan öldürücü bir fizyolojik sınır olmaktan ziyade, penguenin ana besini olan krilin ve pelajik besin ağının su kütlesi vekili (proxy) niteliğindedir. Atmosferik katman olarak; kuluçka evresindeki civcivlerin ıslanma ve hipotermi riskini temsil eden en sıcak çeyrek (Aralık–Ocak–Şubat yaz mevsimi) toplam yağış miktarı (*bio18*, mm cinsinden) türetilmiştir. Topografik katman olarak ise; Antarktika REMA sayısal yükseklik modeli ve SCAR kaya yüzeyi veri tabanı kullanılarak her bir 0.25° grid hücresindeki çıplak kaya alan yüzdesi (*kaya*, % alan) hesaplanmıştır.

Değişken Adı	Kod	Birim	Çözünürlük	Veri Kaynağı	Ekolojik Rolü ve Biyolojik Anlamı (Vekil / Substrat)
Yıllık Deniz Buzu Konsantrasyonu	buz_yillik	%	0.25° (~288 km²)	ECMWF ERA5 (2000–2025)	Kışlama platformu ve buz kenarı/marjinal zon avlanma sahası (Ainley, 2002; Wang vd., 2026).
Çıplak Kaya Alanı Yüzdesi	kaya	%	0.25° (~288 km²)	SCAR / REMA DEM	Kardan arınmış sert zemin; çakıl yuva inşası ve kuluçka fiziksel substratı (Southwell vd., 2015).
En Sıcak Çeyrek Toplam Yağışı	bio18	mm	0.25° (~288 km²)	ECMWF ERA5 (2000–2025)	Yaz yağış anomalileri; civciv tüylerinde ıslanma, hipotermi ve yuva çöküş riski vekili (Chapman vd., 2011).
Yıllık Deniz Yüzeyi Sıcaklığı	sst_yillik	°C	0.25° (~288 km²)	ECMWF ERA5 (2000–2025)	Pelajik su kütlesi özellikleri ve krill/besin ağı dağılımının oşinografik vekili (Cimino vd., 2016).

Tablo 1. Modelde kullanılan çevresel değişkenler, birimleri, kaynakları ve ekolojik gerekçeleri.

1.4. CMIP6 İklim Modeli, Delta Aşağı Ölçekleme ve Çözünürlük Yapısı

2050 yılı iklim projeksiyonu için Dünya İklim Araştırma Programı (WCRP) CMIP6 veri tabanından **IPSL-CM6A-LR** küresel iklim modeli (ensemble üyesi: r1i1p1f1, senaryo: SSP2-4.5 orta emisyon yolu) temin edilmiştir. Projeksiyon dönemi **2041–2060** (20 yıllık ortalama), tarihsel referans dönemi ise ERA5 ile uyumlu olarak **2000–2025** olarak belirlenmiştir. GCM çıktılarının 0.25° gridimize aktarılmasında küre üzerinde en yakın komşu (nearest complete native cell on sphere) regridding ve delta aşağı ölçekleme yöntemi uygulanmıştır:

- **Deniz Buzu (buz_yillik):** Gelecek ve referans dönem arasındaki mutlak fark yüzdesi, ERA5 günümüz deniz buzu katmanına eklenmiş ve değerler [0, 100] aralığında sınırlandırılmıştır.
- **Deniz Yüzeyi Sıcaklığı (sst_yillik):** Aylık yerel SST anomalisi ERA5 yıllık deniz suyu sıcaklığına additif olarak eklenmiştir.
- **Yaz Yağışı (bio18):** Aylık yağış oranları ERA5 aylık yağışlarına uygulanmış; gelecekteki en sıcak çeyrek ayları (tas) yeniden tespit edilerek bio18 gelecekte dinamik olarak baştan hesaplanmıştır.
- **Çıplak Kaya (kaya):** Jeolojik kaya substratı 2050 yılı projeksiyonunda statik kabul edilmiştir.

Burada dikkat edilmesi gereken husus; iklim değişikliği sinyalinin (delta anomalisi) GCM'in yerel ~1° (~100 km) kaba çözünürlüğünü taşımasıdır. Dolayısıyla değişim haritalarındaki bloklu görünüm bu enterpolasyonun doğal bir sonucudur.

1.5. Çoklu Eşdoğrusallık ve MaxEnt Matematiksel Temelleri

Ekolojik modellemede yüksek korelasyonlu değişkenlerin kullanımı model parametrelerinin varyansını artırabilmektedir (Dormann vd., 2013). Değişkenler arasında Pearson korelasyon matrisi ve Varyans Şişme Faktörü (VIF) analizi uygulanmış; Dormann vd. (2013) uyarınca **|r| < 0.70** ve VIF < 5 kuralı işletilmiştir. Aday katmanlardan kış minimum sıcaklığı (Bio6) elenmiş; modeldeki 4 değişkenin ikili korelasyonlarının |r| < 0.62 seviyesinde kalarak çoklu eşdoğrusallık riskinin giderildiği doğrulanmıştır.

Maksimum Entropi (MaxEnt 3.4.4) algoritması, Shannon bilgi entropisi ilkesine dayanır (Phillips vd., 2006). Algoritma, türün varlık koordinatlarındaki çevresel ortalamaları kısıt kabul ederek, bu kısıtları sağlayan olasılık dağılımları içerisinden entropisi en yüksek dağılımı $\hat{\pi}(x)$ hesaplar:

$$H(\hat{\pi}) = -\sum_{x \in X} \hat{\pi}(x) \ln \hat{\pi}(x) \quad \text{ve} \quad \mathbb{E}_{\hat{\pi}}[f_j] = \mathbb{E}_{\tilde{\pi}}[f_j]$$

Aşırı öğrenmeyi (overfitting) engellemek amacıyla MaxEnt, objektif fonksiyonuna bir L_1 Lasso düzenlileştirme cezası ekler (Phillips vd., 2006): $\max_{\lambda} (\sum_{i=1}^n \ln P(x_i) - \sum_{j=1}^m \beta_j |\lambda_j|)$. Model çıktısı, türün göreceli uygunluğunu 0 ile 1 arasında ölçekleyen Cloglog dönüşümü ile elde edilmiştir: $P(x) = 1 - \exp(-\exp(\eta(x)))$.

1.6. Model Eğitimi, Hiperparametreler ve 10-Katlı Doğrulama

Ekolojik niş modellemesi bağımsız Java ortamında MaxEnt 3.4.4 yazılımıyla yürütülmüştür. 67 adet varlık hücresi ve çalışma alanındaki 636 adet arka plan hücresi (toplam 703 grid hücresi) modele girdi olarak verilmiştir. 60'tan fazla örneklem bulunduğu için model hiperparametreleri olarak varsayılan **LQTH (Linear, Quadratic, Threshold, Hinge)** özellik sınıfları kullanılmış; aşırı öğrenmeyi önlemek için düzenlileştirme çarpanı (Regularization Multiplier = 1.0) seçilmiştir. Model performansı **10 katlı çapraz doğrulama (10-fold CV)** ile sınanmış ve ROC altındaki alan (AUC) hesaplanmıştır (Fielding & Bell, 1997). Presence-only modellerde AUC, varlıkların rastgele arka plana karşı ayırt edilmesini temsil eder. AUC değerlendirmesinde Swets (1988) kriterleri esas alınmıştır (Tablo 2).

AUC Değer Aralığı	Simülasyon Başarı Düzeyi	Ekolojik Model Değerlendirmesi ve Güvenilirlik
0.50 – 0.60	Başarısız / Rastgele	Model rastgele tahminden farksızdır; çevresel değişkenler türü ayırt edememektedir.
0.60 – 0.70	Zayıf / Yetersiz	Ayırt edici güç düşüktür; çevresel değişkenler türü açıklamakta yetersizdir.
0.70 – 0.80	Kabul Edilebilir / İyi	Model yeterli düzeyde ayırt edicidir; akademik SDM çalışmaları için kabul eşiğidir.
0.80 – 0.90	Yüksek / Çok İyi	Model yüksek derecede ayırt edicidir; çevresel ilişkileri güçlü yakalamıştır.
0.90 – 1.00	Mükemmel	Olağanüstü ayırt edicilik (aşırı öğrenme veya örnekleme yanlılığı riski denetlenmelidir).

Tablo 2. AUC değer aralığının model simülasyon başarısına etkisi (Swets, 1988).

1.7. Mekânsal Çapraz Doğrulama (Spatial Block CV) Tasarımı

Standart rastgele çapraz doğrulamada, mekânsal otokorelasyon nedeniyle test noktaları eğitim noktalarına yakın düşmekte ve AUC değerleri iyimser tahmin edilebilmektedir (Roberts vd., 2017). Modelin coğrafi aktarılabilirliğini sınamak amacıyla, çalışma alanı 4 coğrafi enlem bandına (-66.625°, -67.375°, -67.875° sınırları) bölünerek mekânsal bloklama testi gerçekleştirilmiştir. Eşit eğitim boyutu (50-51 nokta) ve sabit rastgele tohumla (20261108) eşleştirilmiş rastgele 4 katlı modelle doğrudan kıyaslanmıştır.

1.8. CBS ve Kartografik Projeksiyon Altyapısı

MaxEnt'ten üretilen ham Cloglog ASCII raster çıktıları, QGIS 3.x açık kaynak Coğrafi Bilgi Sistemleri yazılımına aktarılmıştır. Kutup bölgelerinde alan ve şekil bozulmalarını en aza indirmek için harita projeksiyonu **EPSG:3031 (WGS 84 / Antarctic Polar Stereographic)** olarak tanımlanmıştır. Günümüz (2000–2025), 2050 gelecek, mekânsal fark (Gelecek − Günümüz) ve belirsizlik haritaları 300 DPI çözünürlükte, koordinat gridi, istasyon katmanları ve standart lejantlarıyla kartografik standartta üretilmiştir.

1.9. Proje İş-Zaman Çizelgesi ve Gerçekleşme Takvimi

Projenin araştırma, veri hazırlığı, modelleme, analiz ve raporlama süreçleri aşağıdaki 8 temel iş paketi çerçevesinde 6 aylık periyotta planlanmış ve başarıyla yürütülmüştür (Tablo 3):


No	İş Paketi / Faaliyet Adı	Hedef Çıktı / Yöntem	Sorumlu	1. Ay	2. Ay	3. Ay	4. Ay	5. Ay	6. Ay
1	**Literatür Taraması & Hipotez Kurgusu**	Makale sentezi, veri gereksinim analizi	Öğrenci / Danışman	X	X				
2	**GBIF & SCAR Varlık Verisi Temini**	67 bağımsız hücre, mekânsal inceltme	Öğrenci		X				
3	**ECMWF ERA5 & REMA Katman Üretimi**	0.25° grid, EPSG:3031 projeksiyonu	Öğrenci		X	X			
4	**Çoklu Eşdoğrusallık ve VIF Analizi**	Pearson |r| < 0.70 kuralı, 4 değişken	Öğrenci / Danışman			X			
5	**MaxEnt Modellemesi & 10-Katlı CV**	Cloglog formatı, AUC ve Jackknife	Öğrenci			X	X		
6	**Mekânsal Blok Çapraz Doğrulama**	4 enlem bandı spatial CV (Roberts 2017)	Öğrenci				X		
7	**CMIP6 IPSL SSP2-4.5 2050 Projeksiyonu**	Δ fark matrisi, değişim eğilimleri	Öğrenci				X	X	
8	**QGIS Kartografik Tasarım & Raporlama**	A4 haritalar, TÜBİTAK raporu ve sunum	Öğrenci / Danışman					X	X

Tablo 3. Proje iş-zaman çizelgesi ve gerçekleşme takvimi.

Bulgular

2.1. Alıcı İşletim Karakteristiği (ROC) Eğrisi ve Model Doğruluğu

Alıcı İşletim Karakteristiği (ROC) eğrisi, modelin duyarlılığı ile (1 - özgüllük) arasındaki ilişkiyi gösterir. 10 katlı çapraz doğrulama (10-fold CV) analizi sonucunda, test verileri üzerinden hesaplanan ortalama AUC değeri **0.768 ± 0.111** olarak gerçekleşmiştir (Şekil 1). Eğitim verilerine ait AUC değeri ise **0.838** olarak belirlenmiştir. Swets (1988) kriterlerine göre 0.768 test AUC değeri, kalibrasyon alanı içinde modelin 'İyi / Kabul Edilebilir' ayırt edicilik düzeyine sahip olduğunu göstermektedir.



Şekil 1. Adélie pengueni MaxEnt modeline ait 10 katlı çapraz doğrulama ROC eğrisi (Kırmızı: 10 yineleme ortalaması test AUC = 0.768, Mavi: Standart sapma ±0.111, Siyah: Rastgele tahmin AUC = 0.50).

2.2. Biyoklimatik Değişkenlerin Göreceli Katkı ve Permütasyon Önemleri

MaxEnt algoritması, çevresel değişkenlerin modele etkisini iki tamamlayıcı metrikle raporlamaktadır: **Göreceli Katkı Yüzdesi (Percent Contribution)** ve **Permütasyon Önemi (Permutation Importance)**. Katkı yüzdesi, eğitim algoritmasının yinelemeleri sırasında ilgili değişkenin düzenlenmiş kazançta (gain) yarattığı artışa dayanır. Permütasyon önemi ise eğitim verilerindeki değişken değerlerinin rastgele karıştırılması sonucu AUC değerindeki düşüşü ölçer ve değişkenler arası korelasyondan daha az etkilenen bir göstergedir. 10 kat modelinin değişken önem metrikleri Tablo 4'te sunulmuştur.


Çevresel Değişken	Katkı Yüzdesi (%) (Percent Contribution)	Permütasyon Önemi (%) (Permutation Importance)	Baskın Ekolojik Rolü (Vekil / Substrat)
Yıllık Deniz Buzu (buz_yillik)	**43.1 ± 5.2**	**55.6 ± 6.8**	Birincil belirleyici; marjinal buz avlanma sahası ve kışlama platformu.
Çıplak Kaya Alanı (kaya)	**30.0 ± 3.5**	**9.1 ± 2.4**	Kıyısal kuluçka ve çakıl yuva kurma fiziksel ön koşulu (substrat).
En Sıcak Çeyrek Yağışı (bio18)	13.9 ± 3.1	**17.1 ± 3.9**	Yaz yağış anomalileri; civciv hipotermi ve yuva ıslanma riski vekili.
Deniz Yüzeyi Sıcaklığı (sst_yillik)	12.9 ± 2.8	**18.3 ± 4.5**	Pelajik su kütlesi termal rejimi ve kril habitatı oşinografik vekili.

Tablo 4. Çevresel değişkenlerin MaxEnt modeline katkı yüzdeleri ve permütasyon önemleri (10 kat ortalaması).

Tablo 4 verileri incelendiğinde; hem göreceli katkı yüzdesinde (%43.1) hem de permütasyon öneminde (%55.6) yıllık deniz buzu konsantrasyonunun (*buz_yillik*) en belirleyici faktör olduğu görülmektedir. Çıplak kaya alanı (*kaya*) ise eğitim yinelemelerinde %30.0 katkı yüzdesi sağlamasına rağmen permütasyon öneminde %9.1 seviyesinde kalmıştır. Bu durum, kayalık alanların kıyı şeridinde kolonileşme için zorunlu bir fiziksel ön koşul teşkil ettiğini, ancak çalışma alanının tamamındaki habitat uygunluk gradyanını asıl şekillendiren etkenlerin denizel oşinografik değişkenler (deniz buzu %55.6 ve deniz sıcaklığı %18.3) olduğunu ortaya koymaktadır.

2.3. Jackknife Yöntemiyle Değişken Kazanç Analizleri

Jackknife testi, her bir çevresel değişkenin model kazancına (gain) olan etkisini iki tamamlayıcı yaklaşımla inceler: (1) Değişken modelde tek başına kullanıldığında sağladığı kazanç (turkuaz çubuk), (2) İlgili değişken modelden çıkarıldığında toplam kazançta meydana gelen kayıp (mavi çubuk). 10 katlı modelin Jackknife test sonuçları Şekil 2'de gösterilmiştir.




Şekil 2. Çevresel değişkenlerin Jackknife kazanç analizi (Turkuaz: Değişken tek başına kullanıldığında sağlanan kazanç, Mavi: Değişken modelden çıkarıldığında kalan kazanç, Kırmızı: Tüm değişkenlerin birlikte kullanıldığı tam model kazancı).

Jackknife grafiği incelendiğinde; modelde tek başına kullanıldığında en yüksek düzenlenmiş eğitim kazancını sağlayan değişkenin **en sıcak çeyrek yağışı (*bio18*, ~0.287 kazanç)** olduğu, bunu **yıllık deniz buzu konsantrasyonunun (*buz_yillik*, ~0.210 kazanç)** izlediği görülmektedir. Çıplak kaya (*kaya*) tek başına ~0.139, deniz yüzeyi sıcaklığı (*sst_yillik*) ise ~0.058 kazanç sağlamıştır.

Buna karşılık, modelden çıkarıldığında düzenlenmiş eğitim kazancını en fazla düşüren değişken **yıllık deniz buzu konsantrasyonu (*buz_yillik*)** olmuştur (kazanç tam modeldeki 0.592'den 0.441'e gerilemektedir). Bunu deniz yüzeyi sıcaklığı (*sst_yillik*, 0.483'e gerileme) izlemiştir. Bu durum; tek başına en yüksek ayırt ediciliği *bio18* sağlasa da, modelden çıkarıldığında telafi edilemeyen en özgün ve bağımsız bilgi içeriğinin deniz buzu örtüsünde bulunduğunu göstermektedir.

2.4. Çevresel Değişkenlerin Biyolojik Tepki Eğrileri (Response Curves)

Tepki eğrileri (response curves), diğer tüm değişkenler ortalama değerlerinde sabit tutulduğunda tek bir çevresel faktörün değişimine bağlı olarak Adélie pengueni habitat uygunluk puanının (Cloglog değeri, 0–1 aralığı) nasıl değiştiğini grafiksel olarak yansıtır. Modelde kullanılan 4 değişkenin tepki eğrileri Şekil 3'te sunulmuştur.



Şekil 3. Adélie pengueni habitat uygunluğunun çevresel değişkenlere tepki eğrileri (Sol üst: buz_yillik, Sağ üst: kaya, Sol alt: bio18, Sağ alt: sst_yillik; Kırmızı çizgi: 10 yineleme ortalaması, Mavi bant: ±1 standart sapma).

Tepki eğrileri ham model verileri (.dat) ve grafiklerdeki gerçek sayısal değerler doğrultusunda incelendiğinde türün çevresel tepkileri şu şekilde özetlenmektedir:

- **Deniz Buzu Konsantrasyonu (Şekil 3a):** Habitat uygunluğu %20–%25 marjinal buz konsantrasyonunda zirveye ulaşmakta (~0.997 Cloglog puanı); konsantrasyon arttıkça uygunluk kademeli olarak düşerek %40'ta ~0.74, %50'de ~0.43 seviyesine gerilemekte ve %60.8'de minimum ~0.154 değerine inmektedir. %65–%69 bandında ise ~0.34 seviyesinde seyretmektedir. Bu eğilim, Adélie penguenlerinin dalış ve avlanma için polinyalara ve marjinal buz kenarlarına ihtiyaç duymasıyla uyumludur (Ainley, 2002).
- **Çıplak Kaya Yüzdesi (Şekil 3b):** Çıplak kaya eğrisinde sıfır kaya kesişiminde uygunluk ~0.46 seviyesindedir ve düşük kaya yüzdelerinde hızla ~0.76'ya yükselerek %15–17 aralığında 0.948 zirvesine ulaşmaktadır. Sıfır kayada taban uygunluğunun sıfırlanmaması (~0.46), model kalibrasyonunda kolonilerin yanı sıra açık denizel beslenme gözlemlerinin de bulunmasından kaynaklanmaktadır.
- **Yaz Yağışı / Bio18 (Şekil 3c):** Uygunluk 184 mm civarında zirveye (~0.960 puan) ulaşmakta; 400 mm seviyesinde ~0.81 puan ile yüksek kalmaya devam etmekte, ancak 600 mm'nin üzerine çıktığında ~0.55–0.60 bandına gerilemektedir. Bu durum, aşırı yağış koşullarında yavru hipotermi riskini yansıtmaktadır (Chapman vd., 2011).
- **Deniz Sıcaklığı / SST (Şekil 3d):** -1.94°C ile -1.50°C arasındaki soğuk kutup sularında en yüksek uygunluk (0.903–0.816 puan) gözlenirken, deniz suyu sıcaklığı -0.80°C'nin üzerine çıktığında uygunluk hızla düşerek -0.50°C'de 0.118 seviyesine inmektedir. Bu bulgu, pelajik kril ekolojisiyle uyumlu oşinografik su kütlesi toleransını temsil etmektedir (Cimino vd., 2016).

2.5. Mekânsal Çapraz Doğrulama (Spatial Block CV) Bulguları

Modelin mekânsal otokorelasyona karşı duyarlılığını ve coğrafi aktarılabilirliğini sınamak amacıyla Roberts vd. (2017) yaklaşımıyla yürütülen 4 Enlem Bandı Mekânsal Bloklama ile Eşleştirilmiş Rastgele 4 Kat modellerinin karşılaştırmalı doğrulama metrikleri Tablo 5'te sunulmuştur.

Model / Özellik Ailesi	Mekânsal 4-Bant Test AUC	Eşleştirilmiş Rastgele 4-Kat Test AUC	AUC Farkı (Rastgele − Mekânsal)	Mekânsal Omission Oranı	Rastgele Omission Oranı
L / RM1 (Doğrusal)	0.580 ± 0.198	0.715 ± 0.082	+0.135	19/67 (%28.4)	6/67 (%9.0)
LQ / RM1 (Doğrusal+Karesel)	0.530 ± 0.200	0.746 ± 0.075	+0.216	24/67 (%35.8)	9/67 (%13.4)
LQ / RM2 (Kısıtlı Regülasyon)	0.557 ± 0.210	0.720 ± 0.080	+0.163	23/67 (%34.3)	8/67 (%11.9)
AUTO / RM1 (Ana Model: LQTH)	**0.477 ± 0.165**	0.765 ± 0.071	**+0.288**	**38/67 (%56.7)**	13/67 (%19.4)


Tablo 5. Mekânsal bloklama (4 enlem bandı) ve eşleştirilmiş rastgele 4 kat MaxEnt modellerinin karşılaştırmalı doğrulama metrikleri (Roberts vd., 2017).

Tablo 5'teki sonuçlar, ekolojik modelleme metodolojisi açısından hayati bir gerçeği belgelemektedir: Ana model ile aynı özellik ailesini taşıyan AUTO/RM1 (LQTH) konfigürasyonu, standart rastgele doğrulamada 0.765 test AUC verirken, coğrafi enlem bantları ayrıştırıldığında test AUC değeri **0.477'ye (rastgele tahmin eşiği olan 0.50'nin altına)** gerilemekte ve test omission oranı %56.7'ye fırlamaktadır. Buna karşılık doğrusal kısıtlı model (L/RM1) mekânsal testte 0.580 AUC ile daha dirençli kalmaktadır. Rastgele bölmede eğitim-test noktaları arası medyan mesafe 12.6 km iken (68°G enleminde 0.25° boylam ~10.4 km'dir), mekânsal bloklamada bu mesafe 45.4 km'ye çıkmaktadır. Bu bulgu; karmaşık özellik sınıflarının (hinge/threshold) yerel enleme aşırı uyum sağladığını ve modelin eğitildiği enlem dışındaki farklı sahalara doğrudan aktarılmasında ciddi genelleme yetersizliği bulunduğunu dürüstçe kanıtlamaktadır.

2.6. Kartografik Dağılım ve Değişim Haritaları

2.6.1. Marguerite Körfezi Günümüz (2000–2025) Çevresel Uygunluk Haritası

MaxEnt modelinin günümüz ERA5 (2000–2025) ortalamalarıyla çalıştırılması neticesinde elde edilen Cloglog habitat uygunluk haritası Şekil 4'te sunulmuştur. Haritada 0.60 üzerindeki yüksek uygunluk alanlarının Adelaide Adası'nın kıyı kesimlerinde, körfezin iç fiyort girişlerinde ve George VI Boğazı'nın kuzey ağzında yoğunlaştığı gözlenmektedir. Bu alanlar, kuluçka için gerekli çıplak kayalıkların ve uygun marjinal deniz buzu dinamiklerinin bir arada bulunduğu kıyı kesimleriyle örtüşmektedir.




Şekil 4. Marguerite Körfezi'nde Adélie pengueni günümüz çevresel uygunluk haritası (ERA5 2000–2025 referansı, MaxEnt 3.4.4, EPSG:3031 kutup stereografik izdüşümü).

Günümüz haritası incelendiğinde; Bellingshausen Denizi'ne bakan batı açık deniz kesimlerinde uygunluk değerlerinin 0.10'un altında kaldığı görülmektedir. Bu düşüklük yalnızca kaya eksikliğinden değil; açık denizde daha ılık seyreden pelajik deniz suyu sıcaklığı (SST > -0.5°C) ve marjinal kış buz örtüsünün yokluğunun birleşik etkisinden kaynaklanmaktadır. Buna karşılık Adelaide Adası ve iç fiyortlar türün tüm biyolojik gereksinimlerini karşılamaktadır.

2.6.2. CMIP6 IPSL-CM6A-LR SSP2-4.5 (2041–2060) Gelecek Projeksiyon Haritası

CMIP6 IPSL-CM6A-LR modelinin orta düzey sera gazı emisyon senaryosu (SSP2-4.5) altında 2050 yılı (2041–2060 dönemi) potansiyel habitat uygunluk projeksiyonu Şekil 5'te sunulmuştur. Projeksiyon haritası incelendiğinde; kuzey ve batı fiyortlarında habitat uygunluğunda gerilemeler gözlenirken, körfezin güneyindeki korunaklı boğaz alanlarında uygunluk değerlerinin korunduğu veya kısmen arttığı görülmektedir.




Şekil 5. Adélie pengueni 2050 yılı potansiyel çevresel uygunluk projeksiyon haritası (CMIP6 IPSL-CM6A-LR SSP2-4.5, 2041–2060 dönemi, EPSG:3031 kutup stereografik izdüşümü).

2050 projeksiyonu, ısınan deniz suyu ve azalan kış deniz buzu nedeniyle türün geleneksel üreme ve avlanma alanlarında mekânsal baskıların artacağını ortaya koymaktadır. Özellikle Adelaide Adası'nın açık deniz etkisine açık batı kıyılarında uygunluk puanlarında belirgin azalmalar gözlenmiştir.

2.6.3. 2050 Yılı Mekânsal Değişim ve Uygunluk Fark Haritası

Gelecek uygunluk puanı ile günümüz uygunluk puanı arasındaki fark (Δ = Gelecek − Günümüz) piksel bazında hesaplanarak mekânsal değişim haritası oluşturulmuştur (Şekil 6). Fark değerleri ±0.05 mutlak puan eşiğinde sınıflandırılmış; modelin eşik duyarlılığı Tablo 6'da ve alan dağılımı Tablo 7'de özetlenmiştir (Liu vd., 2005).



Şekil 6. Adélie pengueni 2050 yılı çevresel uygunluk değişim haritası (Δ = Gelecek − Günümüz). Kırmızı tonlar uygunluk kaybını, gri tonlar kararlı alanları, yeşil tonlar ise uygunluk artışı gösteren alanları temsil etmektedir.

Şekil 6'da görüldüğü üzere; körfezin kuzeybatı girişi ve Adelaide Adası batısında belirgin uygunluk kaybı (Δ < -0.05) gözlenirken, güneydeki George VI Boğazı ağzında yeşil tonlu uygunluk artış eğilimi (Δ > +0.05) belirmektedir. Haritadaki bloklu sınırlar, delta anomalisinin ~1° GCM hücrelerinden aktarılmasından kaynaklanmaktadır. George VI Boğazı günümüzde kalın şelf buzuyla kaplı olduğundan, buradaki matematiksel artış kesin bir sığınak değil, kuramsal bir değişim hipotezidir.

Uygunluk Değişim Eşiği	Değişim Sınıfı	Hücre Sayısı (703 Hücre)	Hücre Oranı (%)	Model Alanı Yüzölçümü (km²)	Model Alan Payı (%)
±0.025 Puan	Azalma / Kararlı / Artış	318 / 102 / 283	%45.2 / %14.5 / %40.3	95.323 / 27.818 / 79.539	%47.0 / %13.7 / %39.2
±0.05 Puan (Referans)	**Azalma Kararlı Artış Eğilimi**	**297 163 243**	**%42.2 %23.2 %34.6**	**89.155 45.066 68.460**	**%44.0 %22.2 %33.8**
±0.10 Puan	Azalma / Kararlı / Artış	220 / 290 / 193	%31.3 / %41.3 / %27.5	65.777 / 82.600 / 54.303	%32.5 / %40.8 / %26.8
±0.25 Puan (Şiddetli)	Azalma / Kararlı / Artış	102 / 531 / 70	%14.5 / %75.5 / %10.0	30.628 / 151.660 / 20.392	%15.1 / %74.8 / %10.1


Tablo 6. Farklı lojistik değişim eşiklerine göre 2050 yılı habitat değişim sınıflarının duyarlılık dağılımı (Liu vd., 2005).

Habitat Değişim Sınıfı (±0.05 Eşiği)	Hücre Sayısı	Yüzde Payı (%)	Toplam Yüzölçümü (km²)	Baskın Coğrafi Bölge
Habitat Daralması / Kaybı (Δ < -0.05)	297	%42.2	89.155 km²	Körfez girişi, Adelaide Adası batı/kuzey kıyıları.
Kararlı Alanlar (-0.05 ≤ Δ ≤ +0.05)	163	%23.2	45.066 km²	Merkez körfez pelajik suları, korunaklı koylar.
Uygunluk Artışı Gösteren Alanlar (Δ > +0.05)	243	%34.6	68.460 km²	İç fiyortlar, George VI Boğazı ağzı (kuramsal eğilim).

Tablo 7. CMIP6 SSP2-4.5 2050 projeksiyonunda Marguerite Körfezi habitat sınıflarının alan dökümü.

2.6.4. Ekstrapolasyon, Novel Climate ve Clamping Belirsizlik Haritası

İklim projeksiyonlarında çevresel değişkenlerin eğitim sınırlarını aşması durumunda model ekstrapolasyon uygular (Phillips vd., 2006). Çalışma alanındaki 703 grid hücresinin **357 adedinde (%50.8 / 102.500 km²)** clamping gerçekleşmiştir (Şekil 7). Clamping işlemlerinin önemli kısmı artan deniz yüzeyi sıcaklığı (SST) ve sıvı yağış (Bio18) değişkenlerinin günümüz üst sınırlarını aşmasından kaynaklanmıştır. Bu durum, 2050 yılı projeksiyonunun geniş bir ekstrapolasyon belirsizliği barındırdığını ve sonuçların temkinle yorumlanması gerektiğini göstermektedir.



Şekil 7. Ekstrapolasyon ve Clamping belirsizlik haritası (Mor: En az bir değişkenin günümüz aralığını aştığı novel climate ve clamping uygulanan 357 hücre, Gri: Günümüz iklim aralığında kalan güvenli hücreler).

Sonuç ve Tartışma

Bu araştırmada, Batı Antarktika Yarımadası'nın hassas denizel sahalarından biri olan Marguerite Körfezi'nde Adélie pengueninin (*Pygoscelis adeliae*) günümüz (2000–2025) ve 2050 yılı potansiyel habitat uygunluğu, ERA5 yeniden analizleri, REMA topoğrafyası ve CMIP6 IPSL-CM6A-LR iklim projeksiyonları ile modellenmiştir. Elde edilen bulgular, kutup ekolojisi literatürü ve metodolojik sınırlılıklar ışığında değerlendirilmiştir.

Model sonuçlarında yıllık deniz buzu konsantrasyonunun %43.1 katkı yüzdesi ve %55.6 permütasyon önemi ile birincil belirleyici çıkması, Adélie pengueninin deniz buzu dinamiklerine duyarlı yapısını ortaya koyan ekolojik literatürle (Ainley, 2002; Fraser & Hofmann, 2003) uyum sergilemektedir. Tepki eğrilerinde görülen %20–%25 marjinal buz optimumu; penguenlerin avlandığı kril sürülerinin buz altı algleriyle beslenmesi için yeterli buz örtüsüne ihtiyaç duymasını, ancak aynı zamanda dalış yapabilmek için açık su kanallarına ve polinyalara gereksinim duymasını yansıtmaktadır. Aşırı kapalı kütlesel buz örtüsünde dalış erişiminin düşmesi bu dengenin hassasiyetine işaret etmektedir.

Giriş bölümünde incelenen **Wang, Hu ve Yang'ın (2026, PMID: 42209243 - *Ying Yong Sheng Tai Xue Bao*)** bulgularıyla karşılaştırıldığında; Wang vd. (2026), CMIP6 SSP5-8.5 yüksek emisyon senaryosu altında yüzyıl sonuna doğru (2090–2100) Antarktika genelinde üç *Pygoscelis* türünün potansiyel uygun habitatlarında belirgin daralmalar bildirmişlerdir. Bizim çalışmamız, bu genel daralma eğilimiyle uyumlu olarak Marguerite Körfezi genelinde %42.2 oranında (89.155 km²) bir habitat uygunluk kaybı eğilimi tespit etmiştir.

'Refugia' ve George VI Boğazı Tartışması: Model çıktılarında körfezin güneyindeki George VI Boğazı girişinde %34.6 oranında (68.460 km²) uygunluk artışı (Δ > +0.05) gözlenmiştir. Ancak bu artış kesin bir 'ekolojik sığınak' (refugium) olarak kabul edilemez. Bir hücrede taban uygunluğu çok düşükse (örn. 0.02), matematiksel bir artışla 0.08'e yükselse dahi mutlak uygunluk penguen için yetersiz kalacaktır. Dahası, George VI Boğazı günümüzde yüzlerce metre kalınlığında kalıcı şelf buzuyla kaplıdır ve kuluçka için zorunlu olan çıplak kaya substratından yoksundur. Buradaki uygunluk artışı, CMIP6 modelindeki deniz buzu incelmesine MaxEnt algoritmasının verdiği kuramsal bir tepkidir. Dolayısıyla George VI Boğazı bir 'ispatlanmış sığınak' değil, gelecekte şelf buzu erimesi durumunda potansiyel taşıyabilecek, sahada test edilmesi gereken bir **bölgesel hipotezdir**.

Çalışmamızda yaz yağışlarının (*bio18*) %17.1'lik permütasyon önemine sahip olması, Chapman vd. (2011) ve Massom vd. (2006) tarafından vurgulanan sıvı yağmur ve ıslak karın civciv ölümlerine yol açma riski hipotezini desteklemektedir. Tepki eğrisinde yağış miktarı 600 mm'yi aştığında uygunluk puanının gerilemesi, iklim değişikliğiyle birlikte yağış fazının sıvıya kaymasının yaratabileceği olumsuz etkileri yansıtmaktadır.

Mekânsal Bloklama ve Sınırlılıklar: Roberts vd. (2017) yaklaşımıyla gerçekleştirdiğimiz 4 enlem bandı mekânsal blok çapraz doğrulama testleri ekolojik metodoloji açısından kritik bir gerçeği vurgulamaktadır: Standart rastgele kat bölmelerinde 0.765 AUC veren ana model (AUTO/RM1, LQTH), coğrafi enlemler ayrıştırıldığında 0.477 AUC'ye gerilemekte ve omission oranı %56.7'ye çıkmaktadır. Bu sonuç; karmaşık özellik sınıflarının yerel enleme aşırı uyum sağladığını ve kutup modellerinde mekânsal otokorelasyon denetlenmeden üretilen projeksiyonlara şüpheyle yaklaşılması gerektiğini göstermektedir.

Son olarak, 2050 iklim projeksiyonunda 357 hücrede (%50.8) clamping uygulanması ve çalışmanın tek bir GCM (IPSL-CM6A-LR) ile tek bir senaryoya (SSP2-4.5) dayanması, bu projeksiyonların kesin bir gelecek tahmini değil, **keşifsel (exploratory)** bir ilk değerlendirme olduğunu ortaya koymaktadır. Gelecek araştırmalarda çoklu model toplulukları (ensemble) dahil edilmesi belirsizlikleri azaltacaktır (Araújo & New, 2007).

Öneriler

Bu araştırma kapsamında elde edilen bulgular ve metodolojik sınırlılıklar doğrultusunda, ulusal ve uluslararası kutup araştırmaları için şu somut öneriler geliştirilmiştir:

- 1. **TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) ve Ulusal Seferler (TAE):** Türkiye'nin düzenlediği Ulusal Antarktika Bilim Seferleri (TAE) kapsamında, modelin mekânsal aktarılabilirlik sınırlarını test etmek ve George VI Boğazı çevresindeki şelf buzu-mikroklima etkileşiminin biyolojik fizibilitesini incelemek amacıyla, körfezin güney kesimlerinde bilimsel saha doğrulaması (ground truthing) ve oşinografik ölçüm çalışmaları planlanmalıdır.
- 2. **GPS Telemetri ve Uydu Vericileri ile İzleme:** Modelin genel bulunuş kısıtını aşmak ve üreme kolonileri ile denizel beslenme hareketlerini net olarak ayrıştırmak amacıyla, körfezdeki Adélie kolonilerine uydu bağlantılı GPS telemetri cihazları takılarak bireylerin kışlama ve beslenme rotaları gerçek zamanlı izlenmelidir (Cimino vd., 2016).
- 3. **Çoklu Model Toplulukları (Ensemble SDM) ve Bölgesel İklim Modelleri (RCM):** GCM delta anomalisinin ~1° kaba çözünürlük kısıtını ve clamping (%50.8) belirsizliğini azaltmak için birden fazla GCM (örn. MPI-ESM1-2-HR, CNRM-CM6-1) ve Bölgesel İklim Modelleri (RCM) bir araya getirilerek topluluk (ensemble) modellemesi yürütülmelidir (Araújo & New, 2007).
- 4. **Deniz Koruma Alanları (MPA) ve CCAMLR Kapsamı:** Antarktika Deniz Yaşamı Kaynaklarının Korunması Komisyonu (CCAMLR) nezdinde, modelimizin belirgin habitat daralması (Δ < -0.05) öngördüğü **kuzey körfez girişi ve Adelaide Adası çevresindeki mevcut kolonilerin hinterlandında** endüstriyel kril (*Euphausia superba*) avcılığı kotaları yakından takip edilmeli ve yerel koruma tamponları geliştirilmelidir.
- 5. **Yüksek Çözünürlüklü Optik Uydu ve İHA ile Koloni Takibi:** Ulaşımı güç fiyort adacıklarındaki kolonilerin tespiti için Sentinel-2 ve yüksek çözünürlüklü ticari uydu görüntüleri ile insansız hava araçları (İHA) üzerinden guano lekesi analizi ve sayım çalışmaları yürütülmelidir (Southwell vd., 2015).
- 6. **Otomatik Meteoroloji İstasyonları (AWS) ile Yerel Yağış İzleme:** Kuluçka döneminde civciv ölümlerine yol açabilecek aşırı sıvı yağış olaylarının takibi için körfez kıyısındaki üreme kolonilerine gerçek zamanlı mikroklimatik otomatik meteoroloji istasyonları (AWS) kurulması önerilmektedir (Chapman vd., 2011).

Kaynaklar

Ainley, D. G. (2002). *The Adélie Penguin: Bellwether of Climate Change*. Columbia University Press, New York. https://doi.org/10.7312/ainl12304

Araújo, M. B., & New, M. (2007). Ensemble forecasting of species distributions. *Trends in Ecology & Evolution*, 22(1), 42–47. https://doi.org/10.1016/j.tree.2006.09.010

Atkinson, A., Siegel, V., Pakhomov, E., & Rothery, P. (2004). Long-term serious decline in Antarctic krill stock and increase in salps in Southern Ocean. *Nature*, 432(7013), 100–103. https://doi.org/10.1038/nature02996

Chapman, E. W., Hofmann, E. E., Patterson, D. L., & Fraser, W. R. (2011). The effects of climate change on normal and anomalous weather conditions in the Western Antarctic Peninsula: Consequences for Adélie penguin populations. *Marine Ecology Progress Series*, 429, 247–260. https://doi.org/10.3354/meps09108

Cimino, M. A., Lynch, H. J., Saba, V. S., & Oliver, M. J. (2016). Projected asymmetric response of Adélie penguins to Antarctic climate change. *Scientific Reports*, 6, 28785. https://doi.org/10.1038/srep28785

Dormann, C. F., Elith, J., Bacher, S., Buchmann, C., Carl, G., Carré, G., Marquéz, J. R. G., Gruber, B., Lafourcade, B., Leitão, P. J., Münkemüller, T., McClean, C., Osborne, P. E., Reineking, B., Schröder, B., Skidmore, A. K., Zurell, D., & Lautenbach, S. (2013). Collinearity: A review of methods to deal with it and a simulation study evaluating their performance. *Ecography*, 36(1), 27–46. https://doi.org/10.1111/j.1600-0587.2012.07348.x

Ducklow, H. W., Baker, K., Martinson, D. G., Quetin, L. B., Ross, R. M., Smith, R. C., Stammerjohn, S. E., Vernet, M., & Fraser, W. (2007). Marine ecosystems: The West Antarctic Peninsula. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 362(1477), 67–94. https://doi.org/10.1098/rstb.2006.1955

Elith, J., Phillips, S. J., Hastie, T., Dudík, M., Chee, Y. E., & Yates, C. J. (2011). A statistical explanation of MaxEnt for ecologists. *Diversity and Distributions*, 17(1), 43–57. https://doi.org/10.1111/j.1472-4642.2010.00725.x

Fielding, A. H., & Bell, J. F. (1997). A review of methods for the assessment of prediction errors in conservation presence/absence models. *Environmental Conservation*, 24(1), 38–49. https://doi.org/10.1017/S0376892997000088

Fraser, W. R., & Hofmann, E. E. (2003). A predator's perspective on causal links between climate change, physical forcing and ecosystem response. *Marine Ecology Progress Series*, 265, 1–15. https://doi.org/10.3354/meps265001

IPCC. (2021). *Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA. https://doi.org/10.1017/9781009157896

Liu, C., Berry, P. M., Dawson, T. P., & Pearson, R. G. (2005). Selecting thresholds of occurrence in the prediction of species distributions. *Journal of Biogeography*, 32(1), 51–63. https://doi.org/10.1111/j.1365-2699.2004.01149.x

Lyver, P. O., Barron, M., Barton, K. J., Ainley, D. G., Pollard, A., Gordon, S., McNeill, S., Ballard, G., & Wilson, P. R. (2014). Trends in the breeding population of Adélie penguins in the Ross Sea, 1981–2012: A coincidence of climate and resource extraction effects. *PLOS ONE*, 9(3), e91188. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0091188

Massom, R. A., Stammerjohn, S. E., Smith, R. C., Pook, M. J., Iannuzzi, R. A., Adams, N., & Fraser, W. R. (2006). Extreme anomalous atmospheric circulation in the West Antarctic Peninsula region in Austral spring and summer 2001/02, and its ecological consequences. *Antarctic Science*, 18(3), 403–418. https://doi.org/10.1017/S0954102006000454

Phillips, S. J., Anderson, R. P., & Schapire, R. E. (2006). Maximum entropy modeling of species geographic distributions. *Ecological Modelling*, 190(3–4), 231–259. https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2005.03.026

Rignot, E., Mouginot, J., Scheuchl, B., van den Broeke, M., van Wessem, M. J., & Morlighem, M. (2019). Four decades of Antarctic Ice Sheet mass balance from 1979–2017. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 116(4), 1095–1103. https://doi.org/10.1073/pnas.1812883116

Roberts, D. R., Bahn, V., Ciuti, S., Boyce, M. S., Elith, J., Guillera-Arroita, G., Hauenstein, S., Lahoz-Monfort, J. J., Schröder, B., Thuiller, W., Warton, D. I., Wintle, B. A., Hartig, F., & Dormann, C. F. (2017). Cross-validation strategies for data with spatial, temporal, or phylogenetic structure. *Ecography*, 40(8), 913–929. https://doi.org/10.1111/ecog.02881

Southwell, C., Emmerson, L., McKinlay, J., Newbery, K., Takahashi, A., Kato, A., & Trathan, P. (2015). Spatially extensive standardized surveys reveal widespread, stable abundance of an Antarctic top predator. *Diversity and Distributions*, 21(1), 23–33. https://doi.org/10.1111/ddi.12260

Stammerjohn, S. E., Martinson, D. G., Smith, R. C., & Iannuzzi, R. A. (2008). Sea ice in the western Antarctic Peninsula region: Spatio-temporal variability from ecological and climatological perspectives. *Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography*, 55(18–19), 2041–2058. https://doi.org/10.1016/j.dsr2.2008.04.026

Stammerjohn, S., Massom, R., Rind, D., & Martinson, D. (2012). Regions of rapid sea ice change: An inter-hemispheric seasonal comparison. *Geophysical Research Letters*, 39(6), L06501. https://doi.org/10.1029/2012GL050874

Swets, J. A. (1988). Measuring the accuracy of diagnostic systems. *Science*, 240(4857), 1285–1293. https://doi.org/10.1126/science.3287615

Trivelpiece, W. Z., Hinke, J. T., Miller, A. K., Reiss, C. S., Trivelpiece, S. G., & Watters, G. M. (2011). Variability in krill biomass links harvesting and climate warming to penguin population declines in Antarctica. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 108(18), 7625–7628. https://doi.org/10.1073/pnas.1016560108

Turner, J., Barrand, N. E., Bradbury, W. M., Chelliah, M., Garabato, A. C. N., & Phillips, T. (2014). Antarctic climate change and the environment: An update. *Polar Record*, 50(3), 237–259. https://doi.org/10.1017/S0032247413000296

Turner, J., Lu, H., White, I., King, J. C., Phillips, T., Hosking, J. S., Bracegirdle, T. J., Marshall, G. J., Mulvaney, R., & Deb, P. (2016). Absence of 21st century warming on Antarctic Peninsula consistent with natural variability. *Nature*, 535(7612), 411–415. https://doi.org/10.1038/nature18645

Vaughan, D. G., Marshall, G. J., Connolley, W. M., Parkinson, C., Mulvaney, R., Hodgson, D. A., King, J. C., Pudsey, C. J., & Turner, J. (2003). Recent rapid regional climate warming on the Antarctic Peninsula. *Climatic Change*, 60(3), 243–274. https://doi.org/10.1023/A:1026021217991

Wang, J., Hu, M., & Yang, J. (2026). Impact of climate change on the potentially suitable habitat distribution of Pygoscelis penguins in Antarctica. *Ying Yong Sheng Tai Xue Bao (The Journal of Applied Ecology)*, 37(3), 926–932. https://doi.org/10.13287/j.1001-9332.202603.028 [PMID: 42209243]