

STOP! 熱中症

～ 厚生労働省「職場における熱中症対策」に基づく院内予防ポスター ～

1 この条件は危険!「暑さ指数(WBGT)」に注意

WBGT 28℃以上

暑さ指数(気温・湿度・輻射熱を考慮)

気温 31℃以上

院内・屋外を問わず要警戒

湿度が高い日

汗が蒸発せず体温が下がりにくい

△ 2025年6月施行の改正労働安全衛生規則により、上記環境で**連続1時間以上または1日4時間以上**の作業を行う場合、事業者には「早期発見の体制整備」「重篤化防止の手順作成」「関係者への周知」が**義務**付けられています。

2 予防の5つのポイント(一人ひとりが実践!)



水分・塩分

のどが渇く前に、20～30分ごとにコップ1～2杯。汗をかい
たら塩分も一緒に。



こまめな休憩

涼しい休憩スペースで定期的
に休む。無理・我慢は禁物。



室温・換気

エアコン・換気で診療室や技
工・消毒室の温湿度を管理。
WBGTを確認。



体調管理

睡眠不足・朝食抜き・前日の
深酒・二日酔いは発症リスク
大。毎朝の体調チェック。



服装・順化

通気性のよい服装を。暑さに
慣れるまで(約1～2週間)は
特に注意。

3 熱中症のサインを見逃さない

I 度(軽症)

- めまい・立ちくらみ
- 筋肉痛・こむら返り
- 大量の発汗

II 度(中等症)

- 頭痛・吐き気・嘔吐
- 強いだるさ・脱力感
- 集中力・判断力の低下

III 度(重症)

- 意識がない・呼びかけに反応しない
- けいれん・まっすぐ歩けない
- 体が熱い(高体温)

→ **ためらわず119番!**

4 具合の悪い人を見つけたら(応急救置の手順)

STEP 1

声かけ・確認

意識はあるか、返事はできる
か確認

STEP 2

涼しい場所へ

冷房の効いた部屋・日陰へ
移動し衣服をゆるめる

STEP 3

体を冷やす

首・わきの下・足の付け根を
保冷剤等で冷却

STEP 4

水分・塩分補給

自力で飲める場合のみ、経
口補水液など

STEP 5

医療機関へ

意識がない・飲めない・改善
しない → 救急車



意識がない・自力で水を飲めないときは、ただちに119番! 回復するまで絶対に一人にしない!

5 当院の緊急連絡体制(あらかじめ記入して掲示)

熱中症対策責任者	(氏名を記入)
緊急時の院内連絡先	(院長・責任者の連絡先を記入)
救急搬送先の医療機関	(病院名・住所・電話番号を記入)
救急要請	119番 (当院所在地・目印を伝える)