

# 后继结构

zysx997

2025 年 1 月 6 日

## 1 认识数，从认识数数开始

原本打算把标题起成“认识数学，从认识数数开始的”，但仔细一想不太合理。如果想要认识自然数，从数数开始是很有必要性的。但是对于整个数学，或许认识集合、认识范畴、认识泛性质才是最为重要的。正如接下来我在处理“数数”的问题中，多次用到集合、范畴、泛性质的工具。这些工具或许不是必要的，但往往能解释清楚我们进行构造的动机，或是构造的原因。因此，认识这些概念是有益的，从“数数”这个简单的例子开始，用来辅助理解这些概念也是有帮助的。

我认为数学中定义一种结构的抽象有两个方面。一是把现实中或者概念中的直觉用数学的语言描述，给出一个“基础”，二是利用逻辑推理，在基础上附加更多“良好”的性质，以便我们对结构进行处理。在这个观点下，让我们来看看数学中是怎么对自然数进行抽象的。首先，自然数对应的现实直觉来自“数数”，运用集合代数的知识，我们可以将“自然数集”抽象为一个集合  $\mathbb{N}$ ，然后，将“数数”这个操作定义为一个从  $\mathbb{N}$  到其自身的映射  $s$ 。这样，我们就把自然数的定义从“数数”这个操作抽象为一个集合上的映射。这一步的抽象是很自然的，因为我们知道，自然数是一个集合，而“数数”这个操作就是把集合中的元素按照一定的顺序取出来。这个操作可以被抽象为一个映射。然而，我们并没有定义这个映射，也没有给出这个映射的性质。这就是我们需要进行的第二个步骤。我们需要定义这个映射，或是给出这个映射的性质。这个映射的定义或性质的给出，就是我们需要进行的第二步抽象。如果熟悉 Peano 公理，那么你应该会明白，Peano 公理的几条性质就是第二步抽象的结果。在这里我们先列出自然数集  $\mathbb{N}$  与后继映射  $s: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  满足的 Peano 公理：

**Zero**

$$0 \in \mathbb{N}$$

## Zero is not a successor

$$\forall_{n \in \mathbb{N}} ns \neq 0$$

## Injective

$$\forall_{m, n \in \mathbb{N}} ms = ns \rightarrow m = n$$

## Induction

$$\forall_{A \subset \mathbb{N}} (0 \in A \wedge (\forall_{n \in \mathbb{N}} n \in A \rightarrow ns \in A)) \rightarrow A = \mathbb{N}$$

注意，在上面的符号中我们对  $n$  在映射  $s$  下的像记为  $ns$ ，而不是  $s(n)$ 。这样做是为了符合我们从左向右书写的习惯。另外，上面列出的 Peano 公理说没有包括  $ns \in \mathbb{N}$  这一条，因为  $s$  作为  $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  的函数，已经包含了这个性质。注意，Peano 公理的 Zero 条目并非关于映射  $s$ ，而是关于集合  $\mathbb{N}$ 。因此，自然数集的基石与其说是集合  $\mathbb{N}$  与映射  $s$  两者，不如说是集合  $\mathbb{N}$ 、映射  $s$  与元素  $0$  三者。而在这三者的基础上，进一步应满足 Peano 公理的 Zero is not a successor、Injective 与 Induction 三条性质。但是，除了抽象的第一步对  $s$  的定义，再加上  $0$  作为某个“起点”符合我们对于“数数”直觉的抽象之外，我们并不知道剩下的三条性质是如何与我们关于“数数”的直觉相联系的。或许更好的问法是：具有一个确定点  $x$ ，一个自映射  $s$  的集合  $X$  有很多，为什么我们偏偏对于满足上面的三条性质的有确定点  $0$ ，自映射  $s$  的集合  $\mathbb{N}$  感兴趣？这个问题，更一般的问法，是“一个结构的全体中有那么多结构对象，为什么会有一些特殊的结构对象，我们特别感兴趣？”。这个问题的解答，其主观成分在于“我们对怎样的数学对象感兴趣”，而客观成分在于，当我们确定了对怎样的数学对象兴趣后，我们能严格地证明，某些性质是这些数学对象的必然性质。这就是数学的魅力所在。

让我们来先对主观成分进行讨论。我们会对怎样的数学对象感兴趣呢？首先，这里要澄清一点，这里的数学对象是来自已经定义了的结构全体的，而这样的结构全体的定义来源于直觉，是上面说的第一步抽象。已经定义的某个结构全体，其可以有各种各样不同的结构对象，我们最为关注的是能反映所有对象性质的那些特别的对象。举例明之，如果结构全体是一个闭区间，对象是其中的元素，那么我们最关注的对象自然是最大元  $b$  与最小元  $a$ ，因为如果确定了这两者，那么所有其他的元素都得到了确定。在这里，我们用特殊的两个对象，得到了关于全体对象的性质。像这样关于全体对象的性质，称为这个结构的泛性质。一个对象能反映结构的泛性质，是我们对这个对象感兴趣的主要原因。这里要说明的是，对象之所以能反映整个结构的泛性质，是因为这个对象与结构的其他对象之间有着联系，这种联系也是结构必须含有的一部分，不然的话，结构中的对象就是孤立的，没有联系，也就不可能用一个对象反映整个结构的性质。

关于问题的客观成分，需要用到范畴论。范畴论是系统地研究结构、关系、泛性质的理论。范畴论是数学的一种基础理论，它研究的是数学对象之间的关系，以及这些关系的性质。范畴论

的基本概念是范畴，一个范畴包括了对象、态射与态射的复合。对象是我们研究的数学对象，态射是对象之间的联系，这种联系可以通过复合进行传递。有了范畴提供了关于结构、对象、关系的统一语言，我们就可以证明某些对象在某种意义下的唯一性，这就得到了这样的数学对象的“必然性质”。接下来，一旦确定了对象和联系的定义，我们就会用“范畴”代替“结构全体”，用“对象”代替“结构对象”，用“态射”代替“联系”，作为更标准的术语。

让我们回到关于自然数的问题。我们由第一步抽象，得到一种具有一定结构的对象：一个集合  $X$ ，具有一个自映射  $s$ ，同时具有一个确定点  $x$ 。这种结构的对象包含了 3 个特征，或者说属性，我们用 3 元组方便地表示它，记为  $(X, s, x)$ 。这里使用  $X$  与  $x$  作为符号而不使用  $\mathbb{N}$  与 0 的原因是，当我们提及  $\mathbb{N}$  与 0 时，往往默认了 Peano 公理，而这里我们考虑的是不一定具有特殊性的结构对象。这样的结构对象，我们就由它的元素构成，叫它“带基点的后继集合”吧。在这里，基点指的是  $x$ ，后继指的是集合  $X$  上的自映射  $s$ ，我们将其视为一种一元运算，或者也可以叫算子，称为后继算子。有了结构的对象，它们之间还需要相互联系。在集合范畴中，我们定义态射的标准方式是态射定义为两个集合之间的映射。至于集合之间的联系为什么既不是要求更高的单射、满射、双射，又不是更弱的二元关系，这个问题有些意思。不过，我们的标准做法依然是把集合间的态射定义为映射。而我们在此处考虑的带基点的后继集合，它本质上是在一个集合上附加了两个结构：一个自映射与一个基点。因此，我们一方面继承集合范畴的态射，把带基点的后继集合  $(X, s, x)$  到带基点的后继集合  $(X', s', x')$  间的态射定义为某种映射  $f: X \rightarrow X'$ 。另一方面，我们还需要考虑这个映射应该在附加的两个结构上建立联系，或者说如何保持自映射与基点的结构。保持这两个结构的方法很简单，首先是对于基点，保持基点我们能想到的唯一标准方法无非是使  $xf = x'$ ；而对于后继算子，保持运算的标准方法是，考虑  $X$  中的元素  $y, z$  满足  $ys = z$ ，我们可以对它在这两个点在映射  $f$  下得到像  $yf, zf$ ，既然和  $X$  中  $y$  可由一步后继得到  $z$ ，那么，我们就想在  $X'$  中，使像  $yf$  由一步后继得到  $zf$ 。换言之，我们想让等式  $yfs' = zf$  对一切满足  $ys = z$  的  $y, z \in X$  成立。由于  $z$  可用  $y$  代入，这相当于下面的式子成立：

$$\forall_{y \in X} yfs' = ysf, \quad \text{即} \quad fs' = sf.$$

实际上，我们可以用交换图来更加直观地展示这个关系：

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & X' \\ s \downarrow & & \downarrow s' \\ X & \xrightarrow{f} & X' \end{array}$$

我们的态射定义源于集合映射定义，因此态射的复合可以直接定义为集合映射的复合，单位态射也可直接定义为一个集合的恒等映射。严格地说，我们还需验证态射的复合也是态射，关键在于“保持附加结构”的验证。这里我们使用交换图的方式进行直观验证：

$$\begin{array}{ccccc}
 X & \xrightarrow{f} & X' & \xrightarrow{g} & X'' \\
 s \downarrow & & s' \downarrow & & \downarrow s'' \\
 X & \xrightarrow{f} & X' & \xrightarrow{g} & X''
 \end{array}$$

我们给出带基点的后继集合的范畴的定义：

**对象** 所有带基点的后继集合  $(X, s, x)$ 。

**态射** 从  $(X, s, x)$  到  $(X', s', x')$  的态射是一个映射  $f: X \rightarrow X'$ ，满足  $xf = x'$  与  $fs' = sf$ 。

**态射的复合** 若  $f: (X, s, x) \rightarrow (X', s', x')$ ， $g: (X', s', x') \rightarrow (X'', s'', x'')$ ，则  $f \circ g: (X, s, x) \rightarrow (X'', s'', x'')$  定义为集合映射的复合  $f \circ g$ 。

**单位态射** 对于每个对象  $(X, s, x)$ ，单位态射  $\text{id}_{(X, s, x)}: (X, s, x) \rightarrow (X, s, x)$  定义为集合  $X$  上的恒等映射  $\text{id}_X$ 。