


续表

疫苗名称	简介	推荐注射时间
肺炎球菌结合疫苗（目前使用的是PCV13，即13价肺炎球菌多糖结合疫苗）	可预防由肺炎链球菌所致的肺炎、脑膜炎、中耳炎、会厌炎、败血症等侵袭性细菌感染，易感人群为5岁以下儿童，尤其是2岁以下婴幼儿	2月龄、4月龄、6月龄、12~15月龄
水痘疫苗	可预防由水痘-带状疱疹病毒引起的传染病水痘。一旦患病，这种病毒会长期潜伏在人体内，为成年后患带状疱疹留下隐患；若年幼时未患过水痘，成年后患该病死亡率比儿童高25倍	1岁后可接种，建议共接种2剂
轮状病毒疫苗	可预防由A群轮状病毒引起的腹泻，每年秋冬季流行，易感人群为5岁以下婴幼儿，其中2个月~3岁的患者最多	2月龄以上可服用，建议3岁以下婴幼儿每年服用一次
EV71型肠道病毒疫苗	可预防肠道病毒71型感染所致的手足口病及疱疹性咽峡炎等疾病。手足口病可由多种肠道病毒引起，其中肠道病毒71型（EV71）是导致手足口病的重要病原之一，也是病死率最高的一种	6月龄~71月龄的儿童，共需接种2剂，间隔1个月
流感疫苗	可预防由流感病毒感染引起的流行性感冒，建议在每年流行季节性前接种。由于甲型流感的抗原易发生变异，因此建议每年连续接种流感疫苗。尤其是5岁以下婴幼儿、60岁以上老年人及医务工作者等高危群体	6月龄后可接种 目前6~35月龄无接种史的儿童首次应接种2剂，间隔4周。大于36月龄的儿童每年接种1剂
狂犬病疫苗	可预防被动物致伤后感染狂犬病，比如体内携带狂犬病毒的狗、猫等。狂犬病一旦感染致死率几乎高达100%，潜伏期可短至5~6天，通常为20~60天，1年以内发病率占99%，个别可长达数年数十年	被高风险动物致伤后尽早接种，开始注射的第0天、第3天、第7天、第14天、第30天，共5剂


注：由于生活地区不同，当地卫生部门对于疫苗的规定可能略有不同，请家长以当地疫苗接种单位的要求为准。

附录 2


0 ~ 5 岁宝宝生长曲线图




▲ 图附-2-1 0 ~ 5 岁男宝宝身长 / 身高曲线图




▲ 图附-2-2 0 ~ 5 岁女宝宝身长 / 身高曲线图




▲ 图附-2-3 0 ~ 5 岁男宝宝体重曲线图




▲ 图附-2-4 0 ~ 5 岁女宝宝体重曲线图




▲ 图附-2-5 0~5岁男宝宝头围曲线图



▲ 图附-2-6 0~5岁女宝宝头围曲线图



▲ 图附-2-7 0 ~ 5 岁男宝宝体块指数曲线图



▲ 图附-2-8 0 ~ 5 岁女宝宝体块指数曲线图

公众号：点点妈育儿

用知识开启科学的养育计划，给宝宝一个健康、安心的童年。

- 与国际先进育儿理念相结合、适合中国宝宝的系统科学养育法。
- 涉及喂养、身心发育、疾病等育儿方面多维度知识，深入浅出的讲解令新手爸妈能从容应对。
- 结合崔玉涛医生团队倾心打造的专业怀孕育儿 App，线上线下共同为家长提供更全面的知识指导，打造全新百科阅读体验。
- 扫码观看崔玉涛医生亲自讲解的 32 个“一看就会”的育儿视频，针对常见养育误区，用最直观的方式传授母乳喂养、冲调配方粉、大运动训练、抚触、辅食制作等核心育儿技能。



阅读新世界
资讯新视野

ISBN 978-7-5086-9836-6



定价：178.00 元