

PDE 作业

1 第一章

习题 1 利用 Gauss-Green 公式证明

1. 若 $u, v \in C^1(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$, 则

$$\int_{\Omega} u_{x_i} v dx = - \int_{\Omega} u v_{x_i} dx + \int_{\partial\Omega} u v n_i ds.$$

2. 若 $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$, 则

$$\int_{\Omega} \Delta u dx = \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial n} ds.$$

3. 若 $u, v \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$, 则

$$\int_{\Omega} u \Delta v - v \Delta u dx = \int_{\partial\Omega} u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} ds.$$

证明. 1. 令 $F = (0, 0, \dots, uv, \dots, 0)^T$, 根据 Gauss-Green 公式,

$$\int_{\Omega} u_{x_i} v dx = \int_{\Omega} \nabla \cdot F dx = \int_{\partial\Omega} F \cdot n ds = \int_{\partial\Omega} u v n_i ds.$$

2. 注意到 $\Delta u = \nabla \cdot \nabla u$, 那么

$$\int_{\Omega} \Delta u dx = \int_{\Omega} \nabla \cdot \nabla u dx = \int_{\partial\Omega} \nabla u \cdot n ds = \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial n} ds.$$

3. 根据第 1 问的结论,

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} u \Delta v - v \Delta u dx &= \int_{\Omega} \sum_{i=1}^n (u v_{x_i x_i} - v u_{x_i x_i}) dx \\ &= - \int_{\Omega} \sum_{i=1}^n (u_{x_i} v_{x_i} - u_{x_i} v_{x_i}) dx + \int_{\partial\Omega} \sum_{i=1}^n (u v_{x_i} n_i - v u_{x_i} n_i) ds \\ &= \int_{\partial\Omega} (u \nabla v \cdot n - v \nabla u \cdot n) ds = \int_{\partial\Omega} u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} ds. \end{aligned}$$

■

习题 2 将下列方程化为标准型.

$$1. \sum_{i=1}^n u_{x_i x_i} + \sum_{1 \leq j < j \leq n} u_{x_i x_j} = 0.$$

$$2. u_{xx} + 2u_{xy} + 2u_{yy} = 0.$$

解. (1) 令矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 & \cdots & 1/2 \\ 1/2 & 1 & \cdots & 1/2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1/2 & 1/2 & \cdots & 1 \end{bmatrix}, \quad P = \begin{bmatrix} -1/\sqrt{2} & \cdots & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{n} \\ 1/\sqrt{2} & \cdots & 0 & 1/\sqrt{n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{n} \end{bmatrix},$$

那么 $P^T A P = \text{diag}\{1/2, \cdots, 1/2, (n+1)/2\}$, 令

$$\begin{aligned} y_1 &= -\frac{1}{\sqrt{2}}x_1 - \frac{1}{\sqrt{2}}x_2 - \cdots - \frac{1}{\sqrt{2}}x_{n-1} + \frac{1}{\sqrt{n}}x_n, \\ y_2 &= \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{n}}x_n, \\ &\dots\dots\dots \\ y_n &= \frac{1}{\sqrt{2}}x_{n-1} + \frac{1}{\sqrt{n}}x_n, \end{aligned}$$

那么标准型为

$$\frac{1}{2}u_{y_1 y_1} + \cdots + \frac{1}{2}u_{y_{n-1} y_{n-1}} + \frac{n+1}{2}u_{y_n y_n} = 0.$$

(2) 令

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad P = \begin{bmatrix} \frac{-1+\sqrt{5}}{\sqrt{10-2\sqrt{5}}} & \frac{-\sqrt{5}-1}{\sqrt{10+2\sqrt{5}}} \\ \frac{2}{\sqrt{10-2\sqrt{5}}} & \frac{2}{\sqrt{10+2\sqrt{5}}} \end{bmatrix},$$

那么 $P^T A P = \text{diag}\left\{\frac{3+\sqrt{5}}{2}, \frac{3-\sqrt{5}}{2}\right\}$, 令

$$\begin{aligned} s &= \frac{-1+\sqrt{5}}{\sqrt{10-2\sqrt{5}}}x + \frac{-\sqrt{5}-1}{\sqrt{10+2\sqrt{5}}}y, \\ t &= \frac{2}{\sqrt{10-2\sqrt{5}}}x + \frac{2}{\sqrt{10+2\sqrt{5}}}y. \end{aligned}$$

得到标准型为

$$\frac{3+\sqrt{5}}{2}u_{ss} + \frac{3-\sqrt{5}}{2}u_{tt} = 0.$$

习题 3 设

$$J(v) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} (|\nabla v|^2 + v^2) dx + \frac{1}{2} \int_{\partial\Omega} \alpha(x) v^2 ds - \int_{\Omega} f v dx - \int_{\partial\Omega} g v ds,$$

其中 $\alpha(x) \geq 0$. 考虑以下三个问题:

问题 I(变分问题): 求 $u \in M = C^1(\bar{\Omega})$, 使得

$$J(u) = \min_{v \in M} J(v).$$

问题 II: 求 $u \in M = C^1(\bar{\Omega})$, 使得它对于任意的 $v \in M$, 都满足

$$\int_{\Omega} (\nabla u \cdot \nabla v + u \cdot v - fv) dx + \int_{\partial\Omega} (\alpha(x)uv - gv) ds = 0.$$

问题 III(第三边值问题): 求 $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$, 满足以下边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u + u = f, & x \in \Omega, \\ \frac{\partial u}{\partial n} + \alpha(x)u = g, & x \in \partial\Omega. \end{cases}$$

1. 证明问题 I 与问题 II 等价.

2. 当 $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$ 时, 证明问题 I、II、III 等价.

证明. (1) “ \Rightarrow ”. 令 $j(\varepsilon) = J(u + \varepsilon v)$, 则 $j(\varepsilon) \geq j(0)$, 那么 $j'(0) = 0$. 又

$$\begin{aligned} j(\varepsilon) &= \frac{1}{2} \int_{\Omega} (|\nabla(u + \varepsilon v)|^2 + (u + \varepsilon v)^2) dx + \frac{1}{2} \int_{\partial\Omega} \alpha(x)(u + \varepsilon v)^2 ds \\ &\quad - \int_{\Omega} f(x)(u + \varepsilon v) dx - \int_{\partial\Omega} g(x)(u + \varepsilon v) ds \\ &= \frac{1}{2} \int_{\Omega} \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \varepsilon \frac{\partial v}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \varepsilon \frac{\partial v}{\partial y} \right)^2 + (u + \varepsilon v)^2 \right] dx \\ &\quad + \frac{1}{2} \int_{\partial\Omega} \alpha(x)(u + \varepsilon v)^2 ds - \int_{\Omega} f(x)(u + \varepsilon v) dx - \int_{\partial\Omega} g(x)(u + \varepsilon v) ds. \end{aligned}$$

那么

$$\begin{aligned} j'(\varepsilon) &= \int_{\Omega} \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \varepsilon \frac{\partial v}{\partial x} \right) \frac{\partial v}{\partial x} + \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \varepsilon \frac{\partial v}{\partial y} \right) \frac{\partial v}{\partial y} + (u + \varepsilon v)v \right] dx \\ &\quad + \int_{\partial\Omega} \alpha(x)(u + \varepsilon v)v ds - \int_{\Omega} f(x)v dx - \int_{\partial\Omega} g(x)v ds. \end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned} j'(0) &= \int_{\Omega} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial y} + uv \right) dx + \int_{\partial\Omega} \alpha(x)uv ds - \int_{\Omega} f v dx - \int_{\partial\Omega} g v ds \\ &= 0. \end{aligned}$$

“ \Leftarrow ”.

$$\begin{aligned} J(v) - J(u) &= \frac{1}{2} \int_{\Omega} (|\nabla v|^2 + v^2 - |\nabla u|^2 - u^2) dx + \frac{1}{2} \int_{\partial\Omega} \alpha(x)(v^2 - u^2) ds \\ &\quad - \int_{\Omega} f(v - u) dx - \int_{\partial\Omega} g(v - u) ds \\ &= \frac{1}{2} \int_{\Omega} \left[\left(\frac{\partial v}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial y} \right)^2 + v^2 - \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 - \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 - u^2 \right] dx \\ &\quad + \frac{1}{2} \int_{\partial\Omega} \alpha(x)(v^2 - u^2) ds - \int_{\Omega} f(v - u) dx - \int_{\partial\Omega} g(v - u) ds. \end{aligned}$$

又已知

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 + u^2 - fu \right] dx + \int_{\partial\Omega} (\alpha(x)u^2 - gu) ds &= 0, \\ \int_{\Omega} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial y} + uv - fv \right) dx + \int_{\partial\Omega} (\alpha(x)uv - gv) ds &= 0, \end{aligned}$$

联立以上两式, 可得

$$J(v) - J(u) = \frac{1}{2} \int_{\partial\Omega} \alpha(x)(u - v)^2 ds + \frac{1}{2} \int_{\Omega} (|\nabla u - \nabla v|^2 + (u - v)^2) dx \geq 0.$$

(2) II \Rightarrow III. 根据习题 1 第一问,

$$\int_{\Omega} (u \cdot v - fv - v\Delta u) dx dy + \int_{\partial\Omega} (\alpha(x)uv + \frac{\partial u}{\partial n}v - gv) ds = 0.$$

选取 $v \in C_0^\infty(\Omega)$, 那么

$$\int_{\Omega} (u \cdot v - fv - v\Delta u) dx dy = 0.$$

又因为 $u - f - \Delta u$ 连续, 那么

$$u - \Delta u = f.$$

将上式代入, 得到,

$$\int_{\partial\Omega} (\alpha(x)uv + \frac{\partial u}{\partial n}v - gv) ds = 0, \quad v \in M.$$

那么

$$\alpha(x)u + \frac{\partial u}{\partial n} - g = 0.$$

III \Rightarrow II. 将两式代入即证. ■

习题 4 若 u 是 Laplace 方程 $\Delta u = 0$ 的解, 如果 $u(x)$ 只是向径 $r = |x|$ 的函数, 即 $u(x) = \tilde{u}(r)$, 试写出 $\tilde{u}(r)$ 适合的常微分方程.

习题 5 1. 证明在自变量代换

$$\begin{cases} \xi = x - at, \\ \eta = x + at \end{cases}$$

下, 波动方程 $u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0$ 具有形式

$$u_{\tau} = a^2 u_{\xi\xi}.$$